

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Maxforce Platin

**Produkto tipas (-ai):** PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5E)BPR- 571(A-18PAP453669-20-298)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0024957-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	6
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	6
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

MAXFORCE PLATIN

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Bayer A/S
	Adresas	Arne Jacobsen Alle 13 2300 Copenhagen S Danija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5E)BPR- 571(A-18PAP453669-20-298)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0024957-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	16/10/2020	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	15/07/2024	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Bayer S.A.S.- Division Crop Science
<b>Gamintojo adresas</b>	16 rue Jean-Marie Leclair 69266 Lionas, Cedex 09 Prancūzija
<b>Gamybos vieta</b>	Bayer SAS - Division Crop Science - Site Marle, Z.I. Antoine Laurent de Lavoisier F-02250 Marle-sur-Serre Prancūzija
	Norbert/ Jacobson Co.—3060 Southpark Blvd 30294 Ellenwood, Džordžija Jungtinės Amerikos Valstijos

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	15 - (E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas)
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Bayer AG
<b>Gamintojo adresas</b>	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheimas prie Reino Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	Bayer AG - Chempark 41538 Dormagenas Vokietija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas (chlotianidinas)		Veiklioji medžiaga	210880-92-5	433-460-1	1,026

### 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)
----------------------------------

## 3. Pavojaus ir atsargumo frazės

<b>Pavojaus kategorijos</b>	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-onas, 5-chlor-2-metil-izotiazol-3-onas / 2-metil-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.
<b>Pavojaus frazės</b>	turinį išpilti (išmesti) į laikantis vietinių reikalavimų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 1 - Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas, skirtas tarakonams bei pilkiesiems cukriniams žvyninukams kontroliuoti.**

<b>Produkto tipas</b>	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai											
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Insekticidas											
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	<p>Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: Amerikinis tarakonas Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Rytietiškas tarakonas Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: Naminis prūsokas Vystymo stadija: Suaugėliai ir nimfos</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Ctenolepisma longicaudatum Bendrinis pavadinimas: Pilkieji cukriniai žvyninukai Vystymo stadija: Mišraus amžiaus populiacija</p>											
<b>Naudojimo sritis</b>	<p>vidaus</p> <p>Paruoštas naudoti insekticidinis gelio masalas tarakonų nimfų ir suaugėlių kontrolei. Skirta naudoti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gyvenamosiose / buitinėse patalpose;</li><li>• maisto tvarkymo / laikymo patalpose;</li><li>• visuomeniniuose pastatuose;</li><li>• gyvūnų laikymo vietose, t. y. zoologijos soduose, naminių gyvūnų parduotuvėse, veislynuose, veterinarijos įstaigose, laboratorijose ir kt. (tik pastatuose, pašarų tvarkymo ir laikymo patalpose, išskyrus arklides, gyvūnų aptvarus ir narvus, kur laikomi gyvūnai).</li></ul>											
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	masalo naudojimas - Produktas išskiriamas naudojant tinkamą švirškštą.											
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>1–3 lašai x 0,1 g/m<sup>2</sup> - 0 - Taikykite „Maxforce Platin“ lašais arba plonomis juostelėmis ant paviršių nustatytose tikslinėse zonose. Dedamas kampuose, įtrūkimuose, plyšiuose ir tuštumose. Pritaikykite dozę pagal zooparazitų paplitimo laipsnį ir rūšies tipą: Vienas lašas = 0,1 g (maždaug 7 mm skersmens); 0,007 g (3 mm); 0,002 g (2 mm). Arba padėkite vieną ploną juostelę, prilygstančią vienam lašui.</p> <p><b>Prieš tarakonus:</b></p> <table><tr><td></td><td>Taikomoji dozė atsižvelgiant į zooparazitų paplitimo tankį* viename m<sup>2</sup></td></tr><tr><td></td><td>Mažas</td><td>Didelis</td></tr><tr><td>Mažas, pvz., Naminiai prūsokai</td><td>Vienas lašas x 0,1 g</td><td>Du lašai x 0,1 g</td></tr><tr><td>Didelis, pvz., Juodieji tarakonai arba amerikiniai tarakonai</td><td>Du lašai x 0,1 g</td><td>Trys lašai x 0,1 g</td></tr></table> <p>Gelio masalus palikti: bent 14 dienų mažiems tarakonams,</p>		Taikomoji dozė atsižvelgiant į zooparazitų paplitimo tankį* viename m <sup>2</sup>		Mažas	Didelis	Mažas, pvz., Naminiai prūsokai	Vienas lašas x 0,1 g	Du lašai x 0,1 g	Didelis, pvz., Juodieji tarakonai arba amerikiniai tarakonai	Du lašai x 0,1 g	Trys lašai x 0,1 g
	Taikomoji dozė atsižvelgiant į zooparazitų paplitimo tankį* viename m <sup>2</sup>											
	Mažas	Didelis										
Mažas, pvz., Naminiai prūsokai	Vienas lašas x 0,1 g	Du lašai x 0,1 g										
Didelis, pvz., Juodieji tarakonai arba amerikiniai tarakonai	Du lašai x 0,1 g	Trys lašai x 0,1 g										

bent 4 savaites juodiesiems tarakonams,  
bent 12 savaičių amerikiniams tarakonams.  
Toks taikymas padės pasiekti geriausius rezultatus. Jei tarakonai vis dar matomi po mėnesio, pakartokite priemonės taikymą.

**Prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus:**  
20 lašelių (maždaug 3 skersmens) arba 65 lašelius (maždaug 2 mm skersmens), tai atitinka 0,1 g – 0,2 g viename m<sup>2</sup>  
Norint gauti geriausius rezultatus, gelio masalą reikia palikti bent 8 savaites. Jei pilkieji cukriniai žvyninukai vis dar matomi po rekomenduojamo laiko intervalo, pakartokite priemonės taikymą.

Priemonę taikykite ne dažniau kaip kartą per mėnesį.

#### Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

#### Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Kasetė ir švirškėtas, plastikiniai: PE, 10–30 g

Švirškėtą galima pakartotinai uždaryti suteikiamu galiniu dangteliu (PP).

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

žr. 5.1 ir 6 skyrius

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

žr. 5.2 skyrių

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

žr. 5.3 skyrių

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

žr. 5.4 skyrių

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

žr. 5.5 skyrių

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktas išskiriamas naudojant tinkamą gelio aplikatorių. Baigę jį naudoti, išimkite tuščią kasetę ir saugiai ją išmeskite. Jei panaudota tik dalis kasetės, išimkite ją iš aplikatoriaus, užsandarinkite galiniu dangteliu ir laikykite pagal nurodymus.

Prieš pradėdami taikyti priemonę, tinkamai išstirkite ketinamą apdoroti zoną, kad nustatytumėte zooparazitų paplitimo vietas, pvz., naudodami spąstus ir (arba) aerozolius, ieškodami išmatų, išnarų, kiaušinėlių kevalų ir t. t.

Siekiant maksimalaus efektyvumo, produktą reikia dėti zooparazitų buvimo vietose ir pakeliui prie jų maisto šaltinių. Be to, iš zooparazitų paplitimo vietos reikia pašalinti visus kitus maisto šaltinius (atliekas, maisto likučius ir t.t.), kad jie būtų skatinami vartoti gelį.

Produktą ypač rekomenduojama naudoti vietose, kur negali būti naudojami įprasti insekticidai, pavyzdžiui, šalia elektros arba elektroninių prietaisų.

Tose vietose, kur buvo nustatytas tarakonų paplitimas, rekomenduojama praplėsti produkto taikymo sritį ir padėti masalą šalia esančiose vietose, siekiant sustiprinti kontrolę bei išvengti tolesnio paplitimo.

Produktą dėkite tikslingai (lašais arba plonomis juostelėmis) uždaroje, sunkiai pasiekiamose vietose, pavyzdžiui, šalia kampų, įtrūkimų ir plyšių. Venkite naudoti priemonę labai dulketose, drėgnose ar riebaluotose vietose.

Padėkite masalo vietoje, kurios nėra prieinamos vaikams ar naminiams gyvūnams.

Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas.

Negalima naudoti tose vietose, kurios neseniai buvo apdorotos kitais insekticidais, arba maišyti masalo su kitais insekticidais.

Galima tikėtis labai greito poveikio tarakonų populiacijai. Negyvi tarakonai turėtų būti pastebimi per 24 valandas po priemonės taikymo pradžios. Maksimalus kontrolės lygis pasiekiamas praėjus nuo šešių dienų iki 2 mėnesių po priemonės taikymo pradžios priklausomai nuo zooparazitų paplitimo lygio ir kol ant paviršių yra gelio.

Jei zooparazitai yra labai paplitę, reguliariai (kartą per mėnesį) apžiūrėkite produkto taikymo vietas ir, esant būtinybei, padėkite priemonės papildomai.

Naudojimas prieš pilkuosius cukrinius žvyninukus: padėkite daug mažų lašelių į tas vietas, kur pilkieji cukriniai žvyninukai slepiasi ir gyvena. Šios vietos gali būti po grindimis / grindjuostėmis ar už jų, po medine apdaila ir pan.

Produktas neskirtas naudoti nuolat.

Negalima naudoti gyvūnų aptvaruose ir narvuose.

Senus masalus ir (arba) gelio likučius turi pašalinti profesionalus kenkėjų kontrolės operatorius.

**PRIEŠ NAUDOJIMĄ ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE VISĄ INFORMACIJĄ.**

**INFORMUOKITE RĖGISTRACIJOS LIUDIJO TURĖTOJĄ, JEI TAIKYMAS NEVEIKSMINGAS.**

**NEGALIMA NAUDOTI ANT SUGERIANČIŲ PAVIRŠIŲ**

**NEDĖKITE PRODUKTO, KUR JĮ GALI PASIEKTI SAULĖS SPINDULIAI AR ŠILUMOS ŠALTINIAI (PVZ., NEDĖKITE PO RADIATORIAIS).**

**SAUGOKITE NUO VANDENS.**

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

• Venkite naudoti priemonę labai dulketose, drėgnose ar riebaluotose vietose. Negalima naudoti vietose, kuriose atliekamas drėgnas valymas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į įtrūkimus ir plyšius bei kitas vietas, kuriose paprastai slepiasi vabzdžiai, taip pat į vietas, esančias už mašinų, buitinės įrangos ar vamzdžių arba po jais. Produktą galima įdėti į tuštumas, ventiliacijos angas, liftų šachtas, elektros ir elektroninius prietaisus ir kt. Neskirta naudoti arklidėse, gyvūnų aptvaruose ar narvuose.

Nerekomenduojama naudoti vabzdžiais mintančių paukščių ir roplių laikymo patalpose.

• Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Dirbdami su produktu, mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.

• Venkite kontakto su oda.

• Prieš valgį ir panaudoję produktą plaukite rankas ir paveiktą odą.

• Nedėkite tiesiai ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar valgomas maistas arba gyvūnų pašaras.

• Naudokite tik vaikams ir gyvūnams nepasiekiamose vietose.

• Nemėginkite atidaryti ar pripildyti kasečių.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

#### Bendras patarimas:

Jei išsiliejo didelis kiekis, taikomi šie patarimai. Nebūkite pavojingoje zonoje. Paguldykite ir transportuokite nukentėjusį asmenį stabilioje padėtyje (paguldę jį ant šono). Nedelsdami nurenkite užterštus drabužius ir saugiai juos išmeskite. Jei reikia, nuvežkite paveiktą asmenį į sveikatos priežiūros centrą ir, jei įmanoma, kartu pristatykite pakuotę ar etiketę.

**NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS!**

Patekus ant odos: Gerai nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens, po to nuskalaukite vandeniu. Jei susidaro ir išlieka odos sudirginimas, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: Nedelsdami praplaukite akis ir už vokų dideliu drungno vandens kiekiu. Toliau praplaukite mažiausiai 5 minutes. Nepamirškite išimti kontaktinių lęšių, jei juos nešiojate. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: Skalaukite burną vandeniu. Skambinkite į apsinuodijimų centrą. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją, jei atsirado simptomų ir (arba) jei prarijote didelį kiekį. Jei asmuo nebuvo praradęs sąmonės, duokite jam nedidelį kiekį vandens atsigerti. Netekus sąmonės, paguldykite nukentėjusįjį stabiliai ant šono ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros personalui: Gydyimą ir priežiūrą užtikrinti atsižvelgiant į simptomus.

**KREIPDAMIESI Į VIETOS APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ ARBA GYDYTOJĄ, TURĖKITE SU SAVIMI PAKUOTĘ AR ETIKETĘ.**

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Neišmeskite nepanaudoto produkto į vandens telkinius, vamzdžius (kriauklę, tualetą ir pan.) ar kanalizaciją ir neišpilkite jo ant žemės.

Turinį / talpyklą išmesti laikantis taikomų atliekų tvarkymo reikalavimų.

Gelio likučius galima pašalinti, nuvalant juos kempinėle arba drėgna šluoste, suvilgyta 5 % natrio chlorido tirpalu. Panaudotas medžiagas (kempines, šluostes ir pan.) reikia pašalinti kaip kietas atliekas.

Sukietėjusį gelį galima nuimti mentele ir pašalinti kaip kietas atliekas.

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Neleiskite užšalti.

Saugokite nuo saulės spindulių.

Tinka naudoti: iki 24 mėnesių.

## 6. Kita informacija

Informacija. Produktas gali nudažyti kai kurias jautrias medžiagas, pvz., tekstilę. Jei kyla abejonių, pirmiausia taikykite mažame, nepastebimame plote.



Naudojant produktą, reikia atsižvelgti į tai, kad vabzdžiai gali tapti atsparūs klotianidinui. Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, galima naudoti šias priemones:

- Naudoti integruotas kontrolės priemones, pavyzdžiui, kombinuoti chemines ir fizines kontrolės priemones bei laikytis higienos taisyklių, atsižvelgiant į vietos sąlygas (klimato sąlygas, tikslinius organizmus, naudojimo sąlygas ir pan.).
- Visada laikytis ant produkto etiketės pateiktos naudojimo instrukcijos dėl taikymo ir dozavimo.
- Produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, naudojimą keisti kitais veikiančiais kontrolės būdais.
- „Maxforce Platin“ produktą rekomenduojama naudoti pagal integruotą kontrolės programą.
- Būtina reguliariai tikrinti efektyvumą, siekiant užtikrinti, kad neišsivystytų zooparazitų atsparumas, bei išvengti jų pakartotinio paplitimo rizikos.
- Tais atvejais, kai buvo pateikta naudojimo instrukcija, tačiau, nepaisant to, išsivystė atsparumas, reikia vengti keisti šį produktą į jį panašiais produktais, ypač neonikitinoidais.
- Esant atsparumo įrodymams, būtina taikyti visas priemones, siekiant išnaikinti paplitusią populiaciją. Pavyzdžiui, rekomenduojama naudoti iš karto tiek cheminius, tiek mechaninius kontrolės metodus.