



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2022/0315/MRP/ES/APP(NA)-2021-18-00768

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **28.02.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **SPANIA**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent: **ES/APP(NA)-2021-18-00768**

II. Data emiterii autorizației: 22.03.2022

III. Data expirării autorizației: 05.08.2026

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: BIOPREN ANT KILLER GEL
Alte denumiri: *BIOPREN ANT GEL, PROTECT ANT GEL, , PROTECT ANT GEL, PROTECT HANGYAIRTO CSALETEK, BIOPREN ANT GEL, PROTECT ANT GEL, BIOPREN HANGYAIRTO GEL, PROTECT ANT GEL, BIOPREN ANT GEL, BIOPREN ANT GEL, BIOPREN ANT GEL, PROTECT ANT GEL, PROTECT ANT GEL, PROTECT ANT GEL*

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: -

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: MYLVA S.A.
Adresa : Via Augusta, 48,08006 Barcelona, Spania

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: MYLVA S.A.
Adresa : Via Augusta, 48,08006 Barcelona, Spania

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA –

1. Imidacloprid

Numele producătorului: **BAYER S.A.S.**

Adresa producătorului: 16 rue Jean-Marie Leclair- CS 90106 69266 Lyon, Cedex 09 Franța

Locație de fabricație: 16 rue Jean-Marie Leclair-CS 90106 69266 Lyon, Cedex 09 Franța

2. S-methopreen

Numele producătorului: **BABOLNA BIO LTD**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Adresa producatorului: Szállás u. 6 1107 Budapesta Ungaria
Locatie de fabricatie: Szállás u 6 1107 Budapesta Ungaria

VI.

TIPUL DE PRODUS : Grupa Principala 3: Tip de produs 18 - (insecticide , acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), produse utilizate în combaterea artropodelor (insecte, arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: public larg (non-profesional), profesional, profesional instruiți.

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: momeala gel

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1)Substanta activă

a) substante chimice 1

Denumirea comuna	<i>Imidacloprid</i>
Denumirea IUPAC	<i>2-chloro-5-([2-(nitroamino)-4,5-dihidro-1H-imidazol-1-yl]methyl)pyridine</i>
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substantă activă	0.01%

substante chimice 2

Denumirea comuna	<i>S- metopren</i>
Denumirea IUPAC	<i>Izopropil-(2E,4E,7S)-11-metoxi-3,7,11-trimetil-dodeca-2,4-dienoat</i>
Numar CAS	65733-16-6
Numar CE	613-834-0
Continut de substantă activă	0,08%

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	
Fraze de risc H	H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. .
Fraze de prudență P	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare P273 Evitați dispersarea în mediu. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați conținutul/recipientul la deșeuri: conform prevederilor legale.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



XI. AMBALAREA

1. Non -Profesionali

- Momeală gel aplicată în picături
- Seringi din plastic LDPE de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame gel.
- Momeală gel aplicată în capcane
- Capcană din plastic (PET) cu 2, 3, 4, 5 și 6 grame de momeală cu gel.

2. Profesionali

- Momeală gel aplicată în picături.
- Seringi din plastic LDPE de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 grame gel.
- Momeală gel aplicată în capcane
- Capcană din plastic (PET) cu 2, 3, 4, 5 și 6 grame de momeală cu gel.

3. Profesionali instruiți

- Momeală gel aplicată în picături/interior.
- Seringi din plastic LDPE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, de grame de gel.
- Cartușe din plastic LDPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 și 500 de grame de gel.
- Momeală gel aplicată în capcane (stație)/interior
- Stații de momeală din plastic cu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 și 60 g de grame de momeală cu gel.
- Momeală gel aplicată în capcane (stație)/exterior
- Stații de momeală din plastic cu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, și 30 de grame de momeală cu gel.

XII.

INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE:

Organisme țintă:

Furnica argentiniană (Linepithema humile);

Furnică neagră (Lasius niger).

Mod de acțiune (numai în cazul în care organismul țintă este un animal vertebrat)

- **Imidacloprid (adulticid):** Aparține familiei chimice a nitroguanidinelor (neonicotinoizi). Acestea acționează legându-se de neuronii insectelor. Această legare provoacă o perturbare a transmiterii impulsurilor nervoase care este letală pentru insectele țintă.

- **S-metopren (ovicid):** Aparține grupului de Regulatorilor de creștere a insectelor (IGR). Acționează ca un analog hormonal juvenil pentru a perturba dezvoltarea normală a insectelor. Nu prezintă un efect imediat de ucidere asupra organismelor țintă, dar perturbă metamorfozarea. Prin urmare procesele de maturare până la etapa adultă sunt afectate, iar insectele dezvoltă deformări fizice și nu se pot matura până la adulți reproductivi.

Instrucțiuni generale de utilizare:

- Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



furnizate.

- După o verificare temeinică efectuată în vederea stabilirii nivelului de infestare (scăzut sau ridicat), amplasați punctele de momeală în locurile unde s-au detectat furnicile.
- Eliminați eventualele surse alternative competitive de hrană din zonele vecine.
- Produsul a demonstrat o eficacitate de peste 90 % de mortalitate la furnici adulte în 15 zile.
- Acest produs biocid conține imidacloprid, care este periculos pentru albine.

Utilizare 1-Interior- Momeală gel aplicată sub formă unor picături/linii-Profesionali instruiți, profesional, public general (neprofesional)-pentru Furnică neagră și furnică argentiniană

Domeniul de utilizare:

- de interior
- interiorul clădirilor rezidențiale, industriale, publice, comerciale sau instituționale.

Metoda (metodele) de aplicare:

- Aplicarea momelei în gel cu cartuș/seringă.
- Aplicați produsul sub formă de picături sau linii (picături alungite) unde sunt prezente furnicile, adică aproape de drumul furnicilor sau în apropierea cuiburilor acestora.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,2-0,6 g/m² = 1-3 picături/m²

(1 picătură=1 linie de 3 cm lungime=0,2 grame de momeală în gel)

Frecvența aplicării: verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați încă o dată aplicarea.

Frecvența tratamentului: la trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.

Instrucțiuni specifice de utilizare:

- Se utilizează numai interior.
- Aplicați produsul biocid, în zonă restricționată, sub formă de linii sau picături în spatele mobilierului și a motoarelor.
- Vă recomandăm să vă spălați pe mâini înainte de a utiliza momeala, pentru a evita contaminarea cu mirosuri puternice, precum tabacul, etc...
- Nu stropiți și nu pulverizați alte produse chimice în apropierea zonelor în care ați aplicat MAGNUM GEL HORMIGAS IGR PLUS, deoarece puteți contamina zona, astfel devenind neapetisantă pentru furnici.
- Nu utilizați pe suprafețe poroase. În cazul în care nu găsiți o suprafață adecvată, aplicați produsul pe un suport fără pori. Exemplu: folie de plastic.
- A nu se aplica în zone tratate recent cu un alt insecticid

Utilizare 2- Exterior- Momeală gel aplicată sub formă unor picături/linii-Profesionali instruiți pentru Furnică argentiniană

Domeniul de utilizare:

- Exterioare.



- Exterior(în jurul clădirilor, teraselor...): în apropierea rutelor sau cuiburilor de furnici., pe suprafețe pavate.

Doza și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,2-0,6 g/m², în funcție de gradul de infestare, aplicat de preferință în mai multe stații de momeală pentru o eficiență mai bună.

De exemplu, așezați 2-3 stații cu 5-15 grame de momeală din 25 m².

Frecvența aplicării: verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați încă o dată aplicarea.

Frecvența tratamentului: la trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.

Instrucțiuni specifice de utilizare:

- Amplasați stațiile de momeală în zone (în exterior) unde furnicile sunt prezente , în apropierea rutelor sau cuiburilor de furnici.

- Amplasați stațiile de momeală numai pe suprafețe pavate și în locuri protejate de precipitații pentru a evita dispersarea produsului în mediu și pentru a evita expunerea directă la soare.

- În aer liber (terase, balcoane, curți sau grădini), aplicați Biopren gel pentru combaterea furnicilor în locuri unde apariția furnicilor este mai probabilă.

- Verificați frecvent punctele de aplicare și amplasați o nouă stație de momeală dacă momeala a fost consumată și infestarea încă persistă.

Utilizare 3-Interior-Momeală gel aplicată în capcane-Profesionali instruiți, profesional, general public - pentru Furnică argentiniană și Furnică neagră

Domeniul de utilizare:

- de interior

- interior. Clădiri rezidențiale, industriale, publice, comerciale sau instituționale. Aplicați produsul biocid sub forma unor pete, în spatele mobilierului și a motoarelor.

Doza(dozele) și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,3-0,6 g/m², în funcție de gradul de infestare, aplicat de preferință în mai multe stații de momeală pentru o eficiență mai bună.

De exemplu, așezați 2-3 stații cu 5-15 grame de momeală din 25 m².

Frecvența aplicării: verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați încă o dată aplicarea.

Frecvența tratamentului: la trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.

Instrucțiuni specifice de utilizare:

- Amplasați stațiile de momeală în zone (în interior) unde furnicile sunt prezente, în apropierea traseelor sau cuiburilor de furnici.

- Verificați frecvent punctele de aplicare și plasați o stație nouă dacă momeala a fost consumată și infestarea nu este încă sub control.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Utilizare 4-Exterior- Momeală gel aplicată în capcane-Profesionali instruiți- pentru Furnică argentiniană

Domeniul de utilizare:

- Exterioare.
- Exterior(în jurul clădirilor, teraselor...): în apropierea rutelor sau cuiburilor de furnici., pe suprafețe pavate.

Doza și frecvența de aplicare:

- Doza: 0,3-0,6 g/m² = 1-3 picături/m²

(1 picătură=1 linie de 3 cm lungime=0,2 grame de momeală în gel)

Frecvența aplicării: verificați punctele de aplicare după 7 zile. Dacă momeala s-a consumat și infestarea persistă, repetați încă o dată aplicarea.

Frecvența tratamentului: la trei luni după eliminarea infestării, tratamentul se poate repeta. Maxim 8 aplicări anual.

Instrucțiuni specifice de utilizare:

- Amplasați stațiile de momeală în zone (în exterior) unde furnicile sunt prezente, în apropierea rutelor sau cuiburilor de furnici.
- Amplasați stațiile de momeală numai pe suprafețe pavate și în locuri protejate de precipitații pentru a evita dispersarea produsului în mediu și pentru a evita expunerea directă la soare.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

Stabilitatea la păstrare a produsului în recipientul original este de 4 ani în condiții normale.

Feriți de îngheț.

A se păstra în recipientul original bine închis.

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Se recomandă păstrarea produsului la o temperatură de preferință între 5-45°C.

A se păstra ferit de lumină.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor care nu sunt vizate/ a animalelor de companie.

Depozitarea produsului în recipientul său original și închis ermetic.

Se păstrează într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Se recomandă păstrarea produsului de preferință la o temperatură cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C.

A se păstra departe de lumină.

A nu se păstra lângă alimente, băuturi și furaje.

ALTE INFORMATII: Personal profesionali instruiți: operatori de control a infestărilor care au beneficiat de formare specifică cu privire la controlul insecticid în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Personal profesional: utilizatorul care aplică produse biocide la locul său de muncă. Acest utilizator are unele cunoștințe și abilități de manipulare a produselor chimice și este capabil să utilizeze corect echipamentele de protecție personală (PPE), dacă este necesar.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Public în general (personal neprofesional): utilizatori care nu sunt profesioniști și care aplică produsul în viața lor privată.

Produsul conține o substanță amară care nu este pe placul copiilor și a animalelor de companie.

Doar pentru personal profesionali instruiți: Utilizatorii trebuie să anunțe dacă tratamentul nu este eficient și să informeze direct deținătorului autorizației cu privire la orice semn care ar indica o rezistență la substanța activă.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

-

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

