

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

Produktnavn: Dip es SF

Produkttype(r): PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

Godkendelsesnummer: EU-0018724-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3: EU-0018724-0006

Indholdsfortegnelse

Administrative oplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Godkendelsesindehaver	1
1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter	1
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)	2
2. Produktets sammensætning og formulering	3
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt	3
2.2. Formuleringstype	3
3. Faresætninger og sikkerhedssætninger	3
4. Godkendt(e) anvendelse(r)	4
5. Generelle anvisninger til brug	12
5.1. Brugsanvisning	12
5.2. Risiko reducerende foranstaltninger	13
5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter	13
5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage	14
5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.	15
6. Andre oplysninger	15

Administrative oplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

Dip es SF
Dip es SF 3.0
Iod Dip S 30 P
Dip es SF 1.4
Iod-Dip S 14 P
EUTADIPP

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	CVAS Development GmbH
	Adresse	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Tyskland
Godkendelsesnummer	EU-0018724-0000 1-5	
Referencenummer på emne i R4BP 3	EU-0018724-0006	
Godkendelsesdato	18/12/2018	
Godkendelsens udløbsdato	30/11/2028	

1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adressen på fabrikanten	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Tyskland

1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	Cosayach Nitratos S.A.
Adressen på fabrikanten	Amunategui 178 not applicable Santiago Chile
Placering af produktionsanlæg	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Chile

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	ACF Minera S.A.
Adressen på fabrikanten	San Martin No 499 not applicable Iquique Chile
Placering af produktionsanlæg	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Chile

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	SQM S.A.
Adressen på fabrikanten	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Chile
Placering af produktionsanlæg	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Chile

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Adressen på fabrikanten	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japan
Placering af produktionsanlæg	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japan

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)
Adressen på fabrikanten	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien
Placering af produktionsanlæg	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Storbritannien

2. Produktets sammensætning og formulering

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivstof	25655-41-8		1,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

2.2. Formuleringstype

AL - Opløsning til brug ufortyndet

3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

Faresætninger

Sikkerhedssætninger

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.

4. Godkendt(e) anvendelse(r)

4.1 brug beskrivelse

Anvendelse 1 - Brug #5.1 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med manuel dypning

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
Anvendelsesmetode(r)	Manuel dypning med dyppebæger - -
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Køer: 5 ml pr. behandling - - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE), : 60 – 200 kg mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

4.1.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.
Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påførringsudstyret.
Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Fyld beholderen med RTU-produktet og skru dyppebægeret på. Undgå spild af overskydende væske.
Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.
Efter malkningen klemmes beholderen, og dyppebægeret sættes på hver pat nedefra. Sørg for, at ca. 3 cm af patten er neddyppet i desinfektionsmidlet.
Fyld bægeret på neddypningsenheden igen med frisk desinfektionsmiddel ved at klemme beholderen efter behov. Genopfyld beholderen med frisk desinfektionsmiddel efter behov.
Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.
Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og dyppebægeret rengøres ved at skylle dem med vand.

4.1.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.
Brug kemisk resistente beskyttelsehandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.
Bær beskyttelsestøj.
Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.1.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.2 brug beskrivelse

Anvendelse 2 - Brug #5.2 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med sprayflaske

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning med en sprayflaske - -
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Køer: 5 ml pr. behandling - - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE), : 60 – 200 kg mellemløst beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

4.2.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.
 Det anbefales, at der bruges en doseringspumpe til at fylde produktet i påføringsudstyret.
 Fyld beholderen med RTU-produktet, og skru den øverste del af sprøjteflasken på. Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko. Undgå spild af overskydende væske.
 Rengør patterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.
 Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på patterne med sprayflasken. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pattekanalen er dækket med desinfektionsmiddel.
 Fyld sprayflasken med frisk desinfektionsmiddel efter behov.
 Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.
 Efter desinfektionen tømmes beholderen, og beholderen og sprayflasken rengøres ved at skylle dem med vand.

4.2.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved manuel spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.
Bær beskyttelsestøj.
Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjtetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.2.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.3 brug beskrivelse

Anvendelse 3 - Brug #5.3 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med elektronisk sprayflaske

Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

videnskabeligt navn: Bakterier
Almindeligt navn: Bakterier
udviklingsstadiet: -

videnskabeligt navn: Gær

	Almindeligt navn: Gær udviklingsstadiet: -
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af pletter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
Anvendelsesmetode(r)	Manuel sprøjtning med en elektronisk sprayflaske - -
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Køer: 5 ml pr. behandling - - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

4.3.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.
Der skal anvendes 5 ml produkt pr. ko.
Åbn en beholder med RTU-produktet, og læg en sugeslange fra den elektriske sprayflaske deri. Undgå spild af overskydende væske.
Rengør pletterne omhyggeligt med en engangspapirserviet/-klud lige inden malkningen.
Efter malkningen sprøjtes desinfektionsmidlet på pletterne med den elektroniske sprayflaske. Sørg for, at ca. 3 cm af patten omkring pettekkanalen er dækket med desinfektionsmiddel.
Udskift den tomme beholder med en ny beholder med RTU-produktet efter behov.
Lad produktet sidde på pletterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.
Efter desinfektion lægges sugeslangen i en spand vand, og skyl sprayflasken ved at pumpe vand igennem den.

4.3.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Ved påføring med spray skal der anvendes kemisk resistente beskyttelseshandsker. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.
Bær beskyttelsestøj.
Vask huden grundigt efter brug

Undgå at arbejde i sprøjetågerne.

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.3.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.4 brug beskrivelse

Anvendelse 4 - Brug #5.4 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk dypning

Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)

videnskabeligt navn: Bakterier
Almindeligt navn: Bakterier
udviklingsstadie: -

videnskabeligt navn: Gær
Almindeligt navn: Gær
udviklingsstadie: -

Anvendelsesområde

indendørs

Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen

Anvendelsesmetode(r)

Automatisk dypning -

-

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed

Køer: 5 ml pr. behandling - -

Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)

Brugerkategori(er)

professionel

Pakningsstørrelser og emballagemateriale

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
tønde (HDPE) : 60 – 200 kg
mellemstor beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

4.4.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.

Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra det automatiske neddykningssystem. Undgå spild af overskydende væske.

Efter malkningen slukkes vakuummet, og pattedesinfektionsmidlet injiceres i en manifold på mælkecentralen. Patterne dækkes med ca. 5 ml af dybningen, når pattekoppen fjernes af malkemaskinen (ACR). Når ACR'en er blevet fjernet, skylles hver slange i det automatiske dybningssystem grundigt med vand og gennemblæses med trykluft.

I det sidste rengøringstrin efter hver malkning af besætningen desinficeres slangerne (f.eks. med et klorbaseret produkt) og gennemblæses igen med trykluft.

Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.

Derefter er malkesystemet klar til næste malkning.

Hele processen er automatisk.

4.4.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Bær beskyttelsestøj.

Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.4.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.4.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

4.5 brug beskrivelse

Anvendelse 5 - Brug #5.5 – Desinfektion af patter på malkedyr: Desinfektion af patter efter malkningen med automatisk sprøjtning af robot

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Bakterier udviklingsstadie: - videnskabeligt navn: Gær Almindeligt navn: Gær udviklingsstadie: -
Anvendelsesområde	indendørs Desinfektion af patter på malkedyr (malkekøer) til brug efter malkningen
Anvendelsesmetode(r)	Automatisk sprøjtning af robot - -
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Køer: 5 ml pr. behandling - - Påføring efter malkning: 2-3 gange pr. dag (efter hver malkning)
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg tønde (HDPE) : 60 – 200 kg mellemløst beholder (HDPE) : 600 - 1000 kg

4.5.1 Brugsanvisning for brugere

Produktet skal have en temperatur over 20 °C inden brug.
Åbn en beholder med RTU-produktet, og sæt en sugeslange i fra robotmalkemaskinen. Undgå spild af overskydende væske.
Patterne rengøres af robotten med automatiske børster.
Efter robotmalkningen sprøjtes desinfektionsmidlet automatisk på patterne fra en pattekop.
Lad produktet sidde på patterne indtil næste malkning. Sørg for, at dyrene står oprejst i mindst 5 minutter efter behandlingen.
Sprøjten skylles automatisk.

4.5.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Læs altid mærkatet eller indlægssedlen inden brug, og følg alle anførte instruktioner.
Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktbladet.
Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.
Bær beskyttelsestøj.
Vask huden grundigt efter brug

Hvis en kombination af desinfektion før og efter malkningen er nødvendig, skal der anvendes et andet produkt, der ikke indeholder jod, til desinfektion før malkningen.

4.5.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning.

4.5.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning.

5. Generelle anvisninger til brug

5.1. Brugsanvisning

Se den brugsspecifikke brugsanvisning.

5.2. Risiko reducerende foranstaltninger

Se de brugsspecifikke foranstaltninger til afhjælpning af risici.

5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Anført i sikkerhedsdatabladet

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Tag forurenet tøj og sko af med det samme. Vask det, inden du bruger det igen.

Ved indånding: Flyt omgående personen ud i frisk luft og i en position, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af indånding af røg fra en brand, kan symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigeligt vand og sæbe. Fjern straks tilsmudset tøj og fodtøj. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Øjenkontakt: Skyl straks øjnene med rigeligt vand (mindst 15 minutter). Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Fjern evt. kontaktlinser. Søg lægehjælp hvis iritationen fortsætter.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er blevet slugt, og den eksponerede person er ved bevidsthed, gives personen små mængder at drikke. Fremkald ikke opkastning, medmindre det anvises af lægepersonalet. Søg lægehjælp.

Hvis der er behov for lægehjælp, skal du sørge for at have sikkerhedsdatabladet, produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner kendes.

Kemisk stabilitet: Produktet er kemisk stabilt under normale forhold (omgivelsestemperatur).

Risiko for farlige reaktioner: Ved tilsigtet brug kan der ikke forventes nogen farlige reaktioner.

Forhold, der skal undgås: Ikke fastslået.

Materialer, der skal undgås: Ikke fastslået.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendes.

Forholdsregler i forhold til udslip

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Bær beskyttelsestøj.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved risiko for kontakt med produktet. Handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktetdatabladet.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk/sprøjt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Hold antændelseskilder på afstand – rygning forbudt.

Vask huden grundigt efter brug.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes til kloak, overflade- eller grundvand.

Metoder og materiale til inddæmning og rengøring: Absorber med væskebindende materiale (sand, diatomit, syrebindende midler, universelle bindemidler, savsmuld). Bortskaf det opsamlede materiale i overensstemmelse med lovgivningen.

5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Anført i sikkerhedsdatabladet

Metoder til affaldsbehandling:

Efter afsluttet behandling bortskaffes rester og emballage i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Brugt produkt kan skylles ud i kloak eller gyllebeholder afhængigt af lokale krav. Undgå udledning til et særskilt spildevandsanlæg. Anbefalet rengøringsmiddel: Vand og evt. rengøringsmiddel.

5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Holdbarhed: 18 måneder

Produkter skal beskyttes mod frost, opbevares ved temperaturer på højst 30 °C og væk fra direkte sollys.

Opbevares utilgængeligt for børn.

6. Andre oplysninger