

# Biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauka

**Grupės pavadinimas:** Veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti grupė (Teat disinfection biocidal product family)

**Produkto tipas (-ai):** PT 03 - Veterinarinė higiena

**Autorizacijos liudijimo numeris:** LT/AP-BPV/2020/0275

**R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris:** LT-0020851-0000

## Turinys

I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo	1
1. Administracinė informacija	1
2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija	2
II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC	3
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 1</b>	3
2. Meta SPC sudėtis	3
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	4
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	7
6. Kita informacija	9
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	9
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 2</b>	10
2. Meta SPC sudėtis	10
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	11
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	11
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	13
6. Kita informacija	15
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	15
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 3</b>	16
2. Meta SPC sudėtis	16
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	17
4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	17
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	19
6. Kita informacija	20
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	20
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 4</b>	21
2. Meta SPC sudėtis	22
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	22

4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	22
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	34
6. Kita informacija	35
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	35
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 5</b>	37
2. Meta SPC sudėtis	37
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	38
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	38
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	40
6. Kita informacija	43
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	43
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 6a</b>	45
2. Meta SPC sudėtis	45
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	46
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	46
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	56
6. Kita informacija	57
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	57
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 6b</b>	58
2. Meta SPC sudėtis	58
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	59
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	59
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	68
6. Kita informacija	70
7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai	70
1. Meta SPC administravimo informacija - <b>Meta PCS 7</b>	71
2. Meta SPC sudėtis	71
3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės	72
4. Meta SPC autorizotas (-i) naudojimo būdas (-ai)	72
5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai	81

6. Kita informacija

82

7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

82

# I dalis. Pirmasis informacijos lygmuo

## 1. Administracinė informacija

### 1.1. Grupės pavadinimas

Veterinarinių biocidinių produktų speniams dezinfekuoti grupė (Teat disinfection biocidal product family)

### 1.2. Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

### 1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Evans Vanodine Europe
	Adresas	6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Airija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	LT/AP-BPV/2020/0275	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0020851-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	21/05/2019	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	21/05/2029	

### 1.4. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	„Evans Vanodine International“
<b>Gamintojo adresas</b>	Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė
<b>Gamybos vieta</b>	Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Jungtinė Karalystė

## 1.5. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1319 - Jodas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	„ACF Minera S.A.“
<b>Gamintojo adresas</b>	San Martin No. 499 - Iquique Čilė
<b>Gamybos vieta</b>	Lagunas Mine - Pozo Almonte Čilė

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1319 - Jodas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	„Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.“
<b>Gamintojo adresas</b>	Los Militares 4290, Piso 4 - Las Condes, Santiago Čilė
<b>Gamybos vieta</b>	Nueva Victoria Plant, Pedro de Valdivia Plant - Northern Chile (Šiaurės Čilė) Čilė

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1319 - Jodas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	„Cosayach Nitratos S.A.“
<b>Gamintojo adresas</b>	Hnos Amunategui 178 - Santiago Čilė
<b>Gamybos vieta</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Čilė

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1319 - Jodas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	„ISE Chemical Corporation“
<b>Gamintojo adresas</b>	Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Japonija
<b>Gamybos vieta</b>	Shirasato Plant - - Japonija

## 2. Produkto grupės sudėtis ir formuliacija

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,112 - 2,346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0,38 - 19,993

## 2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

AL - Bet koks kitas skystis

## II dalis. Antrasis informacijos lygmuo. meta SPC

### 1. Meta SPC administravimo informacija

#### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 1

#### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-1

#### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,112 - 0,12

Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (1.1 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	0,71 - 1,19
---------------------------------	---	-------------	-----------	-------------

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrasis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.



## Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

	ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau  Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Apmokytas profesionalas  Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Šią dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros. Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudot nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

##### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo produktu. Pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

##### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto

informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis :

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

**NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

--

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.  
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.  
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

## 6. Kita informacija

--

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

**Prekinis pavadinimas**

Pre-Dip

Rinka: LT

**Autorizacijos liudijimo numeris**

LT-0020851-0001 1-1

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,112
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0,953

---

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 2

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-2

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,25 - 0,33
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0,38 - 0,63

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

### 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

#### Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gali ėsdinti metalus.

#### Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.  
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.  
Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

### 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Po melžimo

#### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

#### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

#### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

#### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

#### Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas rankiniu būdu -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas rankiniu būdu:

Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
 Naudojimas po melžimo  
 Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
 Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
 karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
 avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
 ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -  
 Naudojimas po melžimo  
 Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatinio būdu:  
 karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
 avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
 ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą -  
 Naudojimas po melžimo  
 Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą:  
 karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
 avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
 ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Žr. aukščiau - - -  
 Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -  
 Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -  
 Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -  
 Žr. aukščiau

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas  
 Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l  
 Statinė (DTPE), 200 l  
 DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l



#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.  
Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.  
Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).  
Naudoti nepraskiestą.  
Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

##### 1. Mirkymas rankiniu būdu

Pripildyti ⅓ mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį.  
Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.  
Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.  
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

##### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.  
Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinu būdu  
Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.  
Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą  
Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Puršktuvas plaunamas automatiškai.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.  
Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

**NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptomatinį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą. Vengti patekimo į aplinką.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.  
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.  
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

## 6. Kita informacija

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	PV-Pro	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0002 1-2	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,291
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	0,5

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 3

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-3

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,269 - 0,5245
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2,304 - 4,4702

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Po melžimo – mirkymas rankiniu būdu

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas rankiniu būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

	<p>Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.</p> <p>Mirkymas rankiniu būdu:  karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Žr. aukščiau - - -  Žr. aukščiau</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Apmokytas profesionalas  Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l  Statinė (DTPE), 200 l  DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

## 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.  
Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).  
Naudoti nepraskiestą.  
Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas rankiniu būdu  
Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį.  
Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.  
Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
  - Prarijus: neskatinanti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
  - Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
  - Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.
- NEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominių ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

--

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

#### 6. Kita informacija

--

#### 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

##### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	Masofilm	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0003 1-3	



Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,269
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2,304

### Prekinis pavadinimas

Visqodip

Rinka: EU

### Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0004 1-3

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,5245
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4,4702

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 4

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-4

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,272 - 0,273
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2,31 - 2,31

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.  
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.  
Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Prieš melžimą

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Netaikoma  Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Netaikoma
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš melžimą  Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.  1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:  a. Mirkymas  karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui  b. Apdorojimas putomis  karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš melžimą</p> <p>Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <p>karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<p><b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b></p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
<p><b>Vartotojų kategorija (-os)</b></p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p><b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b></p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudokite nepraskiestą.

Šią dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros. Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

#### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti 2/3 mirkymo indo produktu. Pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

#### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

**4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

**4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

**4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

-

**4.2 Naudokite aprašymą**

**Naudojimas 2 - Po melžimo**

**Produkto tipas**

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrasis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

**Naudojimo sritis**

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>Mirkymas automatinio būdu - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Mirkymas automatinio būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas automatinio būdu naudojant robotą - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Automatinis purškimas naudojant robotą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<p><b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b></p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
<p><b>Vartotojų kategorija (-os)</b></p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p><b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b></p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos



## 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

### 3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

### 4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai

purškiamas ant spenių. Purkštuvą plaunamas automatiškai.

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei reikia dezinfekcijos prieš melžiant ir pamelžus, dezinfekcijai prieš melžiant reikėtų naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

Rankinis purškimas naudojant elektroninį purkštuvą:

Produkto tvarkymo etapu mūvėkite pirštines, atsparias cheminėms medžiagoms (pirštinių medžiagų leidimo prekiauti turėtojas turi nurodyti gaminio aprašyme).

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 4.3 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

##### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buvolių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrasis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

**Naudojimo sritis**

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -

Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

- karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

- avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

- ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš ir po melžimo

	<p>Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui</li> <li>• avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui</li> <li>• ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</li> </ul>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l</p> <p>Statinė (DTPE), 200 l</p> <p>DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

#### 1. Mirkymas rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

#### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:  
mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).  
Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

#### **4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

#### **4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

#### **4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

-

### **5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai**

#### **5.1. Naudojimo instrukcijos**

Žr. naudojimo instrukcijas.

#### **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

#### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

#### Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
  - Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
  - Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
  - Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.
- NEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:  
· suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

## 6. Kita informacija

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

**7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis**

**Prekinis pavadinimas**

Allantocare

Rinka: EU

Pre-Post Gold

Rinka: EU

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0005 1-4

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,272
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2,31

**Prekinis pavadinimas**

Contact

Rinka: LT

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0006 1-4

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,273
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	2,31



---

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 5

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-5

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,526 - 0,527
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4,479 - 4,492

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

AL - Bet koks kitas skystis

### 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

#### Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gali ėsdinti metalus.

#### Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.  
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.  
Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

### 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Po melžimo

#### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

#### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

#### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

#### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

#### Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:  
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis  
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas po melžimo  
Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi  
pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatiškai būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatiškai būdu:  
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatiškai būdu naudojant robotą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -  
Žr. aukščiau.

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l  
Statinė (DTPE), 200 l  
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

**4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

-

**4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės**

-

**4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką**

-

**4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

**4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

-

**5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai**

**5.1. Naudojimo instrukcijos**

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Naudoti nepraskiestą.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

#### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti 2/3 mirkymo indo produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad spenys būtų pamerktas per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

#### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

#### 3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

#### 4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.  
Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).  
Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

**NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti į mėšlo saugyklas, atsižvelgiant į vietinių taisyklių

reikalavimus. Draudžiama pilti į atskiros nuotekų valymo stoties sistemą.

Vengti patekimo į aplinką.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.

Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

.

## 6. Kita informacija

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

#### Prekinis pavadinimas

Masocare Extra

Rinka: LT

#### Autorizacijos liudijimo numeris

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0007 1-5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,526

Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	4,479
---------------------------------	--	-------------	-----------	-------

**Prekinis pavadinimas**

Masocare RTU

Rinka: LT

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0008 1-5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,526
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	4,479

**Prekinis pavadinimas**

Masodine RTU

Rinka: LT

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0009 1-5

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,527



Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)	157627-86-6	500-337-8	4,492
---------------------------------	--	-------------	-----------	-------

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 6a

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-6

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,881 - 1,191
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	7,448 - 10,076

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

### 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali ėsdinti metalus.
<b>Pavojingumo frazės</b>	Laikyti tik originalioje pakuotėje. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

### 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 1 - Prieš melžimą

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Netaikoma  Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Netaikoma
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.  Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu Naudojimas prieš melžimą Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –

	<p>mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:</p> <p>a. Mirkymas  karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>b. Apdorojimas putomis  karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui  ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  Naudojimas prieš melžimą  Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –  mažiausiai 60 sekundžių.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Žr. aukščiau - - -  Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - -  Žr. aukščiau.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l  Statinė (DTPE), 200 l  DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemines medžiagas atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-
---

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Po melžimo

###### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

###### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

###### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

###### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

###### Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu  
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis  
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

	<p>avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Mirkymas automatinio būdu - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Mirkymas automatinio būdu: karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui</p> <p>Purškimas automatinio būdu naudojant robotą - Naudojimas po melžimo</p> <p>Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).</p> <p>Automatinis purškimas naudojant robotą: karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</p>
<p><b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b></p>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p>
<p><b>Vartotojų kategorija (-os)</b></p>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<p><b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b></p>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

## 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Įpilti 1 dalį produkto į 3 dalis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

### 1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

### 3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

#### 4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Puršktuvas plaunamas automatiškai.

### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

## 4.3 Naudokite aprašymą

### Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

**Produkto tipas**

PT 03 - Veterinarinė higiena

**Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas**

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo



**Kontroliuojamas (-i)  
organizmas (-ai) (įskaitant  
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

**Naudojimo sritis**

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

- karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

- karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir  
dažnis**

Žr. aukščiau - - -

Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -

Žr. aukščiau.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l  
Statinė (DTPE), 200 l  
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

**4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

#### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

#### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.

- Prarijus: neskatinti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.  
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.  
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

#### 6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

#### 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

## 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksliai sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	Pro-Tec 1:3	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0010 1-6	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,036
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	8,762

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 6b

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-7

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

## 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,646 - 2,228
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	14,034 - 16,51

## 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

## 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Gali ėsdinti metalus.

Pavojingumo frazės

Laikyti tik originalioje pakuotėje.  
Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.  
Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.

## 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Prieš melžimą

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą

**Kontroliuojamas (-i)  
organizmas (-ai) (įskaitant  
vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

**Naudojimo sritis**

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas prieš melžimą  
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –  
mažiausiai 60 sekundžių.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu  
Naudojimas prieš melžimą  
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –  
mažiausiai 60 sekundžių.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –  
mažiausiai 60 sekundžių.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir  
dažnis**

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -  
Žr. aukščiau.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas



## Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

DTPE talpykla, 5–25 l  
Statinė (DTPE), 200 l  
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 7 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

#### 1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

#### 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.  
Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Po melžimo

##### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrasis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrasis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

##### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

## Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi  
pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu  
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis  
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Rankinis purškimas naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi  
pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatinio būdu:  
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

## Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -  
Žr. aukščiau.

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

	Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Apmokytas profesionalas  Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Įpilti 1 dalį produkto į 3 dalis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

##### 1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

## 2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

## 3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

## 4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-
---

#### 4.3 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Netaikoma  Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Netaikoma
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu - Naudojimas prieš ir po melžimo  Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (2–6 kartus per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.  1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu: a. Mirkymas • karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui  b. Apdorojimas putomis • karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui • avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui • ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui  Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą - Naudojimas prieš ir po melžimo  Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –

	<p>mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.</p> <p>2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui</li> <li>• avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui</li> <li>• ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui</li> </ul>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Žr. aukščiau - - - Žr. aukščiau</p> <p>Žr. aukščiau. - - - Žr. aukščiau.</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	<p>Apmokytas profesionalas</p> <p>Profesionalas</p>
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	<p>DTPE talpykla, 5–25 l Statinė (DTPE), 200 l DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l</p>

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

<p>Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.</p> <p>Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.</p> <p>Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes). Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.</p> <p>Paruošti šviežią tirpalą kasdien.</p> <p>Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.</p> <p>Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.</p> <p>Prieš melžimą ir po melžimo naudojamų tirpalų atskiedimas skiriasi, todėl reikia naudoti atskirus mirkymo indus. Žr. konkrečias instrukcijas. Prieš melžimą – gerai išmaišyti 1 dalį produkto su 7 dalimis švaraus vandens. Po melžimo – gerai išmaišyti 1 dalį produkto su 3 dalimis švaraus vandens.</p> <p>1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu Pripildyti 2/3 mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu. Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.</p>
--

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškoms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034).

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.



## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

## 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

· Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.

· Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.

· Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.

· Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

**NEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS**

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

- suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

## 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.  
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.  
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

## 6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

## 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

### 7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

<b>Prekinis pavadinimas</b>	Masodine 1:3	Rinka: LT
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b> <small>(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)</small>	LT-0020851-0011 1-7	

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	1,937
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	16,51

---

## 1. Meta SPC administravimo informacija

### 1.1. meta SPC identifikatorius

Meta PCS 7

### 1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

1-8

### 1.3 Produkto tipas (-ai)

PT 03 - Veterinarinė higiena

## 2. Meta SPC sudėtis

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie meta SPC sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2 - 2,346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	18 - 19,993

### 2.2. Meta SPC formuliacijos tipas (-ai)

Formuliacia (-os)

SL - Vandenyje tirpūs koncentratas

### 3. Meta SPC pavojingumo ir atsargumo frazės

<b>Pavojingumo kategorijos</b>	<p>Smarkiai pažeidžia akis.</p> <p>Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Gali ėsinti metalus.</p>
<b>Pavojingumo frazės</b>	<p>Laikyti tik originalioje pakuotėje.</p> <p>Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.</p> <p>Laikyti , turinčioje atsparią vidinę dangą.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>turinį išpilti (išmesti) į vietos / regiono / nacionalinių taisyklių.</p> <p>Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Nedelsiant skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją..</p>

### 4. Meta SPC autorizuotas (-i) naudojimo būdas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Prieš melžimą

<b>Produkto tipas</b>	PT 03 - Veterinarinė higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivolų, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš melžimą.
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Netaikoma  Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Netaikoma
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

**Naudojimo metodas (-ai)**

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas prieš melžimą  
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu  
Naudojimas prieš melžimą  
Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

**1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:****a. Mirkymas**

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

**b. Apdorojimas putomis**

karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -

Naudojimas prieš melžimą

Naudoti prieš kiekvieną melžimą kasdien (1–3 kartus per dieną).

Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių.

**2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:**

karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui

avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui

ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Žr. aukščiau - - -

Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -

Žr. aukščiau.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l

Statinė (DTPE), 200 l

DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

**4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos**

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 9 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu.

Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nususinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nususinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai po melžimo reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mūvėti apsaugines chemiškai atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-
---

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Po melžimo

###### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

###### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti po melžimo.

###### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

###### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

###### Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu  
a. Mirkymas

karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis  
karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).  
Naudojant rankiniu būdu, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.  
2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

Mirkymas automatinio būdu -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Mirkymas automatinio būdu:  
karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas automatinio būdu naudojant robotą -  
Naudojimas po melžimo

Naudoti po kiekvieno melžimo kasdien (1–3 kartus per dieną).

Automatinis purškimas naudojant robotą:  
karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui  
avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui  
ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -  
Žr. aukščiau.

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l  
Statinė (DTPE), 200 l  
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l



## 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Sumaišyti 1 dalį produkto su 4 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, įsitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

1. Mirkymas /apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu. Iškart po melžimo pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnę nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

3. Mirkymas automatinio būdu

Suveikus automatinei melžiklių nuėmimo (ACR) sistemai, speniai yra padengiami atskiestu produktu.

Visas procesas yra automatizuotas.

4. Automatinis purškimas naudojant robotą

Robotas automatiškai nuvalo spenius šepetėliais. Robotui baigus melžimo procedūrą, atskiestas produktas iš roboto „rankos“ automatiškai purškiamas ant spenių. Purkštuvus plaunamas automatiškai.

## 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei būtina dezinfekciją atlikti prieš ir po melžimo, dezinfekcijai prieš melžimą reikia rinktis kitą produktą, kurio sudėtyje nėra jodo.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu, mirkymas automatinio būdu ir purškimas automatinio būdu naudojant robotą:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 4.3 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 3 - Prieš ir po melžimo

##### Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

##### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

VETERINARINĖS HIGIENOS DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ: melžiamų gyvulių (karvių, buivių, avių, ožkų) speniams dezinfekuoti prieš ir po melžimo.

##### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos  
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos  
Vystymo stadija: Netaikoma

Mokslinis pavadinimas: Mielės  
Bendrinis pavadinimas: Mielės  
Vystymo stadija: Netaikoma

##### Naudojimo sritis

vidaus

Naudojimas patalpose – melžiamų gyvūnų speniai.

##### Naudojimo metodas (-ai)

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu -  
Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas –

mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu:

a. Mirkymas

- karvės ir buivolės: 10 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 6 ml gyvūnui vienam kartui

b. Apdorojimas putomis

- karvės ir buivolės: 5 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 2,5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 3 ml gyvūnui vienam kartui

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą -  
Naudojimas prieš ir po melžimo

Naudoti prieš ir po kiekvieno melžimo kasdien (iki 5 kartų per dieną). Naudojant rankiniu būdu prieš melžimą, užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Poveikio laikas – mažiausiai 60 sekundžių. Naudojant po melžimo užtikrinti, kad būtų padengtas visas spenys. Karvė turi pastovėti mažiausiai 5 minutes.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

- karvės ir buivolės: 10–15 ml gyvūnui vienam kartui
- avys: 5–7,5 ml gyvūnui vienam kartui
- ožkos: 7–10 ml gyvūnui vienam kartui

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Žr. aukščiau - - -  
Žr. aukščiau

Žr. aukščiau. - - -  
Žr. aukščiau.

**Vartotojų kategorija (-os)**

Apmokytas profesionalas

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

DTPE talpykla, 5–25 l  
Statinė (DTPE), 200 l  
DTPE vidutinės talpos (IBC) konteineris, 1000 l

### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekavimo priemonę prieš naudojant reikia pašildyti iki aukštesnės nei 20 °C temperatūros.

Rekomenduojama priemonę pilti į prietaisą naudojant dozatorių.

Po melžimo: siekiant užtikrinti pakankamą sąlyčio trukmę reikia užtikrinti, kad užpurkštas produktas nebūtų pašalintas (užtikrinkite, kad karvės stovėtų bent 5 minutes).

Prieš naudojant, šį produktą reikia atskiesti.

Prieš melžimą ir po melžimo naudojamų tirpalų atskiedimas skiriasi, todėl reikia naudoti atskirus mirkymo indus. Žr. konkrečias instrukcijas.

Paruošti šviežią tirpalą kasdien.

Skiedimo indai turi būti švarūs ir tinkami naudoti.

Prieš naudojant šį produktą, išitikinti, kad tešmuo ir speniai yra švarūs ir sausi.

Prieš melžimą – sumaišyti 1 dalį produkto su 9 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

Po melžimo – sumaišyti 1 dalį produkto su 4 dalimis švaraus vandens ir gerai išmaišyti.

1. Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu

Pripildyti  $\frac{2}{3}$  mirkymo indo atskiestu produktu. Prieš melžimą pamerkti spenius, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Užtikrinti ne trumpesnį nei 60 sekundžių trukmės sąlyčio laiką, po to vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu spenius kruopščiai nuvalyti ir nusausinti.

Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

Iškarto po melžimo pamerkti spenius į atskiestą produktą, užtikrinant, kad speniai būtų pamerkti per visą ilgį. Prireikus papildyti šviežiu tirpalu.

Po naudojimo ištuštinti ir išplauti mirkymo indus vandeniu.

2. Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą

Prieš melžimą spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

Palikti priemonę ant spenių bent 60 sekundžių. Tada kruopščiai nuvalyti ir nusausinti spenius vienkartinio naudojimo popieriniu rankšluosčiu.

Iš karto po melžimo spenius apipurkšti atskiestu produktu. Užtikrinti, kad produktas padengtų visą spenių paviršių.

#### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Mirkymas / apdorojimas putomis rankiniu būdu, mirkymas automatinio būdu ir purškimas automatinio būdu naudojant robotą:

Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

Purškimas rankiniu būdu naudojant elektroninį purkštuvą:

Naudojant rankinio purškimo būdu mėvėti apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą produkto informacijoje nurodo autorizacijos liudijimo turėtojas).

Naudojant šį gaminį, avėti tinkamą apsauginę avalynę (EN 13832); vilkėti apsauginį kombinezoną (bent 6 tipo, EN 13034). Akių apsauga naudojant produktą yra privaloma.

#### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

#### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

### 5. Meta SPC naudojimo bendrieji nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. konkrečias rizikos mažinimo priemones.

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Tikėtinas tiesioginis ar netiesioginis poveikis:

- akių dirginimas;
- bendras diskomfortas prarijus.

Pirmosios pagalbos priemonės

- Įkvėpus: mažai tikėtinas poveikio būdas, nes gaminyje nėra lakiųjų medžiagų. Įkvėpus purškalo / rūko, nukentėjusį asmenį perkelti į gryną orą ir laikyti jį šiltai ir ramioje padėtyje, kad būtų galima lengvai kvėpuoti.
- Prarijus: neskatinėti vėmimo. Duoti gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją, jeigu diskomfortas nepraeina.
- Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens.
- Patekus į akis: nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Jei išplovus akis atsiranda simptomai, greitai kreiptis į gydytoją.

NIEKADA NEPALIKITE PAVEIKTO ASMENS BE PRIEŽIŪROS

Patarimai medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams:

· suteikti simptominį ir palaikomąjį gydymą.

KREIPDAMIESI MEDICININĖS PAGALBOS, PO RANKA TURĖTI PAKUOTĘ ARBA ETIKETĘ IR SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ (+370 52362052, +370 687 53 378).

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigus apdorojimą, nepanaudotą produktą, pakuotę ir bet kokias užterštas medžiagas šalinti pagal vietos reikalavimus. Neišpilti į kanalizaciją.

#### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Tinkamumo naudoti laikas – 24 mėnesiai.  
Laikyti originalioje uždaroje talpoje ir saugoti nuo ekstremalių temperatūrų.  
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.  
Saugoti nuo šalčio; jei turinys užšąla, prieš naudojimą jis turi būti atšildytas ir gerai sumaišytas.  
Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
Laikyti žemesnėje nei 25 °C temperatūroje

#### 6. Kita informacija

Atkreipkite dėmesį, kad jei papildoma ši „Meta-PCS“ grupė, naudojimo koncentracijos turi būti ribose, kurioms taikomas aplinkos rizikos vertinimas.

#### 7. Trečiasis informacijos lygmuo: meta SPC atskiri produktai

7.1 Kiekvieno atskiro produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos numeris ir tiksli sudėtis

**Prekinis pavadinimas**

Masocare 1:4

Rinka: LT

**Autorizacijos liudijimo numeris**

(R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris - Nacionalinė autorizacija)

LT-0020851-0012 1-8

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	2,346
Alkoholiai, C13-15, etoksilinti	alkoholiai, C13-15, etoksilinti (11 mol EO vidutinis molinis santykis)		157627-86-6	500-337-8	19,993