



Bratislava, 15. februára 2022
Naša značka: 20280/2022-4320-25383
Ref. číslo: bio/475/O/22/RM
Opravené dňa: 16.03.2022

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko** identifikačné číslo **BC-MA070055-59** o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku, podanej podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **21.09.2021** v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch v spojení s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovenia autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) a s článkom 52 nariadenia o biocídnych výrobkoch rozhodlo tak, že

**autorizuje biocídny výrobok
na základe postupného vzájomného uznania**

Názov biocídneho výrobku: **Ratimor Plus parafínové bloky**
Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK22-003**
Platnosť autorizácie do: **27. augusta 2025**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu obnovy autorizácie biocídneho výrobku č. SI-0017954-0000 platnej do 27.08.2025 a udelenej príslušným orgánom referenčného členského štátu Slovinsko dňa 27.08.2020;

a pre prípad, keď nebude predložená žiadosť o obnovenie tejto autorizácie v lehote podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch a/alebo nariadenia o obnovách poskytuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob tohto biocídneho výrobku na trhu do 13.02.2026 a ďalšiu lehotu na jeho použitie do 02.08.2026 v súlade s príslušnou legislatívou.

Odôvodnenie:

Žiadateľ Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko doručeními žiadosti identifikačné číslo BC-MA070055-59 zo dňa 21.09.2021 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku č. SI-0017954-0000 udelenej rozhodnutím o obnove autorizácie platnej do 27.08.2025 príslušným orgánom referenčného členského štátu Slovinsko dňa 27.08.2020.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o biocídnych výrobkoch. Vykonaním hodnotenia biocídneho výrobku MH SR dospelo k záveru, že biocídny výrobok definovaný v predloženej zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocídny výrobok môže sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizáciách biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

Poučenie:

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznámenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.
generálny riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko**

Príloha 1

Bratislava, 15. februára 2022
Naša značka: 20280/2022-4320-25383
Ref. číslo: bio/475/O/22/RM
Opravené dňa: 16.03.2022

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	Ratimör Plus parafinové bloky
Obchodný názov	Ratimör Plus parafinové bloky

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Unichem d.o.o
	Adresa	Sinja Gorica 2, SI 1360 Vrhnika, Slovinsko
Číslo autorizácie	SK22-003	
<i>R4BP žiadosť o autorizáciu č.</i>	BC-MA070055-59	
Dátum autorizácie	15. februára 2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	27. augusta 2025	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	Unichem d.o.o
Adresa výrobcu	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovinsko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Bromadiolón
Názov výrobcu	Activa Srl
Adresa výrobcu	Via Feltre 32, 20132 Milan, Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22, 37050 S.Maria di Zevio, Taliansko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krvi) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH208 Obsahuje oktilinón (ISO); 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenia	P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi nariadeniami.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu I4 - Rodenticidy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticidy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení myšami použite 10 g až 40 g návnady na jedno návnadové miesto. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosť balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 40g), (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 100g - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 100g - balené v PE alebo PP vedrách až do 100g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 100g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 100g – v prednaplnenej alebo opakovane plniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke pre myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov po 5 g – 40 g (do 40 g celkovej návnady na jednu staničku). Deratizačné staničky balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 100g.

	<p>- v HDPE alebo PP deratizačnej staničke pre myši (na opakované alebo jednorazové použitie) obsahujúcej jednu alebo viac 5 g – 40 g (do 40 g celkovej návnady na jednu staničku). Deratizačné staničky balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 100g.</p> <p>V prípade kombinovaného balenia proti potkanom a myšiam je maximálne balenie do 300g výrobku na neprofesionálne použitie.</p>
--	--

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalů

Odporúča sa používať rukavice.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -</p>
Oblasť použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení potkanmi použite 10 g až 200 g návnady na jedno návnadové miesto. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosť balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 200g), (s hákom/drôtom alebo bez nich); - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 300g - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g - balené v PE alebo PP vedrách až do 300g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g – v prednáplnenej alebo opakovane plniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej stanici pre potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov po 5 g – 200 g (do 200 g celkovej návnady na jednu stanicu pre potkany). Deratizačné stanice balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 300 g. – v HDPE alebo PP deratizačnej stanici na potkany (na opakované alebo jednorazové použitie) obsahujúcej jednu alebo viac 5 g – 200 g (do 200 g celkovej návnady na jednu stanicu na potkany). Deratizačné stanice balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 300 g.

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné stanice by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hľadavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Odporúča sa používať rukavice.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu I4 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnědý Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení potkanmi použite 10 g až 200 g návnady na jedno návnadové miesto. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosť balenia a obalový materiál	Voľné bloky (5g – 200g), (s háčikom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 300g - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 300g - balené v PE alebo PP vedrách až do 300g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 300g - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 300g - v prednaplnenej alebo opakovane plniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke pre potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov po 5 g – 200 g (do 200 g celkovej návnady na jednu staničku pre potkany). Deratizačné staničky balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 300 g. - v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (na opakované alebo jednorazové použitie) obsahujúcej jednu alebo viac 5 g – 200 g (do 200 g celkovej návnady na jednu staničku na potkany). Deratizačné staničky balené vo vonkajšej kartónovej alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo v tepelne uzavretej fólii do 300 g.

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Odporúča sa používať rukavice.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.4. Opis použitia

Použitie 4 – Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticidy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticidy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení myšami použite 10 g až 40 g návnady na jedno návnadové miesto. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosť balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 40g), (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac

	<p>blokov od 5g až do 40g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myši). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p> <p>- balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši (plniteľná alebo jednorazová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 40g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myši). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p>
--	---

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tieň hľadavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.5. Opis použitia

Použitie 5 – Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu I4 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -</p>
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení potkanmi použite 10 g až 200 g návnady na jedno návnadové miesto. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanica, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosť balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné bloky (5g - 200g), (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej stanici na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej stanici na potkana). Deratizačné stanice balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej stanici na potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej stanici na potkana). Deratizačné stanice potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné stanice by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené, a kvôli odstráneniu tieh hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné stanice blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.6. Opis použitia

Použitie 6 – Myš domová a/alebo potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu I4 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádiá: -</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: -</p> <p>Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -</p>
Oblasť použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Pri zamorení myšami použite 10 g až 40 g návnady na jedno návnadové miesto. Pri zamorení potkanmi použite 10 g až 200 g návnady na jedno návnadové miesto.</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p>
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné (5 g - 40 g pre myši) alebo (5 g - 200 g pre potkany) bloky (s hákom/drôtom alebo bez nich) zabalené: - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g</p>

	až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.
--	---

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Deratizačné staničky sa majú kontrolovať [v prípade myši – najmenej každé 2 až 3 dni] [v prípade potkanov – len každých 5 až 7 dní] na začiatku procesu deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov.

V prípade potreby doplňte návnadu.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochránu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.7. Opis použitia

Použitie 7 – Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory

Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou. Trvalé umiestnenie návnad.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Návnady, vrátane trvalého umiestnenia: Myši: 10-40g návnady na jeden bod s návnadou. Potkany: 10-200g návnady na jeden bod s návnadou. Počet a časový rozvrh aplikácie: Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre. Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov. Pri trvalom umiestnení návnad umiestnite návnadové miesta podľa pokynov pre nízke zamorenie.
Kategória používateľov	Vyškolенý profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné (5 g - 40 g pre myši) alebo (5 g - 200 g pre potkany) bloky (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany (plniteľná alebo jednorazová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Pri použití pri trvalom umiestnení návnad:

Interval pravidelnej kontroly návnad pri trvalom umiestnení návnad na otvorených plochách a skládkach odpadu nebude dlhší ako každých 5 až 7 dní.

4.7.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používatel'ov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy vyhl'adávajte a odstraňujte uhynuté hlodavce počas ošetrovania v častých intervaloch.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Pri použití v trvalom ošetrovaní návnadami:

- Trvalé umiestnenie návnad je striktné obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné. Môže sa použiť len výnimočne a po dôkladnom zvážení možného rizika reinvázie hlodavcov.

- Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizik pre opätovné zamorenie.

4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné stanice blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.8. Opis použitia

Použitie 8 – Myš domová a/alebo potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: Myš domová Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady

	<p>Detailný opis:</p> <p>Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.</p> <p>Návnada na okamžité použitie do zakrytých a chránených miest s návnadou. Trvalé umiestnenie návnad.</p> <p>Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.</p>
Dávkovanie a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Návnady, vrátane trvalého umiestnenia: Myši: 10-40g návnady na jeden bod s návnadou. Potkany: 10-200g návnady na jeden bod s návnadou. Aplikácia do brlohov: 10 g až 200 g návnady na jednu noru.</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie:</p> <p>Myši: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5 metrov, pri veľkom zamorení 2 metre.</p> <p>Potkany: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 10 metrov, pri veľkom zamorení 5 metrov.</p> <p>Pri trvalom umiestnení návnad umiestnite návnadové miesta podľa pokynov pre nízke zamorenie.</p>
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg.</p> <p>Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg.</p> <p>Voľné (5 g - 40 g pre myši) alebo (5 g - 200 g pre potkany) bloky (s hákom/drôtom alebo bez nich):</p> <ul style="list-style-type: none"> - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na myši alebo potkany (plniteľná alebo jednorázová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 40g celkovej návnady v deratizačnej staničke na myš alebo až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). <p>Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.</p>

4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia ošetrovania odstráňte zvyšný prípravok (okrem prípadov, keď sa aplikuje priamo do brlohu).

Ak sa používa v krytých a chránených miestach s návnadou:

Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov

Pri použití pri trvalom umiestnení návnad:

Interval pravidelnej kontroly návnad pri trvalom umiestnení návnad na otvorených plochách a skládkach odpadu nebude dlhší ako každých 5 až 7 dní.

Pri aplikácii priamo do brlohov:

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia ne cieľových druhov zvierat a detí.

Zakryte alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

4.8.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy vyhládavajte a odstraňujte uhynuté hlodávce počas ošetrovania v častých intervaloch.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Pri použití v trvalom ošetrovaní návnadami:

- Trvalé umiestnenie návnad je striktne obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné. Môže sa použiť len výnimočne a po dôkladnom zvážení možného rizika reinvázie hlodavcov.

- Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

4.8.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.9. Opis použitia

Použitie 9 – Potkany – vyškoľení profesionáli – vonkajšie otvorené plochy a skládky odpadu

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: - Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: Potkan tmavý Vývojové štádium: -

Oblasť použitia	Vonkajšie Otvorené plochy a skládky odpadu
Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Kryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu. Trvalé umiestnenie návnad.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Návnady, vrátane trvalého umiestnenia: Potkany: 10-200g návnady na jeden bod s návnadou. Aplikácia do brlohov: 10 g až 200. Počet a časový rozvrh aplikácie: Pri slabom zamorení umiestnite návnadové miesta vo vzdialenosti 10 m od seba a pri silnom zamorení vo vzdialenosti 5 m od seba. Pri trvalom umiestnení návnad umiestnite návnadové miesta podľa pokynov pre nízke zamorenie.
Katégoria používateľov	Vyškolенý profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné (5 g - 200 g pre potkany) bloky (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (plniteľná alebo jednorazová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termo tesniacej fólii až do 20 kg.

4.9.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred atmosférickými podmienkami. Umiestnite miesta s návnadou do oblastí, ktoré nie sú vystavené záplavám.

Výmeňte všetky návnady v miestach s návnadou, ktoré boli poškodené vodou alebo znečistené.

Na konci obdobia ošetrovania odstráňte zvyšný prípravok (okrem prípadov, keď sa aplikuje priamo do nory).

Ak sa používa v krytých a chránených miestach s návnadou:

Na vonkajšie použitie miesta s návnadou musia byť zakryté a umiestnené na strategických lokalitách, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov.

Pri použití pri trvalom umiestnení návnad:

Interval pravidelnej kontroly návnad pri trvalom umiestnení návnad na otvorených plochách a skládkach odpadu nebude dlhší ako každých 5 až 7 dní.

Pri aplikácii priamo do brlohov:

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia necieľových druhov zvierat a detí. Zakryté alebo zablokujte vstupy do brlohov s návnadou, aby ste znížili riziko odmietnutia a vysypania návnady.

4.9.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy vyhľadávajte a odstraňujte uhynuté hlodavce počas ošetrovania v častých intervaloch.

Nepoužívajte výrobok v pulznych procesoch ukladania návnad.

Prí použití v trvalom ošetrovaní návnadami:

- Trvalé umiestnenie návnad je striktno obmedzené na miesta s vysokým potenciálom opätovnej invázie, keď sa ostatné metódy kontroly preukázali ako nedostatočné. Môže sa použiť len výnimočne a po dôkladnom zvážení možného rizika reinvázie hlodavcov.
- Stratégia trvalého umiestnenia návnad sa pravidelne reviduje v rámci integrovanej ochrany proti škodcom a posúdenia rizík pre opätovné zamorenie.

4.9.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádzy, závlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.9.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.9.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

4.10. Opis použitia

Použitie 10 – Potkan hnedý - vyškolení profesionáli - kanalizácie

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štádium: -
Oblasť použitia	Kanalizácie
Spôsoby aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v zakrytých a chránených miestach s návnadou, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Pri zamorení potkanmi v kanalizácii použiť 10-200g návnady na šachtu. Počet a časový rozvrh aplikácie: Pri vysokom zamorení použiť 200g na šachtu.
Katégoria používateľov	Vyškolенý profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balenia 1,5 kg. Maximálna vonkajšia veľkosť balenia do 25 kg. Voľné (5 g - 200 g pre potkany) bloky (s hákom/drôtom alebo bez nich): - zabalené v polyetylénových (PE) alebo polypropylénových (PP) alebo PE/PP alebo papierových/PE vreciach v kartónových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v PE alebo PP baleniach až do 25 kg - balené v PE alebo PP kontajneroch až do 25 kg - balené v HDPE alebo PP vedrách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách až do 20 kg - zabalené v lepenkových alebo drevovláknitých debnách s PE vreckom alebo vložkou až do 20 kg - bloky v Natron taške až do 25 kg - balené v naplnenej alebo znovu naplniteľnej HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany odolnej voči manipulácii, ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termó tesniacej fólii až do 20 kg. - balené v HDPE alebo PP deratizačnej staničke na potkany (pliteľná alebo jednorazová), ktorá obsahuje jeden alebo viac blokov od 5g až do 200g (až do 200g celkovej návnady v deratizačnej staničke na potkana). Deratizačné staničky potom balené vo vonkajšom kartónovom obale alebo plastovej tepelne uzavretej nádobe alebo termó tesniacej fólii až do 20 kg.

4.10.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavené.

4.10.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Umiestnite návnady len do kanalizačných systémov, ktoré sú pripojené na čistiareň odpadových vôd. Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad alebo ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

4.10.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.10.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.10.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pásce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hľadavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď je to možné, deratizačné staničky musia byť pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staničky.

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hľadavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelech, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú

rezistentné, takže zväžte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné; alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zväžte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staníčky.

Tréning profesionálov:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad).

Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťažuje dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, peľochy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staníčky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staníčky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozrite oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

[Ak to vyžadujú národné pravidlá alebo legislatíva] Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantmi a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtrhnúť preč od deratizačnej staníčky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (EN 374).

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia kontroly deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zväžte presun deratizačných staníčiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zväžte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zväžte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu a deratizačné staníčky.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Široká verejnosť:

Zväžte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staníčkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staníčkách odolných voči manipulácii“)

- používatelia musia náležite označiť deratizačné staníčky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staníčky podľa odporúčaní o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnejšej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú

deratizačné staničky.

Mŕtve hľadavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami [Spôsob likvidácie musí byť osobitne opísaný v národnom SPC a uvedený na etikete výrobku].

Profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hľadavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hľadavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hľadavcami alebo na monitorovanie činnosti hľadavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“)
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)
- používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3. SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčani o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hľadavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnovej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hľadavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hľadavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami [Spôsob likvidácie musí byť osobitne opísaný v národnom SPC a uvedený na etikete výrobku].

Trénovaní profesionáli:

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hľadavcov [v súlade s platným kódexom osvedčených postupov, ak existuje]. V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie, pokiaľ nie je autorizované trvalé umiestnenie návnady.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zväzťe použitie neantikoagulantného rodenticidu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou deratizačné staničky ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrýtych a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hľadavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami [Spôsob likvidácie musí byť osobitne opísaný v národnom SPC a uvedený na etikete výrobku].

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce d'asna. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
 - zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
 - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí
- Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu

výrobku. Ak výrobok prehltne domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [tel: 00421 2 54 77.41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami [Spôsob likvidácie musí byť osobitne opísaný v národnom SPC a uvedený na etikete výrobku].

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajúte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajúte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo.

- koniec dokumentu -

