

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

MAGNUM GEL CUCARACHAS

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev

Številka dovoljenja: SI-0032372-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0032372-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
4.2. Opis uporabe	7
4.3. Opis uporabe	8
4.4. Opis uporabe	10
4.5. Opis uporabe	11
4.6. Opis uporabe	13
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	15
5.1. Navodila za uporabo	15
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	15
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	15
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	15
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	15
6. DRUGE INFORMACIJE	16

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	MAGNUM GEL ROACHES EC GEL ROACHES X GEL ROACHES Orphea Vaba za ščurke Fiorand Ščurki Gel
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	MYLVA S.A.
	Naslov	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Španija
Številka dovoljenja		SI-0032372-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0032372-0000
Datum dovoljenja		21/02/2024
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	MYLVA, S.A.
Naslov proizvajalca	Via Augusta, 48 08006 Barcelona (Espanja) Telefono: +34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344 08006 BARCELONA Španija
Kraj proizvodnih obratov	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395- Barcelona (Espanja) 08395 BARCELONA Španija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Imidaklopid
Ime proizvajalca	ADAMA Agriculture España S.A.
Naslov proizvajalca	Principe de Vergara 110-5 ^a 28002 Madrid Španija
Kraj proizvodnih obratov	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Izrael Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd-39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou Kitajska

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208: Vsebuje <name of sensitising substance>. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P391: Prestreči razlito tekočino. P501: Odstraniti vsebino / embalažo v skladu z lokalnimi predpisi...

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Uporaba 1 – Notranji prostori, razpoke in špranje, vaba v gel, ki se nanese v obliki kapljic – splošna javnost (neprofesionalni uporabnik).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj zaprti prostori, razpoke in špranje
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic. Podroben opis: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic
Odmarki in pogostost uporabe	Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0'04 g). Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0'04 g). nemški ščurek (<i>Blattella germanica</i>): 0'12-0'16 g/m ² (3-4 kaplice/m ²). orientalski ščurek (<i>Blatta orientalis</i>): 0'16-0'24g/m ² (4-6 kapljic/m ²) ameriški ščurek (<i>Periplaneta Americana</i>): 0'16g/m ² -0'24 g/m ² (4-6 kapljic/m ²) pogostost nanosa : 1 nanos čez 4 tedne. Ponoviti največ enkrat, če so ščurki še vedno prisotni. Pri enem nanosu v eni hiši ne nanesite več kot 12 kapljic. Pogostost uporabe : tri mesece po koncu infestacije, se lahko biocid ponovno uporabi
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	LDPE plasticne brizge of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10g

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Biocidni pripravek nanašajte le v razpoke in špranje, za pohištvo in motorji. Izdelka ni mogoče uporabiti na površinah.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali na območjih, ki so bila pred kratkim tretirana z drugim insekticidom.
Ne uporabljajte na lesenih ali poroznih površinah.
Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.
Kapljič vabe ne izpostavljajte sončni svetlobi ali viru toplote. (npr. radiator).

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Preprečiti stik z očmi in kožo.

Izdelka ne nanašajte na mesta, ki so dostopna otrokom.

Nanašajte le na mesta, ki niso na dosegu živali.

Ne nanašajte na površine ali pripomočke, ki so lahko v stiku s krmo/živili.

Uporabljajte samo na skritih mestih, ki so težko dostopna in proč od vode.

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Uporaba 2 – Notranji prostori, razpoke in špranje – vaba v gelu, ki se nanese kot kapljice – profesionalni uporabnik.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj zaprti prostori, razpoke in špranje
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic. Podroben opis: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0,04 g). Redčenje (%): 0

	Število in časovni raspored uporabe: Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0'04 g). nemški ščurek (<i>Blattella germanica</i>): 0'12-0'16 g/m ² (3-4 kaplice/m ²). orientalski ščurek (<i>Blatta orientalis</i>): 0'16-0'24g/m ² (4-6 kapljic/m ²) ameriški ščurek (<i>Periplaneta Americana</i>): 0'16g/m ² -0'24 g/m ² (4-6 kapljic/m ²) pogostost nanosa : 1 nanos čez 4 tedne. Ponoviti največ enkrat, če so ščurki še vedno prisotni. Pri enem nanosu v eni hiši ne nanesite več kot 12 kapljic. Pogostost uporabe : tri mesece po koncu infestacije, se lahko biocid ponovno uporabi .
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	LDPE plasticne brizge po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10g

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Biocidni pripravek nanašajte le v razpoke in špranje, za pohištvo in motorji. Izdelka ni mogoče uporabiti na površinah.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali na območjih, ki so bila pred kratkim tretirana z drugim insekticidom.

Ne uporabljajte na lesenih ali poroznih površinah.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

Kapljic vabe ne izpostavljajte sončni svetlobi ali viru toplote. (npr. radiator).

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Preprečiti stik z očmi in kožo.

Izdelka ne nanašajte na mesta, ki so dostopna otrokom.

Nanašajte le na mesta, ki niso na doseg živali.

Ne nanašajte na površine ali pripomočke, ki so lahko v stiku s krmo/živili.

Uporabljajte samo na skritih mestih, ki so težko dostopna in proc od vode.

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Uporaba 3 – Notranji prostori, razpoke in špranje – vaba v gelu, ki se nanese kot kapljice – usposobljen profesionalni uporabnik.

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Notranjost, znotraj zaprti prostori, razpoke in špranje
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic. Podroben opis: Odprite gel in ga nanesite iz brizge v obliki kapljic
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0,04 g). Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek: odvisno od stopnje infestacije in vrste ščurka. (1 kapljica = 0,04 g). nemški ščurek (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m ² (3-4 kaplice/m ²). orientalski ščurek (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24g/m ² (4-6 kapljic/m ²) ameriški ščurek (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16g/m ² -0,24 g/m ² (4-6 kapljic/m ²) pogostost nanosa : 1 nanos čez 4 tedne. Ponoviti največ enkrat, če so ščurki še vedno prisotni. Pri enem nanosu v eni hiši ne nanesite več kot 12 kapljic. Pogostost uporabe : tri mesece po koncu infestacije, se lahko biocid ponovno uporabi .
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	LDPE plastične brizge po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10g LDPE plastične brizge po 15, 20, 30, 35, 40 y 50 g. .

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Biocidni pripravek nanašajte le v razpoke in špranje, za pohištvo in motorji. Izdelka ni mogoče uporabiti na površinah.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami ali na območjih, ki so bila pred kratkim tretirana z drugim insekticidom.

Ne uporabljajte na lesenih ali poroznih površinah.

Izogibajte se stiku z obdelanimi površinami.

Kapljic vabe ne izpostavljajte sončni svetlobi ali viru toplote. (npr. radiator).

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med nanašanjem nosite ustrezne rokavice.

Preprečiti stik z očmi in kožo.

Izdelka ne nanašajte na mesta, ki so dostopna otrokom.

Nanašajte le na mesta, ki niso na dosegu živali.

Izdelka ne nanašajte na površine, kjer se pripravlja, streže, zaužije ali shranjuje krma ali krmila.

Izdelek se bo uporabljal v živilski industriji v primeru odsotnosti živil, razen v skladiščih, kjer so skladiščeni izdelki pravilno pakirani.

Sprejeti je treba ustrezne ukrepe za zagotovitev, da hrana, oprema ali kateri koli pripomočki, s katerimi se ravna na mestih, ki so bila predhodno obdelana s proizvodom, ne vsebujejo ostankov aktivne snovi.

Uporabljajte samo na prikritih mestih, ki so težko dostopna in so ločena od vode.

Sprejeti integrirane metode zatiranja škodljivcev, kot je kombinacija kemičnih, fizičnih metod zatiranja in drugih javnozdravstvenih ukrepov, ob upoštevanju lokalnih posebnosti (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.)

Učinkovitost izdelka preverite na kraju samem: po potrebi je treba raziskati vzrok zmanjšane učinkovitosti, da zagotovite, da ni odpornosti, ali da ugotovite morebitno odpornost.

Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer sumite ali obstaja odpornost.

Ce je zatiranje neucinkovito, obvestite imetnika registracije

4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Uporaba # 4 – Uporaba 4 – Notranji prostori – vaba v obliki gela se nanese v škatlice za vabo - splošna javnost (neprofesionalno)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih zaprti prostori
Način(-i) uporabe	Metoda: V škatlah z vabo Podroben opis: Postaje za vabe, pripravljene za uporabo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: odvisno od nivoja infestacije Redčenje (%): 0

	Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je: 0,2-0,4 g/m ² , odvisno od stopnje infestacije, razdeljen na več postaj vab. Na primer, pri postaji z vabo, ki vsebuje 2,5 g, je odmerek: - 2 postaji z vabo na sobo za nizko infestacijo (ca. 5 g/22 m ²) - 4 postaje z vabo na sobo za visoko infestacijo (ca. 10 g/22 m ²) Pogostost uporabe: Po približno 4 tednih je treba postaje z vabami zamenjati s svežimi, če so insekti še prisotni. Pogostnost tretiranja: Tri mesece po koncu infestacije lahko tretiranje ponovimo
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Plastične škatle za vabo z 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g vabe v obliki gela.

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek uporabite v temnih in mokrih prostorih: pod umivalnikom, za straniščem, blizu odtoka.

Gel vaba v plastični škatlici.

1. Odprite postajo za vabe: odrežite konec plastične škatle na predrezani liniji
2. Aktivirajte postajo za vabo: popolnoma potisnite kapsulo, dokler se gel ne odloži v osrednji predel. Po aktivaciji kapsule ne ločite.
3. Aktivirano postajo za vabe postavite na priporočena mesta.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje ne smejo biti odprte, v njih se ne sme posegati.

Nikoli ne vtikajte prstov skozi luknje v škatli z vabo.

Na koncu tretiranja zberite škatle z vabami za odlaganje v odpadke.

4.4.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Uporaba 5 –Notranji prostori – vaba v obliki gela se nanese v škatlice za vabo – profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Blattella germanica Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: Blatta orientalis Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli

	Znanstveno ime: drugo: Periplaneta americana Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih zaprti prostori
Način(-i) uporabe	Metoda: V škatlah z vabo Podroben opis: Podroben opis: Postaje za vabe, pripravljene za uporabo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek: odvisno od nivoja infestacije Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek: odvisno od nivoja infestacije Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je: 0,2-0,4 g/m ² , odvisno od stopnje infestacije, razdeljen na več postaj vab. Na primer, pri postaji z vabo, ki vsebuje 2,5 g, je odmerek: - 2 postaji z vabo na sobo za nizko infestacijo (ca. 5 g/22 m ²) - 4 postaje z vabo na sobo za visoko infestacijo (ca. 10 g/22 m ²) Pogostost uporabe: Po približno 4 tednih je treba postaje z vabami zamenjati s svežimi, če so insekti še prisotni. Pogostnost tretiranja: Tri mesece po koncu infestacije lahko tretiranje ponovimo
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastične škatle za vabo z 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g vabe v obliki gela.

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek uporabite v temnih in mokrih prostorih: pod umivalnikom, za straniščem, blizu odtoka.

Gel vaba v plastični škatlici.

1. Odprite postajo za vabe: odrežite konec plastične škatle na predrezani liniji
2. Aktivirajte postajo za vabo: popolnoma potisnite kapsulo, dokler se gel ne odloži v osrednji predel. Po aktivaciji kapsule ne ločite.
3. Aktivirano postajo za vabe postavite na priporočena mesta.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje ne smejo biti odprte, v njih se ne sme posegati.

Nikoli ne vtikajte prstov skozi luknje v škatli z vabo.

Na koncu tretiranja zberite škatle z vabami za odlaganje v odpadke.

.

4.5.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

.

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Uporaba # 6 – Uporaba 6 – Notranji prostori – vaba v obliki gela se nanese v škatlice za vabo - usposobljeni profesionalni uporabnik

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18 (PT18): Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: drugo: nemški ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: drugo: orientalski ščurek Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: drugo: <i>Periplaneta americana</i> Splošno ime: drugo: ameriški ščurek Razvojna faza: odrasli
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih zaprti prostori
Način(-i) uporabe	Metoda: V škatlah z vabo Podroben opis: Postaje za vabe, pripravljene za uporabo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Odmerek: odvisno od nivoja infestacije Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Število in časovni raspored uporabe: Odmerek je: 0,2-0,4 g/m ² , odvisno od stopnje infestacije, razdeljen na več postaj vab. Na primer, pri postaji z vabo, ki vsebuje 2,5 g, je odmerek: - 2 postaji z vabo na sobo za nizko infestacijo (ca. 5 g/22 m ²) - 4 postaje z vabo na sobo za visoko infestacijo (ca. 10 g/22 m ²) Pogostost uporabe: Po približno 4 tednih je treba postaje z vabami zamenjati s svežimi, če so insekti še prisotni. Pogostnost tretiranja: Tri mesece po koncu infestacije lahko tretiranje ponovimo
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Plastične škatle za vabo z 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g vabe v obliki gela.

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Izdelek uporabite v temnih in mokrih prostorih: pod umivalnikom, za straniščem, blizu odtoka.

Gel vaba v plastični škatlici.

1. Odprite postajo za vabe: odrežite konec plastične škatle na predrezani liniji
2. Aktivirajte postajo za vabo: popolnoma potisnite kapsulo, dokler se gel ne odloži v osrednji predel. Po aktivaciji kapsule ne ločite.
3. Aktivirano postajo za vabe postavite na priporočena mesta.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje ne smejo biti odprte, v njih se ne sme posegati.

Nikoli ne vtikajte prstov skozi luknje v škatli z vabo.

Na koncu tretiranja zberite škatle z vabami za odlaganje v odpadke.

Sprejeti integrirane metode zatiranja škodljivcev, kot je kombinacija kemičnih, fizičnih metod zatiranja in drugih javnozdravstvenih ukrepov, ob upoštevanju lokalnih posebnosti (podnebne razmere, ciljne vrste, pogoji uporabe itd.)

Učinkovitost izdelka preverite na kraju samem: po potrebi je treba raziskati vzrok zmanjšane učinkovitosti, da zagotovite, da ni odpornosti, ali da ugotovite morebitno odpornost.

Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer sumite ali obstaja odpornost. Če je zatiranje neucinkovito, obvestite imetnika registracije.

4.6.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Pred uporabo vedno preberite etiketo ali letak in upoštevajte vsa priložena navodila.
Pred nanosom izdelka opravite pregled, da preverite stopnjo infestacije in da locirate prizadeta območja.
Uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ta izdelek je treba uporabljati izmenično z drugimi izdelki, ki ne vsebujejo iste a.s. da bi se izognili odpornosti populacij.

Vab ne postavljajte na mesta, kjer bi se lahko kontaminirala hrana, krma ali pitna voda.

Izdelek je ponovno namestimo, ko je przen, le če škodljivec še ni pod nadzorom.

Izdelke uporabljajte v priporočenih odmerkih in intervalih.

Za optimizacijo učinkovitosti tretiranja upoštevajte dobre higienske prakse: odstranite ali preprečite dostop do vseh virov hrane. Vaba mora biti glavni vir hrane, ki je na voljo ščurkom.

Za optimizacijo učinkovitosti enkrat tedensko preverite vabo in zamenjajte/napolnite vabo, če je poškodovana ali umazana.

Izdelek je treba varno nanesti na način, ki zmanjšuje tveganje, da bi ga zaužile druge živali ali otroci.

Izdelka ne mečite na tla, v vodotok, umivalnik ali v odtok.

Preprečiti izpust v okolje (P273).

Uporabljajte samo na skritih mestih, ki so težko dostopna in so ločena od vode.

Na koncu tretiranja zberite škatle z vabami za odlaganje v odpadke.

Neuporabljen izdelek, njegovo embalazo in vse ostale odpadke (tj. mrtve insekte) zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Osnovni postopki prve pomoči:

Če pride v oči, spirajte z obilo vode vsaj 15 minut. NE pozabite odstraniti kontaktnih leč

Če pride v stik s kožo, sperite z milom in obilo vode, brez drgnjenja

Po potrebi odpeljite osebo v bolnišnico in pokažite etiketo ali embalažo, če je to mogoče. Zastrupljene osebe ne puščajte same.

Zdravniški nasveti za zdravnike in sanitarno osebje

Simptomatsko in podporno zdravljenje

ČE POTREBUJETE ZDRAVNIŠKI NASVET, IMEJTE PRI ROKI EMBALAŽO IZDELKA ALI ETIKETO IN SE OBRNITE NA CENTER ZA ZASTRUPITVE

Nujni ukrepi za varstvo okolja:

Previdnostni ukrepi: **Preprečiti vstop sredstva v okolje (površinske in podtalnice), kanalizacijo, drenažo itd. z izgradnjo zaščitnih pregrad in zapiranjem odtokov.**

Obvestite pristojne organe ali zaustavite puščanje v vodotoke, odtoke, kanalizacijo ...

Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Razlitje pobrati na inertnem materialu (pesek, kaolin ...), zbrati in odložiti v posode za kasnejše ravnanje z nevarnimi odpadki.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstranite vsebino/posode v skladu z lokalnimi predpisi (P501).

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabe izdelka v originalni embalaži je 4 leta pri normalnih pogojih skladiščenja.

Hraniti v originalni embalaži.

Posode hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu.

Priporočljivo je, da po možnosti izdelek hranite pri temperaturi med 5°C in 45°C.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Definicije:

Usposobljeni strokovnjak: izvajalci zatiranja škodljivcev, ki so prejeli posebno usposabljanje za zatiranje žuželk v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

Strokovnjak: uporabnik, ki uporablja biocidne pripravke na delovnem mestu. Ta uporabnik ima nekaj znanja in spretnosti pri ravnanju s kemikalijami in je sposoben pravilno uporabljati osebno zaščitno opremo (OZO), če je to potrebno.

Splošna javnost (neprofesionalni uporabnik): Uporabniki, ki niso strokovnjaki in uporabljajo izdelek v svojem zasebnem življenju.

Izdelek vsebuje grenko snov, zaradi katere je **neprivlačen** za ljudi ali **domače** živali.

Predlagatelj mora zagotoviti, da splošna javnost razume razliko med vrstami in stopnjo okužbe za pravilno uporabo odmerka