

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Masocare 1:4

**Produktart(en):** PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

**Zulassungsnummer:** BE2023-0011-00-00

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0030840-0012

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	3
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	13
5.1. Anwendungsbestimmungen	13
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	13
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	13
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	14
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	14
6. Sonstige Informationen	15

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

Masocare 1:4

### 1.2. Zulassungsinhaber

**Name und Anschrift des Zulassungsinhabers**

Name	Evans Vanodine Europe
Anschrift	6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Irland
Zulassungsnummer	BE2023-0011-00-00 1-8

**R4BP 3-Referenznummer**

BE-0030840-0012

**Datum der Zulassung**

01/09/2023

**Ablauf der Zulassung**

19/03/2029

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

**Name des Herstellers**

Evans Vanodine International

**Anschrift des Herstellers**

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Vereinigtes Königreich

**Standort der Produktionsstätten**

Brierley Road, Walton Summit PR58AH Preston, Lancashire Vereinigtes Königreich

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	ACF Minera S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	San Martin No. 499 Iquique Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Lagunas Mine - Pozo Almonte Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Los Militares 4290, Piso 4 Las Condes Santiago Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Nueva Victoria Plant Pedro de Valdivia Plant Northern Chile Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Hnos Amunategui 178 Santiago Chile
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Chile

<b>Wirkstoff</b>	1319 - Iod
<b>Name des Herstellers</b>	ISE Chemical Corporation
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Japan
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Shirasato Plant - - Japan

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Iod		Wirkstoffe	7553-56-2	231-442-4	2,346
Alcohol Ethoxylate	C13-15 Alcohol Ethoxylate (11EO)	nicht wirksamer Stoff	157627-86-6	500-337-8	19,993

## 2.2. Art der Formulierung

SL - Lösliches Konzentrat

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

### Gefahrenhinweise

Verursacht schwere Augenschäden.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Sicherheitshinweise

Augenschutz tragen.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter  
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Inhalt gemäß den nationalen/regionalen Vorschriften zuführen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

**Verwendung 1 - Vor dem Melken - für berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz**

#### Art des Produkts

PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

#### Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE VETERINÄRHYGIENE: Zitzendesinfektionsmittel für Milchtiere (Kühe, Büffel, Schafe, Ziegen) zur Anwendung vor dem Melken.

**Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)**

wissenschaftlicher Name: Bakterien  
Trivialname: Bakterien  
Entwicklungsstadium: N/A

wissenschaftlicher Name: Hefen  
Trivialname: Hefen  
Entwicklungsstadium: N/A

**Anwendungsbereich**

Innen-

Anwendung in Innenräumen – Zitzen von laktierenden Tieren

**Anwendungsmethode(n)**

Methode: Manuelles Dippen/Einschäumen

Detaillierte Beschreibung:

Anwendung vor dem Melken

Täglich vor jedem Melken anwenden (1–3 Mal täglich). Bei manueller Anwendung ist darauf zu achten, dass die gesamte Zitze über eine Kontaktzeit von mindestens 60 Sekunden bedeckt ist.

1. Manuelles Dippen/Einschäumen:

a.

Dippen

Kühe und Büffel: 10 ml/Tier pro Behandlung

Schafe: 5 ml/Tier pro Behandlung

Ziegen: 6 ml/Tier pro Behandlung

b.

Einschäumen

Kühe und Büffel: 5 ml/Tier pro Behandlung

Schafe: 2,5 ml/Tier pro Behandlung

Ziegen: 3 ml/Tier pro Behandlung

Methode: Manual spraying using an electronic sprayer

Detaillierte Beschreibung:

Anwendung vor dem Melken

Vor dem Melken die Zitzen jeder Kuh mit dem Produkt besprühen.

Sicherstellen, dass das Spray die gesamte Oberfläche der Zitzen bedeckt. Die Zitzen mindestens 60 Sekunden lang mit dem Produkt bedeckt lassen. Die Zitzen anschließend mit einem Einwegpapier gründlich abwischen und abtrocknen.

2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:

Kühe und Büffel: 10–15 ml/Tier pro Behandlung

Schafe: 5–7,5 ml/Tier pro Behandlung

Ziegen: 7–10 ml/Tier pro Behandlung

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: Siehe oben

Verdünnung (%):

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Siehe oben

Aufwandmenge: Siehe oben

Verdünnung (%):

Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

Siehe oben

Anwenderkategorie(n)

berufsmäßiger Verwender

Verpackungsgrößen und  
Verpackungsmaterial

Flasche/Packung (HDPE) 5–25 l  
Fass (HDPE) 200 l  
Großpackmittel (HDPE) 1000 l

#### 4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt vor der Anwendung auf eine Temperatur von über 20 °C bringen.

Der Einsatz einer Dosierpumpe zum Einfüllen des Produktes in das Applikationsgerät wird empfohlen.

Dieses Produkt muss vor der Verwendung verdünnt werden.

Das Produkt mit sauberem Wasser im Verhältnis  
1:9 verdünnen und gut vermischen.

Täglich eine frische Lösung herstellen.

Die Behälter zur Herstellung der Verdünnung müssen sauber und für diese Anwendung geeignet sein.

Vor Anwendung dieses Produkts sicherstellen, dass Euter und Zitzen sauber und trocken sind.

##### 1. Manuelles Dippen/Einschäumen

Den Zitzenbecher zu 2/3 mit dem verdünnten Produkt befüllen. Die Zitzen jeder Kuh vor dem Melken eintauchen und darauf achten, dass die gesamte Zitze eingetaucht wird. Die Zitzen mindestens 60 Sekunden lang mit dem Produkt bedeckt lassen. Die Zitzen anschließend mit einem Einwegpapier gründlich abwischen und abtrocknen. Den Zitzenbecher nach Bedarf mit frischer Lösung auffüllen. Nach Gebrauch die Becher entleeren und mit Wasser auswaschen.

##### 2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts

Vor dem Melken die Zitzen jeder Kuh mit dem verdünnten Produkt einsprühen. Sicherstellen, dass das Spray die gesamte Oberfläche der Zitzen bedeckt. Die Zitzen mindestens 60 Sekunden lang mit dem Produkt bedeckt lassen. Die Zitzen anschließend mit einem Einwegpapier gründlich abwischen und abtrocknen.

#### 4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wenn eine Kombination aus Desinfektion vor und nach dem Melken erforderlich ist, muss für die Desinfektion nach dem Melken ein

anderes Produkt, das kein Jod enthält, verwendet werden.

Für das manuelle Dippen/Einschäumen:  
Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch.  
Für manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:  
Bei der Anwendung des Produkts chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (das Material der Handschuhe muss vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation angegeben werden).  
Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch

#### 4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

### 4.2 Beschreibung der Verwendung

**Verwendung 2 - Nach dem Melken - für berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz**

**Art des Produkts**

PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)

**Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung**

DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE VETERINÄRHYGIENE: Zitrendesinfektionsmittel für Milchtiere (Kühe, Büffel, Schafe, Ziegen) zur Anwendung nach dem Melken.

**Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)**

wissenschaftlicher Name: Bakterien  
Trivialname: Bakterien  
Entwicklungsstadium: N/A

wissenschaftlicher Name: Hefen  
Trivialname: Hefen  
Entwicklungsstadium: N/A



**Anwendungsbereich**

Innen-  
Anwendung in Innenräumen – Zitzen von laktierenden Tieren.

**Anwendungsmethode(n)**

Methode: Manuelles Dippen/Einschäumen  
Detaillierte Beschreibung:  
  
Anwendung nach dem Melken  
Täglich nach jedem Melkvorgang anwenden  
(1–3 Mal pro Tag). Bei manueller Anwendung darauf achten, dass die gesamte Zitze bedeckt ist und dass das Tier danach 5 Minuten lang steht.  
  
1. Manuelles Dippen/Einschäumen  
  
a. Dippen  
Kühe und Büffel: 10 ml/Tier pro Behandlung  
Schafe: 5 ml/Tier pro Behandlung  
Ziegen: 6 ml/Tier pro Behandlung  
  
b. Einschäumen  
Kühe und Büffel: 5 ml/Tier pro Behandlung  
Schafe: 2,5 ml/Tier pro Behandlung  
Ziegen: 3 ml/Tier pro Behandlung  
  
Methode: Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts  
Detaillierte Beschreibung:  
  
Anwendung nach dem Melken  
Täglich nach jedem Melkvorgang anwenden (1–3 Mal pro Tag). Bei manueller Anwendung darauf achten, dass die gesamte Zitze bedeckt ist und dass das Tier danach 5 Minuten lang steht.  
  
2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:  
Kühe und Büffel: 10–15 ml/Tier pro Behandlung  
Schafe: 5–7,5 ml/Tier pro Behandlung  
Ziegen: 7–10 ml/Tier pro Behandlung  
  
Methode: Automatisiertes Dippen  
Detaillierte Beschreibung:  
Anwendung nach dem Melken  
Täglich nach jedem Melkvorgang anwenden (1–3 Mal pro Tag).  
Automatisiertes Dippen:  
Kühe und Büffel: 10 ml/Tier pro Behandlung  
Schafe: 5 ml/Tier pro Behandlung  
Ziegen: 6 ml/Tier pro Behandlung  
  
Methode: Automatisiertes Einsprühen mit einem Roboter  
Detaillierte Beschreibung:  
  
Anwendung nach dem Melken  
Täglich nach jedem Melkvorgang anwenden (1–3 Mal pro Tag).  
Automatisiertes Einsprühen mit einem Roboter:  
Kühe und Büffel: 10–15 ml/Tier pro Behandlung  
Schafe: 5–7,5 ml/Tier pro Behandlung  
Ziegen: 7–10 ml/Tier pro Behandlung

**Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit**

Aufwandmenge: Siehe oben  
Verdünnung (%):  
Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:

	<p>Siehe oben</p> <p>Aufwandmenge: Siehe oben. Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Siehe oben.</p> <p>Aufwandmenge: Siehe oben Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Siehe oben</p> <p>Aufwandmenge: Siehe oben Verdünnung (%): Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Siehe oben</p>
<b>Anwenderkategorie(n)</b>	berufsmäßiger Verwender
<b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b>	<p>Flasche/Packung (HDPE) 5–25 l Fass (HDPE) 200 l Großpackmittel (HDPE) 1000 l</p>

#### 4.2.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

<p>Das Produkt vor der Anwendung auf eine Temperatur von über 20 °C bringen.</p> <p>Der Einsatz einer Dosierpumpe zum Einfüllen des Produktes in das Applikationsgerät wird empfohlen.</p> <p>Um eine ausreichende Kontaktzeit zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass das Produkt nach der Anwendung nicht entfernt wird (z. B. die Kühe mindestens 5 Minuten stehen lassen).</p> <p>Dieses Produkt muss vor der Verwendung verdünnt werden.</p> <p>Das Produkt mit sauberem Wasser im Verhältnis 1:4 verdünnen und gut vermischen.</p> <p>Täglich eine frische Lösung herstellen.</p> <p>Die Behälter zur Herstellung der Verdünnung müssen sauber und für diese Anwendung geeignet sein.</p>
--

Vor Anwendung dieses Produkts sicherstellen, dass Euter und Zitzen sauber und trocken sind.

**1. Manuelles Dippen/Einschäumen**

Den Zitzenbecher zu 2 /3 mit dem verdünnten Produkt befüllen. Die Zitzen aller Kühe sofort nach dem Melken eintauchen und darauf achten, dass jeweils die gesamte Zitze eingetaucht wird. Den Zitzenbecher nach Bedarf mit frischer Lösung auffüllen. Nach dem Melken die Becher entleeren und mit Wasser auswaschen.

**2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts**

Die Zitzen jeder Kuh unmittelbar nach dem Melken mit dem verdünnten Produkt besprühen. Sicherstellen, dass das Spray die gesamte Oberfläche der Zitzen bedeckt.

**3. Automatisiertes Dippen**

Die Zitzen sind mit Produkt bedeckt, wenn der Zitzenbecher mithilfe der Abnahmeautomatik abgenommen wird. Der gesamte Prozess ist automatisiert.

**4. Automatisiertes Einsprühen mit einem Roboter**

Nach dem Melken mit dem Melkroboter wird das verdünnte Produkt automatisch von einem Melkzeugarm auf die Zitzen gesprüht. Das Spülen des Sprühgeräts erfolgt automatisch.

#### 4.2.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wenn eine Kombination aus Desinfektion vor und nach dem Melken erforderlich ist, muss für die Desinfektion vor dem Melken ein anderes Produkt, das kein Jod enthält, verwendet werden.

Für manuelles Dippen/Einschäumen, automatisiertes Dippen und automatisiertes Einsprühen mit einem Roboter:

Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch.

Für manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:

Bei der Anwendung des Produkts chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (das Material der Handschuhe muss vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation angegeben werden).

Bei der Anwendung dieses Produkts geeignete Schutzschuhe tragen (EN 13832).

Einen Schutzanzug tragen (mindestens Typ 6, EN 13034).

Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch.

#### 4.2.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

#### 4.2.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

#### 4.2.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

#### 4.3 Beschreibung der Verwendung

**Verwendung 3 - Vor und nach dem Melken - für berufsmäßige Verwender und berufsmäßige Verwender mit nachweisbar fortgeschrittener Kompetenz**

<b>Art des Produkts</b>	PT03 - Hygiene im Veterinärbereich (Desinfektionsmittel)
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	DESINFEKTIONSMITTEL FÜR DIE VETERINÄRHYGIENE: Zitzendesinfektionsmittel für Milchtiere (Kühe, Büffel, Schafe, Ziegen) zur Anwendung vor und nach dem Melken.
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	<p>wissenschaftlicher Name: Bakterien          Trivialname: Bakterien          Entwicklungsstadium: N/A</p> <p>wissenschaftlicher Name: Hefen          Trivialname: Hefen          Entwicklungsstadium: N/A</p>
<b>Anwendungsbereich</b>	<p>Innen-</p> <p>Anwendung in Innenräumen – Zitzen von laktierenden Tieren.</p>
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	<p>Methode: Manuelles Dippen/Einschäumen          Detaillierte Beschreibung:</p> <p>Anwendung vor und nach dem Melken</p> <p>Täglich vor und nach jedem Melkvorgang anwenden (insgesamt bis zu 5 Anwendungen pro Tag). Bei manueller Anwendung ist darauf zu achten, dass die gesamte Zitze vor dem Melken über eine Kontaktzeit von 60 Sekunden bedeckt ist, sowie darauf, dass die gesamte Zitze bedeckt ist und das Tier 5 Minuten lang nach dem Melken steht.</p> <p>1. Manuelles Dippen/Einschäumen:          a. Dippen          Kühe und Büffel: 10 ml/Tier pro Behandlung          Schafe: 5 ml/Tier pro Behandlung          Ziegen: 6 ml/Tier pro Behandlung</p> <p>b. Einschäumen          Kühe und Büffel: 5 ml/Tier pro Behandlung          Schafe: 2,5 ml/Tier pro Behandlung          Ziegen: 3 ml/Tier pro Behandlung</p> <p>Methode: Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts          Detaillierte Beschreibung:</p> <p>Anwendung vor und nach dem Melken</p> <p>Täglich vor und nach jedem Melkvorgang anwenden (insgesamt bis zu 5 Anwendungen pro Tag). Bei manueller Anwendung ist darauf zu achten, dass die gesamte Zitze vor dem Melken über eine Kontaktzeit von 60 Sekunden bedeckt ist, sowie darauf, dass die gesamte Zitze bedeckt ist und das Tier 5 Minuten lang nach dem Melken steht.</p>

	<p>2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:          Kühe und Büffel: 10–15 ml/Tier pro Behandlung          Schafe: 5–7,5 ml/Tier pro Behandlung          Ziegen: 7–10 ml/Tier pro Behandlung</p>
<p><b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b></p>	<p>Aufwandmenge: Siehe oben          Verdünnung (%):          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:            Siehe oben</p> <p>Aufwandmenge: Siehe oben.          Verdünnung (%):          Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:            Siehe oben.</p>
<p><b>Anwenderkategorie(n)</b></p>	<p>berufsmäßiger Verwender</p>
<p><b>Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial</b></p>	<p>Flasche/Packung (HDPE) 5–25 l          Fass (HDPE) 200 l          Großpackmittel (HDPE) 1000 l</p>

### 4.3.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

<p>Das Produkt vor der Anwendung auf eine Temperatur von über 20 °C bringen.</p> <p>Der Einsatz einer Dosierpumpe zum Einfüllen des Produktes in das Applikationsgerät wird empfohlen.</p> <p>Nach dem Melken: Um eine ausreichende Kontaktzeit zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass das Produkt nach der Anwendung nicht entfernt wird (z. B. die Kühe mindestens 5 Minuten stehen lassen).</p> <p>Dieses Produkt muss vor der Verwendung verdünnt werden.</p> <p>Die Verdünnungen für die Anwendung vor und nach dem Melken sind unterschiedlich, daher werden separate Zitzenbecher benötigt. Siehe spezielle Anweisungen.</p> <p>Täglich eine frische Lösung herstellen.</p>
--

Die Behälter zur Herstellung der Verdünnung müssen sauber und für diese Anwendung geeignet sein.

Vor Anwendung dieses Produkts sicherstellen, dass Euter und Zitzen sauber und trocken sind.

Vor dem Melken – Das Produkt im Verhältnis 1:9 mit sauberem Wasser verdünnen und gut vermischen.

Nach dem Melken – Das Produkt im Verhältnis 1:4 mit sauberem Wasser verdünnen und gut vermischen.

#### 1. Manuelles Dippen/Einschäumen

Den Zitzenbecher zu 2/3 mit dem Produkt befüllen. Die Zitzen jeder Kuh vor dem Melken eintauchen und darauf achten, dass die gesamte Zitze eingetaucht wird.

Die Zitzen mindestens 60 Sekunden lang mit dem Produkt bedeckt lassen. Die Zitzen anschließend mit einem Einwegpapier gründlich abwischen und abtrocknen.

Die Zitzen aller Kühe sofort nach dem Melken eintauchen und darauf achten, dass jeweils die gesamte Zitze eingetaucht wird. Den Zitzenbecher nach Bedarf mit frischer Lösung auffüllen.

Nach Gebrauch die Becher entleeren und mit Wasser auswaschen.

#### 2. Manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts

Vor dem Melken die Zitzen jeder Kuh mit dem verdünnten Produkt einsprühen. Sicherstellen, dass das Spray die gesamte Oberfläche der Zitzen bedeckt. Die Zitzen mindestens 60 Sekunden lang mit dem Produkt bedeckt lassen. Die Zitzen anschließend mit einem Einwegpapier gründlich abwischen und abtrocknen.

Die Zitzen jeder Kuh unmittelbar nach dem Melken mit dem verdünnten Produkt besprühen. Sicherstellen, dass das Spray die gesamte Oberfläche der Zitzen bedeckt.

### 4.3.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Für das manuelle Dippen/Einschäumen:

Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch.

Für manuelles Einsprühen mithilfe eines elektronischen Sprühgeräts:

Bei der Anwendung des Produkts chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (das Material der Handschuhe muss vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation angegeben werden).

Bei der Anwendung dieses Produkts geeignete Schutzschuhe tragen (EN 13832).

Einen Schutzanzug tragen (mindestens Typ 6, EN 13034).

Die Tragen eines Augenschutzes bei der Handhabung des Produkts ist obligatorisch

### 4.3.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

### 4.3.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

### 4.3.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

## **5. Anweisungen für die Verwendung**

### **5.1. Anwendungsbestimmungen**

Siehe anwendungsspezifische Anweisungen.

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Siehe anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen.

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

**Mögliche unerwünschte unmittelbare oder mittelbare Nebenwirkungen umfassen :**

- Augenreizung
- Allgemeines Unwohlsein bei Verschlucken.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **Bei Einatmen:** unwahrscheinlicher Expositionsweg, da das Produkt keine flüchtigen Stoffe enthält. Wenn Spray/Nebel eingeatmet wurde, die betroffene Person ins Freie bringen, sie warm und ruhig halten und für eine ungehinderte Atmung sorgen.

· **Bei Verschlucken:**

Kein Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser trinken lassen. Bei anhaltenden Beschwerden ärztliche Hilfe hinzuziehen.

· **Bei Hautkontakt:** Mit reichlich Wasser abwaschen.

· **Bei Augenkontakt:** Sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Schnell ärztliche Hilfe suchen, falls die Symptome nach dem Auswaschen andauern.

**EINE BETROFFENE PERSON NIEMALS UNBEAUFICHTIGT LASSEN.**

**Hinweis für medizinisches Personal und Pflegepersonal:**

· Führen Sie eine symptomatische und unterstützende Behandlung durch.

**WENN SIE MEDIZINISCHE HILFE SUCHEN, HALTEN SIE DIE VERPACKUNG UND DAS ETIKETT BEREIT UND RUFEN SIE IHRE LOKALES GIFTINFORMATIONSZENTRUM AN [070 245 245].**

#### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Am Ende der Behandlung unbenutztes Produkt, Verpackung und kontaminierte Materialien entsprechend den nationalen/regionalen Vorschriften entsorgen. Nicht in den Abfluss gießen

#### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Haltbarkeit: 24 Monate. In der verschlossenen Originalverpackung aufbewahren und vor extremen Temperaturen schützen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Vor Frost schützen. Wenn der Inhalt gefriert, muss er vor dem Gebrauch aufgetaut und gründlich gemischt werden.  
An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.  
Bei unter 25 °C aufbewahren.



## 6. Sonstige Informationen

Hinweis: Wenn dieser Meta-SPC der Produktfamilie Ergänzungen hinzugefügt werden, müssen die Anwendungskonzentrationen innerhalb des Bereichs liegen, der von den Umweltverträglichkeitsprüfungen abgedeckt wird.