

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: VEGEBACT MULTI

Type(s) de produit: TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Numéro de l'autorisation: FR-2022-0009

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0020909-0001

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	15
5.1. Consignes d'utilisation	15
5.2. Mesures de gestion des risques	15
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	15
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	16
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	16
6. Autres informations	16

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

VEGEBACT MULTI

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Société Industrielle de Diffusion
	Adresse	2, rue Antoine Etex 94046 CRETEIL CEDEX France
Numéro de l'autorisation	FR-2022-0009 1-1	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0020909-0001	
Date de l'autorisation	23/03/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	08/02/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	ACTION PIN
Adresse du fabricant	Z.I. de Cazalieu - CS 60030 40260 CASTETS France
Emplacement des sites de fabrication	448 Route de l'Océan 40560 VIELLE-SAINT-GIRONS France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1322 - Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Jungbunzlauer S.A.
Adresse du fabricant	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
Emplacement des sites de fabrication	Z.I. et Portuaire B.P. 32 67390 MARCKOLSHEIM France
Substance active	1322 - Acide L-(+)-lactique
Nom du fabricant	Purac Biochem bv
Adresse du fabricant	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
Emplacement des sites de fabrication	Arkelsedijk 46 – NL 4206 AC Gorinchem Pays-Bas
	Gran Vial 19-25 08160 MONTMELÓ Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Acide L-(+)-lactique		Substance active	79-33-4	201-196-2	3

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée.
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Conseils de prudence

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.

Se laver soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l'eau et au savon.

Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).

En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Enlever les vêtements contaminés. Et les laver avant réutilisation.

Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.

Stocker dans avec doublure intérieure.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Désinfectants pour surfaces dures pour secteur domestique

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produits utilisés pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les cuvettes de toilettes.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Bactérie
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, usage domestique

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation
Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage

Taux et fréquences d'application

Description détaillée:
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Taux d'application: 30 mL/m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi

Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)

Temps de contact : 5 minutes

Conditions de saleté

Température : 20°C

Pulvérisation : 30 mL/m² (soit 20 pulvérisations sur la surface par m²)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi

Action non mécanique (pulvérisation) ou action mécanique (essuyage)

Temps de contact : 5 minutes

Conditions de saleté

Température : 20°C

Essuyage : 16 mL sur un chiffon par 0,1 m² (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Dimensions et matériaux d'emballage

Grand public (non professionnel)

Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.

Bidons en PEHD de 5 L.

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 5 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Désinfectants pour surfaces dures incluant les surfaces en contact avec les aliments pour secteur domestique

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces domestiques, y compris les surfaces en contact avec les aliments, les cuvettes de toilettes et les dispositifs de soins pour bébés et autres groupes à risque.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Bactérie
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Levure
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, usage domestique

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage

Taux et fréquences d'application

Description détaillée:
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Taux d'application: 30 mL/m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi
Conditions de saleté
Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :
Temps de contact : 15 minutes

Pulvérisation : 30 mL/m² (soit 20 pulvérisations sur la surface par m²)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon par 0,1 m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon par 0,1 m² (soit 8 à 12 pulvérisations)

Pour les cuvettes de toilettes, 50 mL ou 33 pulvérisations par toilette.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD de 1 L avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.

Bidons en PEHD de 5 L.

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage : Pulvériser sur le chiffon et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Liquide prêt à l'emploi pour les cuvettes de toilette : Vaporiser à l'intérieur des cuvettes de toilettes en recouvrant entièrement toute la surface à traiter (environ 50 mL ou 33 vaporisations par toilette). Laisser agir pendant au moins 15 minutes, puis brosser si nécessaire et tirer la chasse d'eau des toilettes.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Minimiser les éclaboussures lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.
- Laver les mains après application.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel, établissements médico-sociaux et de manipulation et de préparation des aliments

Type de produit

TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes et les zones de préparation et de manipulation des aliments.

Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Bactérie
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Levure
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux et zones de préparation et de manipulation des aliments.

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

-

Méthode d'application: Essuyage

Description détaillée:

Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Balayage

Description détaillée:

Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 30 mL/m²

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :

Temps de contact : 15 minutes

Pulvérisation : 30 mL/m² (soit 20 pulvérisations sur la surface par m²)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m²

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m² (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m²

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (balayage) :

Temps de contact : 5 minutes

	Balayage : 16 mL sur un chiffon / serpillière par 0,1 m ² (soit 8 à 12 pulvérisations)
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.</p> <p>Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.</p> <p>Bidons en PEHD de 5 L.</p> <p>Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.</p>

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.
- Le produit est efficace sur les bactéries, incluant Salmonella Typhimurium (agent de la Salmonellose) et Listeria monocytogenes (agent de la Listériose).

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
 - une visière faciale,
 - des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
 - une combinaison de protection de catégorie III type 6.

- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.4 Description de l'utilisation

Utilisation 4 - Désinfectants pour surfaces dures dans les secteurs industriel, institutionnel et établissements médico-sociaux

Type de produit	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit utilisé pour la désinfection des surfaces en industries, institutions et établissements médico-sociaux, y compris les surfaces extérieures des cuvettes de toilettes Désinfection de tout type de surfaces non poreuses.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactérie Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levure Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Intérieur, industries, institutions, établissements médico-sociaux
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: -

Taux et fréquences d'application

Méthode d'application: Essuyage
Description détaillée:
Essuyage (application du produit sur un chiffon puis essuyage)

Méthode d'application: Balayage
Description détaillée:
Balayage (application du produit sur une serpillère puis balayage)

Taux d'application: 30 mL/m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi
Conditions de saleté
Température : 20°C

Action non mécanique (pulvérisation) :
Temps de contact : 15 minutes

Pulvérisation : 30 mL/m² (soit 20 pulvérisations sur la surface par m²)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (essuyage) :

Temps de contact : 5 minutes

Essuyage : 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m² (soit 8 à 12 pulvérisations)

Taux d'application: 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m²
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
Produit prêt à l'emploi

Conditions de saleté

Température : 20°C

Action mécanique (balayage) :

Temps de contact : 5 minutes

Balayage : 16 mL sur un chiffon/serpillière par 0,1 m² (soit 8 à 12 pulvérisations)

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bouteilles en PEHD ou PET de 500 mL et 750 mL avec pulvérisateur.

Bouteilles en PEHD ou PET de 1 L.

Bidons en PEHD de 5 L.

Bidons en PEHD/ Adhésif /Nylon polyamide de 5 L.

4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par pulvérisation : Vaporiser directement sur la surface destinée à être traitée et couvrir toute la surface. Laisser agir pendant au moins 15 minutes, rincer à l'eau puis brosser ou frotter si nécessaire et essuyer avec un chiffon sec.
- Liquide prêt à l'emploi pour les surfaces dures par essuyage/balayage : Pulvériser sur le chiffon ou tremper la serpillière/le balai à franges et appliquer en mouillant complètement toute la surface destinée à être traitée. Laisser agir pendant au moins 5 minutes, rincer à l'eau puis essuyer la surface avec un chiffon sec si nécessaire ou laisser sécher.

4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Pour les établissements médico-sociaux, n'appliquer le produit que dans les zones où la désinfection n'est pas médicalement préconisée.
- Lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette et lors de l'application, porter :
 - une visière faciale,
 - des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à faire spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit),
 - une combinaison de protection de catégorie III type 6.
- Minimiser les éclaboussures et les déversements lors du chargement du produit dans le pulvérisateur à gâchette.
- Afin de minimiser l'exposition faciale lors de l'utilisation du produit, l'application par pulvérisation doit être effectuée vers le bas.

4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation du Méta RCP 2

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les instructions d'utilisation.
 - Respecter les conditions d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc).
 - Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
 - Pour le TP4, l'application ne concerne que la désinfection générale.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Eviter le contact avec les surfaces traitées.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter immédiatement le centre antipoison ou appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes et/ou d'inhalation de fortes concentrations, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 2 ans.

6. Autres informations

-