

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Mida Agri 811 Iodine Tec

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

**Numero di autorizzazione:** IT/2022/00799/AUT

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0014316-0001

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	6
5.1. Istruzioni d'uso	6
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	7
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	7
6. Altre informazioni	8

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Mida Agri 811 Iodine Tec

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Christeyns Italia S.r.l.
	Indirizzo	Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2022/00799/AUT 1-1	

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)**

IT-0014316-0001

**Data di rilascio dell'autorizzazione**

06/06/2022

**Data di scadenza dell'autorizzazione**

06/07/2032

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns Italia S.r.l.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia
	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

#### 1.4. Fabbricanti del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Nome del produttore</b>	Christeyns NV
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Polyvinylpyrrolidone iodine		Principio attivo	25655-41-8		3

### 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi
--------------------

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

<b>Indicazioni di pericolo</b>	Provoca gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
<b>Consigli di prudenza</b>	Indossare guanti e occhiali protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/medico. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo con la legislazione

## 4. Usoli autorizzati/i

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - immersione manuale

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	<p>Soluzioni acquose a medio-alta viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura tramite immersione manuale.</p> <p>Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).</p> <p>Trattamento tramite immersione manuale utilizzando una coppetta da immersione. Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una tazza da immersione. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.</p>
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	<p>Nome scientifico: Staphilococcus aureus  Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-positive  Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Streptococcus uberis  Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-positive  Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Escherichia coli  Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-negative  Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Candida albicans  Nome comune: Yeasts  Fase di sviluppo: .</p>
<b>Campo di applicazione</b>	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).</p>
<b>Metodi di applicazione</b>	<p>Metodo: Sistema aperto: trattamento per immersione</p> <p>Descrizione dettagliata:</p> <p>Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.</p> <p>Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.</p> <p>Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.</p> <p>Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.</p>

## Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno  
Diluizione (%): 0  
Numero e tempi di applicazione:

2 volte/giorno (vacche da latte e bufale) 1-2 volte/giorno (pecore e capre)

## Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato  
Utilizzatore professionale

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

5-10-20-25 L HDPE taniche  
200 L HDPE taniche  
600-1000 L HDPE taniche

### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale. Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione. Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno  
Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno  
Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno  
Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.  
Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.  
Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.



#### **4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Indossare occhiali protettivi.  
Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche

#### **4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

**QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE**

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### **4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali.

Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### **4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Conservare il prodotto nella confezione originale.  
Tenere il contenitore ben chiuso.  
Non conservare a temperatura superiore a 30°C.  
Proteggere dalla luce solare diretta.  
Periodo di validità: 1 anno

## 5. Indicazioni generali per l'uso

### 5.1. Istruzioni d'uso

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale. Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione. Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno  
Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno  
Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno  
Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.  
Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.  
Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare una protezione per gli occhi.  
Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente



Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi danni agli occhi.

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

#### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali.

Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

#### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

## 6. Altre informazioni

--