



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Marzo 2016 - Modificación: 1.2.4 Fecha de vencimiento de la autorización

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

1. Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

| ACCIONES | FECHA |
|----------|-------|
| - | - |

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

| REQUISITOS ESPECIALES | |
|-----------------------|--|
| 1. | Las etiquetas del producto serán distintas para cada categoría de usuario |
| 2. | Para la renovación de esta autorización se requerirán datos relativos a posibles envenenamientos primarios y secundarios derivados del uso del producto en la fauna salvaje, animales domésticos o ganado. |
| 3. | Las bolsitas en las que se suministra el cebo deben estar correctamente etiquetadas. |



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

| | |
|----|---|
| 4. | Siendo obligatorio el uso de portacebos en la aplicación del producto, se recomienda su comercialización conjunta. |
| 5. | Los envases de los productos para uso por personal profesional y no profesional (público en general) tendrán una capacidad inferior o igual a 1 kg. |

4. En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente
- El contenido de los apartados 1.1, 1.2.1., 1.2.2., 2. 3, 4, y 5, del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
 - Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

| Palabra de advertencia | Pictograma/s |
|------------------------|--------------|
| - | - |

- Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4 del Resumen de las Características del Producto – Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.
- Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
- El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

11. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
12. Esta decisión reemplaza las Resoluciones de Autorización e Inscripción en el Registro de biocidas emitidas con anterioridad.

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa, cabe la interposición del correspondiente RECURSO DE ALZADA, en el plazo de un mes, ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado Nº18-20, 28014 Madrid) según el Art. 107 y siguientes de la citada ley, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime pertinente.

Madrid, 21 MAR 2016

LA DIRECTORA GENERAL

La Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral

(Por Delegación de la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación de 16 de noviembre de 2015)

Fdo: Micaela García Tejedor.



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

MAKI PAT'

Tipo de Producto [14]

ES/RM-2014-14-00136

ES-0005205-0000



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

1. Información Administrativa

1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto

| | |
|------------------|-----------|
| Nombre comercial | MAKI PAT' |
|------------------|-----------|

1.2. Titular de la autorización

| | | |
|---|---------------------|--|
| 1.2.1 Nombre y Dirección del titular de la autorización | Nombre | LIPHATECH, S.A.S. |
| | Dirección | Bonnel BP 3 47480 Pont Du Casse Francia Email: contact@liphatech.fr |
| 1.2.2 Número de Autorización | ES/RM-2014-14-00136 | |
| <i>Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial</i> | - | |
| <i>Nº de referencia R4BP asset</i> | ES-0005205-0000 | |
| 1.2.3 Fecha de autorización | 25/02/2014 | |
| 1.2.4 Fecha de vencimiento de la autorización | 31/08/2020 | |

1.3. Fabricante(s) del producto

| | |
|---------------------------------|--|
| Nombre del fabricante | Liphatech S.A.S. |
| Dirección del fabricante | Production Centre, Av Jean Serres, ZA Malère. 47480 Pont du Casse, Francia |
| Lugar de fabricación | Production Centre, Av Jean Serres, ZA Malère. 47480 Pont du Casse, Francia |

1.4. Fabricante(s) de la sustancia activa (s)

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sustancia activa | BROMADIOLONA |
| Nombre del fabricante | Liphatech S.A.S. |
| Dirección del fabricante | - |
| Lugar de fabricación | Liphatech S.A.S. - |



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

2. Composición del producto y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del producto

| Nombre común | Nombre IUPAC | Función | NºCAS | Nº CE | Contenido (%) |
|--------------|---|---------------------|------------|-----------|---------------|
| Bromadiolona | 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-hidroxi-1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona | Sustancia activa | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,005 % |
| - | - | Sustancia no-activa | - | - | - |

2.2. Tipo de formulación

Cebo en pasta listo para su uso.

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

| | |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de peligro | - |
| Consejos de prudencia | P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P280 Llevar guantes y prendas protectoras. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico |

4. Usos Autorizados (s)

4.1. Descripción del uso

Uso 1 –Ratas y ratones - Interior y alrededor de viviendas - Personal no profesional (público en general).

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto | 14 (Rodenticida) |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Cebo en pasta listo para su uso que contiene bromadiolona (0,005%). |



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

| | |
|---|---|
| Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | Producto autorizado exclusivamente para el control de rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>), rata negra (<i>Rattus rattus</i>) y ratón común (<i>Mus musculus</i>), tanto juveniles como adultos. |
| Ámbito(s) de utilización | El producto MAKI PAT' aplicado por personal no profesional (público en general) se localizará en el interior y alrededor de viviendas de uso privado (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la vivienda), en portacebos correctamente etiquetados. |
| Método(s) de Aplicación | En portacebos correctamente etiquetados. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | Ratones: Portacebos con 30-50g de producto cada 1-3m (dependiendo del grado de infestación). Ratas: Portacebos con 100-200g de producto cada 4-10m (dependiendo del grado de infestación). |
| Categoría(s) de usuario(s) | Personal no profesional (uso por el público en general). |
| Tamaños de envases y Material del envasado | Bolsitas de 25 y 30g, para usar en portacebos de hasta 100g, en envases de 100, 120, 200, 300, 360, 400, 480, 500, 600, 800, 840, 900, 960 y 1000g. Portacebos precargados con 25, 30, 40, 50, 60, 80 y 100g conteniendo bolsitas de 25 y 30 g. Portacebos precargados con 40, 80, 120 y 200 g conteniendo bolsitas de 40g. |

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Véase punto 5.1

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

En la etiqueta del producto debe figurar la siguiente frase:
"Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deben depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas".

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5

4.2. Descripción del uso

Uso 2- Ratas ratones– Interior y alrededor de edificaciones estrechamente relacionadas con la explotación ganadera - Personal profesional.

| | |
|--|--|
| Tipo de Producto | 14 (Rodenticida) |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Cebo en pasta listo para su uso que contiene bromadiolona (0,005%). |
| Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | Producto autorizado exclusivamente para el control de rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>), rata negra (<i>Rattus rattus</i>) y ratón común (<i>Mus musculus</i>), tanto juveniles como adultos. |
| Ámbito(s) de utilización | El producto MAKI PAT' aplicado por personal profesional se localizará en el interior y alrededor de edificaciones e instalaciones fijas o móviles estrechamente relacionadas con la explotación ganadera (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación), en portacebos correctamente etiquetados. |
| Método(s) de Aplicación | En portacebos correctamente etiquetados. |
| Dosis y frecuencia de aplicación | Ratones: Portacebos con 30-50g de producto cada 1-3m (dependiendo del grado de infestación). Ratas: Portacebos con 100-200g de producto cada 4-10m (dependiendo del grado de infestación). |
| Categoría(s) de usuario(s) | Personal profesional. |
| Tamaños de envases y Material del envasado | Bolsitas de 25 y 30g, para usar en portacebos de hasta 100g, en envases de 100, 120, 200, 300, 360, 400, 480, 500, 600, 800, 840, 900, 960 y 1000g. |



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

| | |
|--|---|
| | Portacebos precargados con 25, 30, 40, 50, 60, 80 y 100g conteniendo bolsitas de 25 y 30 g. |
| | Portacebos precargados con 40, 80, 120 y 200 g conteniendo bolsitas de 40g. |

4.2.1. Instrucciones específicas de uso

Véase punto 5.1

4.2.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2

4.2.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3

4.2.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

En la etiqueta del producto debe figurar la siguiente frase:
"Los envases vacíos, los roedores muertos, los cebos y los portacebos deben depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas".

4.2.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5

4.3. Descripción del uso

Uso 3 - Ratas y ratones- Interior y alrededor de edificaciones, áreas abiertas y vertederos. Personal profesional especializado

| | |
|--|---|
| Tipo de Producto | 14 (Rodenticida) |
| Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado | Cebo en pasta listo para su uso que contiene bromadiolona (0'005%). |



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

| | |
|---|---|
| Organismo(s) diana (incluyendo el estadio de desarrollo) | Producto autorizado exclusivamente para el control de rata gris (<i>Rattus norvegicus</i>), rata negra (<i>Rattus rattus</i>) y ratón común (<i>Mus musculus</i>), tanto juveniles como adultos. |
| Ámbito(s) de utilización | El producto MAKI PAT' aplicado por personal profesional especializado se localizará en el interior y alrededor de edificaciones e instalaciones fijas o móviles (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación), en medios de transporte y en áreas abiertas y vertederos, en portacebos correctamente etiquetados. |
| Método(s) de Aplicación (es) | En portacebos correctamente etiquetados. |
| Dosis y frecuencia de aplicación. | Ratones: Portacebos con 30-50g de producto cada 1-3m (dependiendo del grado de infestación). Ratas: Portacebos con 100-200g de producto cada 4-10m (dependiendo del grado de infestación). |
| Categoría(s) de usuario(s) | Personal profesional especializado. |
| Tamaños de los envases y material del envasado. | Bolsitas de 25 y 30g, para usar en portacebos de hasta 100g, en envases de 800g, 1, 1'2, 1'5, 2, 2'5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 20kg. Portacebos precargados con 25, 30, 40, 50, 60, 80 y 100g conteniendo bolsitas de 25 y 30 g. Portacebos precargados con 40, 80, 120 y 200 g conteniendo bolsitas de 40g. |

4.3.1. Instrucciones específicas de uso

Véase punto 5.1

En la etiqueta del producto dirigido a personal profesional especializado, debe figurar la siguiente frase: "Uso exclusivo por personal profesional especializado".

4.3.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso

Véase punto 5.2

4.3.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase punto 5.3



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

4.3.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

En la etiqueta del producto debe figurar la siguiente frase:
"El envase una vez vacío después de utilizar su contenido, los roedores muertos, los residuos de los cebos y los portacebos, deben gestionarse de acuerdo a la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados."

4.3.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y vida útil del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase punto 5.5

5. Modo de empleo

5.1. Instrucciones de uso

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso. Los portacebos cargados deben ser colocados de forma segura y situados en áreas inaccesibles a niños, animales de compañía y otros animales a los que no va destinado el producto.

Otras instrucciones de utilización específicas en España.

Las bolsitas de cebo se colocarán sin abrir en los portacebos.

No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta y siganse las instrucciones propuestas.

Se deben lavar las manos y las zonas de piel expuestas después de la aplicación del producto

No tirar el producto en el suelo, en un curso de agua, en el fregadero o en el desagüe.

Se deben realizar inspecciones periódicas de los portacebos colocados (se recomienda cada 3 ó 4 días), y reemplazar o rellenar los que hayan sido consumidos por los roedores, dañados por el agua o contaminados por la suciedad.

Se debe evitar su utilización en aquellas áreas donde existan indicios de resistencia al ingrediente activo. Con el objetivo de prevenir el desarrollo y diseminación de resistencias, se deberá asegurar la susceptibilidad de los roedores a la bromadiolona antes de comenzar el tratamiento. Después de la campaña de control, se debería comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos.



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Para minimizar problemas de resistencias y el riesgo de envenenamiento primario, el producto no será utilizado como cebo permanente para prevenir la aparición de roedores.

Para evitar las resistencias, es aconsejable alternar cebos que contengan diferentes sustancias activas anticoagulantes.

Para minimizar el riesgo de envenenamiento secundario, se deberán buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, y al menos siempre que se supervisen y/o repongan los cebos.

Otras medidas de mitigación del riesgo específicas en España.

Contiene un agente amargante y un colorante

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

- La intoxicación puede provocar:
 - Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina -tiempo prolongado de la protrombina- que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (Un tiempo de protrombina normal al ingreso, no excluye el diagnóstico).
- Primeros auxilios:
 - Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
 - En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
 - En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
 - En caso de ingestión, **NO** provoque el vómito.
 - Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal.
 - Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
 - Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
 - Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

• Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Si no han transcurrido dos horas desde la ingesta, realizar vaciado gástrico, administrando a continuación una dosis de carbón activado (25g).
- Antídoto: Vitamina K1 (Konakion®).
- Controlar el tiempo de protrombina o INR.
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Teléfono 91 562 04 20

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Personal profesional y no profesional (público en general): Ver 4.1.4 y 4.2.4

Personal profesional especializado: Ver 4.3.4

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

El producto cumple con el ensayo de estabilidad de dos años a temperatura ambiente.

Almacenar el producto en su envase original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor.

Proteger frente a las heladas.

Mantener alejado de fuentes de fuerte olor.

Las condiciones de transporte del producto deben ajustarse a lo establecido en la legislación nacional.

6. Otra información

Se considera personal profesional especializado al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación específica en control rodenticida de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera personal profesional a aquel que desempeña su actividad profesional en el entorno de los animales o en las actividades estrechamente relacionadas con su explotación.

Se considera personal no profesional al público en general que aplica el producto biocida en el ámbito de su vida privada.



Nº Registro / Autorización: ES/RM-2014-14-00136

MAKI PAT'

Se considera uso interior de edificaciones, al interior de los edificios, aparcamientos cerrados e instalaciones fijas o móviles, cuyos huecos al exterior se encuentran habitualmente cerrados.

Se considera uso alrededor de edificaciones, a lo largo del perímetro exterior de las edificaciones o instalaciones, (sin superar una distancia máxima de 0,5 metros entre el portacebos y la edificación/instalación). También se incluyen aquí los aparcamientos que no entran en la definición de uso interior o de áreas abiertas, estaciones abiertas de autobuses o trenes, o zonas de puerto.

Se considera uso áreas abiertas a zonas como parques, campos de golf, aparcamientos abiertos y los alrededores de las tierras de cultivo, o de las estaciones o zonas de puerto.

Se considera uso en los medios de transporte al que se realiza en el interior del propio transporte (de mercancías y/o personas) y nunca en el exterior de los vehículos o en vehículos abiertos

Si el producto va a utilizarse en zonas públicas, se deben incorporar las siguientes precauciones de seguridad:

Las zonas tratadas deben estar señalizadas durante el periodo de tratamiento y junto a los portacebos debe figurar un aviso que explique el riesgo de envenenamiento primario o secundario provocado por el anticoagulante, y en el cual también se deberán indicar las primeras medidas que deben tomarse en caso de envenenamiento.