

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Ratimor Pellets

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0019703-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0019703-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
4.2. Opis uporabe	7
4.3. Opis uporabe	9
4.4. Opis uporabe	11
4.5. Opis uporabe	13
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	16
5.1. Navodila za uporabo	16
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	17
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	18
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	18
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	18
6. DRUGE INFORMACIJE	19

Poglavlje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Ratimor Pellets Ratimor Pelete Bromadiolone Pellets Ratimor Bromadiolone Pelete
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Unichem d.o.o.
	Naslov	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnik Slovenija
Številka dovoljenja		SI-0019703-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0019703-0000
Datum dovoljenja		03/12/2012
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Unichem d.o.o.,
Naslov proizvajalca	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnik, Slovenija
Kraj proizvodnih obratov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnik, Slovenija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Bromadiolon
Ime proizvajalca	Activa Srl
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

Poglavlje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	aktivna snov	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavlje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku. H372: Škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P260: Ne vdihavati prahu. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280: Nositi zaščitne rokavice. P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč. P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino pri pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov ali na mestu za zbiranje odpada, razen za čiste prazne posode, ki se lahko odstranijo kot nenevaren odpadek.

Poglavlje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Hišne miši – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Redčenje (%): - Število in časovni razpored uporabe: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Najmanjša velikost pakiranja 3 kg. Največje zunanje pakiranje do 25 kg. 1. Prosta (razsuta) vaba pakirana v: (Pakiranja za razsuto vabo so omejena na posamezna pakiranja v vrečah do največ 10 kg.) - PE/PP dupleks vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - "natron" vreči; do 25 kg - PP ali PE vedrih s pokrovom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - papirnat ali PP ali PP žakelj; do 25 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 20 kg 2. Vaba v malih vrečicah (sašetkah) oz. dupleksih Vaba v papirnatih/PP sašetkah, PET/PE sašetkah, papirnatih/PP sašetkah ali PE/aluminijaste sašetke (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g) pakirane v sledеčo zunano embalažo: - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v kartonsko zunano embalažo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - HDPE zabojsnik; do 25 kg

<ul style="list-style-type: none"> - "natron" vrečo; do 25 kg - PP tkano vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 25 kg - PP ali PE vedro s pokrovom; do 20 kg - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši ali podgan, ki je odporna proti poseganju, predpolnjeno ali z možnostjo ponovnega polnjenja, iz HDPE ali PP. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg - PET/PE ali PP/PE ali papirnato/PE vrečo/žakelj; do 10 kg - kovinski kontejner (jerrycan) s pokrovom z navojem; do 10 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 25 kg 3. Vaba v nizki posodici/pladnju (iz PVC ali polistirena ali PP ali PET) zaprta s toplotno zavarjenim pokrovom (iz PET/PP ali PET/PE ali PP) pakirane v sledečo zunanjem embalažo: - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši in podgane, ki je odporna proti poseganju, ki je za enkratno ali večkratno uporabo. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg
--

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točko 5.2

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Podgane – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih

	V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavljeneh mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavljeneh mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Najmanjša velikost pakiranja 3 kg.</p> <p>Največje zunanje pakiranje do 25 kg.</p> <p>1. Prosta (razsuta) vaba pakirana v: (Pakiranja za razsuto vabo so omejena na posamezna pakiranja v vrečah do največ 10 kg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE/PP dupleks vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - "natron" vreči; do 25 kg - PP ali PE vedrih s pokrovom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - papirnat ali PP ali PP žakelj; do 25 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 20 kg <p>2. Vaba v malih vrečicah (sašetkah) oz. dupleksih Vaba v papirnatih/PP sašetkah, PET/PE sašetkah, papirnatih/PP sašetkah ali PE/aluminijaste sašetke (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g) pakirane v sledečo zunano embalažo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v kartonsko zunano embalažo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - HDPE zabojsnik; do 25 kg - "natron" vrečo; do 25 kg - PP tkano vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 25 kg - PP ali PE vedro s pokrovom; do 20 kg - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši ali podgan, ki je odporna proti poseganju, predpolnjeno ali z možnostjo ponovnega polnjenja, iz HDPE ali PP. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali topotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg - PET/PE ali PP/PE ali papirnato/PE vrečo/žakelj; do 10 kg - kovinski kontejner (jerrycan) s pokrovom z navojem; do 10 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 25 kg

3. Vaba v nizki posodici/pladnju (iz PVC ali polistirena ali PP ali PET) zaprta s toplotno zavarjenim pokrovom (iz PET/PP ali PET/PE ali PP) pakirane v sledečo zunanjem embalažo:
 - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši in podgane, ki je odporna proti poseganju, ki je za enkratno ali večkratno uporabo. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.

- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točko 5.2

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Hišne miši in/ali podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavitevno

	<p>mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitevih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitevih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitevih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Najmanjša velikost pakiranja 3 kg.</p> <p>Največje zunanje pakiranje do 25 kg.</p> <p>1. Prosta (razsuta) vaba pakirana v: (Pakiranja za razsuto vabo so omejena na posamezna pakiranja v vrečah do največ 10 kg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE/PP dupleks vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - "natron" vreči; do 25 kg - PP ali PE vedrih s pokrovom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - papirnat ali PP ali PP žakelj; do 25 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 20 kg <p>2. Vaba v malih vrečicah (sašetkah) oz. dupleksih Vaba v papirnatih/PP sašetkah, PET/PE sašetkah, papirnatih/PP sašetkah ali PE/aluminijaste sašetke (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g) pakirane v sledečo zunano embalažo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v kartonsko zunano embalažo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - HDPE zabojsnik; do 25 kg - "natron" vrečo; do 25 kg - PP tkano vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 25 kg - PP ali PE vedro s pokrovom; do 20 kg - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši ali podgan, ki je odporna proti poseganju, predpolnjeno ali z možnostjo ponovnega polnjenja, iz HDPE ali PP. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg - PET/PE ali PP/PE ali papirnato/PE vrečo/žakelj; do 10 kg - kovinski kontejner (jerrycan) s pokrovom z navojem; do 10 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 25 kg <p>3. Vaba v nizki posodici/pladnju (iz PVC ali polistirena ali PP ali PET) zaprta s toplotno zavarjenim pokrovom (iz PET/PP ali PET/PE ali PP) pakirane v sledečo zunano embalažo:</p>

- Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši in podgane, ki je odporna proti poseganju, ki je za enkratno ali večkratno uporabo. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali topotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na **območja**, ki niso izpostavljeni vodi.
- Postaje pregledujte [pri miših – najmanj enkrat na dva do tri dni] [pri podganah – vsakih pet do sedem dni] od **začetka** tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanjem.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Proizvoda ne nastavljamte neposredno v rove.

4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Hišne miši in/ali podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podrobni opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Pokrita in zaščitena mesta za nastavljene vabe.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljeni

	<p>na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavitevno mesto. Nastavitevna mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Najmanjša velikost pakiranja 3 kg. Največje zunanje pakiranje do 25 kg.</p> <p>1. Prosta (razsuta) vaba pakirana v: (Pakiranja za razsuto vabo so omejena na posamezna pakiranja v vrečah do največ 10 kg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE/PP dupleks vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - "natron" vreči; do 25 kg - PP ali PE vedrih s pokrovom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - papirnat ali PP ali PP žakelj; do 25 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 20 kg <p>2. Vaba v malih vrečicah (sašetkah) oz. dupleksih Vaba v papirnatih/PP sašetkah, PET/PE sašetkah, papirnatih/PP sašetkah ali PE/aluminijaste sašetke (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g) pakirane v sledečo zunanjo embalažo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v kartonsko zunanjo embalažo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - HDPE zabojsnik; do 25 kg - "natron" vrečo; do 25 kg - PP tkano vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 25 kg - PP ali PE vedro s pokrovom; do 20 kg - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši ali podgan, ki je odporna proti poseganju, predpolnjeno ali z možnostjo ponovnega polnjenja, iz HDPE ali PP. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg - PET/PE ali PP/PE ali papirnato/PE vrečo/žakelj; do 10 kg - kovinski kontejner (jerrycan) s pokrovom z navojem; do 10 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 25 kg

3. Vaba v nizki posodici/pladnju (iz PVC ali polistirena ali PP ali PET) zaprta s toplotno zavarjenim pokrovom (iz PET/PP ali PET/PE ali PP) pakirane v sledečo zunanjem embalažo:
 - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši in podgane, ki je odporna proti poseganju, ki je za enkratno ali večkratno uporabo. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Odstranite ostanek proizvoda ob koncu tretiranja.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznegodeksa najboljše prakse.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznegodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- Proizvod se lahko uporablja kot stalna vaba samo na krajih z veliko možnostjo ponovne invazije, če se druge metode nadzora izkažejo kot neučinkovite.
- Proizvoda ne uporablajte v intervalih (pulsed baiting).

4.4.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Hišne miši in/ali podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: Odrasli osebki in mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe

	Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Pokrita in zaščitena mesta za nastavljene vabe.
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p> <p>Redčenje (%): -</p> <p>Število in časovni razpored uporabe: Pri napadu miši nastavite 10 g do 40 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na nastavljeno mesto. Nastavljena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavljene mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Najmanjša velikost pakiranja 3 kg. Največje zunanje pakiranje do 25 kg.</p> <p>1. Prosta (razsuta) vaba pakirana v: (Pakiranja za razsuto vabo so omejena na posamezna pakiranja v vrečah do največ 10 kg.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE/PP dupleks vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - "natron" vreči; do 25 kg - PP ali PE vedrih s pokrovom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - papirnat ali PP ali PP žakelj; do 25 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 20 kg <p>2. Vaba v malih vrečicah (sašetkah) oz. dupleksih Vaba v papirnatih/PP sašetkah, PET/PE sašetkah, papirnatih/PP sašetkah ali PE/aluminijaste sašetke (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 200 g) pakirane v sledečo zunano embalažo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v kartonsko zunano embalažo; do 20 kg - PE ali PP pakiranjih; do 25 kg - HDPE zabojsnik; do 25 kg - "natron" vrečo; do 25 kg - PP tkano vrečo ali večslojno papirnato vrečo; do 25 kg - PP ali PE vedro s pokrovom; do 20 kg - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši ali podgan, ki je odporna proti poseganju, predpolnjeno ali z možnostjo ponovnega polnjenja, iz HDPE ali PP. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg - PET/PE ali PP/PE ali papirnato/PE vrečo/žakelj; do 10 kg - kovinski kontejner (jerrycan) s pokrovom z navojem; do 10 kg

<ul style="list-style-type: none"> - škatle iz kartona ali lepenke; do 20 kg - škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali vložkom; do 20 kg - plastično vrečo (PE, PE/PP, PP ali papir/PE) pakirana v "natronsko" vrečo ali PP/HDPE vedro s pokrovom ali kartonsko škatlo ali škatlo iz lepenke; do 25 kg 3. Vaba v nizki posodici/pladnju (iz PVC ali polistirena ali PP ali PET) zaprta s toplotno zavarjenim pokrovom (iz PET/PP ali PET/PE ali PP) pakirane v sledečo zunanjem embalažo: - Rodentomatik - postajo za vabe za zatiranje miši in podgane, ki je odporna proti poseganju, ki je za enkratno ali večkratno uporabo. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali toplotno skrčljivo plastično folijo; do 20 kg

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljjanju.
- Zamenjajte morebitne vabe v postajah, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.
- Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
- Za zunanjou uporabo morajo biti mesta z vabami pokrita in postavljena na strateških mestih, da se zmanjša izpostavljenost neciljnim vrstam.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo]".
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- Proizvod se lahko uporablja kot stalna vaba samo na krajih z veliko možnostjo ponovne invazije, če se druge metode nadzora izkažejo kot neučinkovite.
- Proizvoda ne uporabljajte v intervalih (pulsed baiting).
- Proizvoda ne nastavlajte neposredno v rove.

4.5.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

Poglavlje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Poklicni uporabniki:

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev. Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane).
- Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo teže sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienске ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmilšča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrдite postaje na tla ali druge strukture.
- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlagom tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti pritrđena, da je ni možno odvleči iz postaje za nastavljanje vab.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374).
- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite.
- Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o prenestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
- Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
- Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.
- Navodila za uporabo, ki so specifična za vabe:
 - Vabe v vrečkah: Ne odpirajte vrečk, ki vsebujejo vabe.
 - Razsuti peleti-granule: Z odmerjevalnikom namestite vabo v postajo za nastavljanje vab. Prašenje lahko zmanjšate z uporabo primerenega sesalnika za prah. Prah s postaje ali iz odmerjevalnika (vevnica) obrišite z vlažno krpo, ki jo po uporabi odstranite kot nevarni odpadek.

Usposobljeni poklicni uporabniki:

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Razen tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo teže sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienске ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Proizvod nastavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmilšča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrđite postaje na tla ali druge strukture.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

-
- Postaje morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
 - Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlagom tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
 - Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvleči iz postaje.
 - Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
 - Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
 - Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374).
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja.
 - Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
 - Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
 - Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
 - Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
 - Navodila za uporabo, ki so specifična za vabe:
 - Vabe v vrečkah: [Za vrečke, ki jih ni mogoče izprazniti – Ne odpirajte vrečk, ki vsebujejo vabo].
 - Razsuti peleti-granule: Z odmerjevalnikom namestite vabo v postajo za nastavljanje vab. Prašenje lahko zmanjšate z uporabo primerjnega sesalnika za prah. Prah s postaje ali iz odmerjevalnika (vevnice) obrišite z vlažno krpo, ki jo po uporabi odstranite kot nevarni odpadek.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Poklicni uporabniki:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiraju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve iščite in odstranjujte poginule glodavce dovolj pogosto med obdobjem tretiranja (npr. najmanj dvakrat tedensko).
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.
- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:
 - proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);
 - se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;
 - morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod).
- Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh.
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.
- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

Usposobljeni poklicni uporabniki:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiraju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“).
- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino.

-
- Proizvod se lahko uporablja kot stalna vaba samo na krajih z veliko možnostjo ponovne invazije, če se druge metode nadzora izkažejo kot neučinkovite.
 - Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda [razen v primerih, ko se uporablja kot stalna vaba].
 - Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo.
 - Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.
 - Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščitenih mestih za vabo, ne umivajte z vodo.
 - Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant.
- Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.
- V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
- V primeru:
 - izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
 - izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo najmanj 10 minut, medtem, ko veke držite odprte.
 - oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo.
- Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.
- Ne izzivajte bruhanja.
- Če proizvod pogolnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.
- Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.
- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „ime proizvoda in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.
- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. [...]
Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavlje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi zakasnitev delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni po zaužitju vabe.

- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. klešče.

- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.

Ustrezni H- in P-stavki skladni z zadnjo konsolidirano raličico CLP Uredbe (EU) 1272/2008:

P308 + P313 - PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P314 - Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenemu odstranjevalcu nevarnih odpadkov ali na mestu za zbiranje odpada, razen za čiste prazne posode, ki se lahko odstranijo kot nenevaren odpadek.