



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/02
URBROJ: 534-03-3-2/3-22-4
Zagreb, 27. travnja 2022.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **AGRORAT BRODI-3**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Biocidni proizvod za opću uporabu može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć.

V. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

VI. Ovo rješenje važi do **1.7.2024.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Španjolske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda pod imenom za tržište Republike Hrvatske **AGRORAT BRODI-3**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Biocidni proizvod za opću uporabu može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 1.7.2024. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Dostaviti:

1. **Laboratorios Agrochem S.L., C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska**
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

AGRORAT BRODI-3

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/02

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0028596-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	AGRORAT BRODI-3
-----------------	-----------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Laboratorios Agrochem S.L.
	Adresa	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud, Esparreguera, Španjolska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/02	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0028596-0000	
Datum odobrenja	27.4.2024.	
Datum isteka odobrenja	1.7.2024.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	LABORATORIOS AGROCHEM, S.L.
Adresa proizvođača	Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera-Barcelona Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	LABORATORIOS AGROCHEM, S.L. -Tres Rieres 10, 08292 Esparreguera-Barcelona Španjolska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Brodifakum
Naziv proizvođača	ACTIVA S.r.l.
Adresa proizvođača	ACTIVA S.r.l., Via Feltre, 32, 20132 – Milano, Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Dr. TEZZA S.r.l. - Via Tre Ponti, 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italija

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0029

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu) – žitni mamac

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Oznake obavijesti	P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute. P260 Ne udisati prašinu. P280 Nositi zaštitne rukavice. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Uporaba 1 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - neprofesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).

Količine kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m</p> <p>Razrjeđivanje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p> <p><u>Štakori</u> - 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p>
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Najveća veličina pakiranja je 150 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET/PETMET/PE ili PET/ALU/PE ili PET/PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p>

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Uporaba 2 – Smeđi štakori – neprofesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	Na otvorenom, oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: <u>Štakori</u> - 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najveća veličina pakiranja je 150 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g. Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton, PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET /ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Uporaba 3 - Kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	U zatvorenom prostoru.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju

	velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 60 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Uporaba 4 – Smeđi štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor

	<p>Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i></p> <p>Uobičajeno ime: smeđi štakor</p> <p>Stadij razvoja: mladi</p>
Područje primjene	U zatvorenom prostoru.
Načini primjene	<p>Metoda: kutija za mamce</p> <p>Detaljan opis:</p> <p>Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).</p>
Količine kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m.</p> <p>Razrjeđivanje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p><u>Štakori</u></p> <p>- 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p>
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i

vode.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5. Opis uporabe

Tablica 5. Uporaba br. 5 – Uporaba 5 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli
	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi
	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli
	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	Na otvorenom, oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). <u>Štakori</u> - 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana (miševi) odnosno svakih 5 do 7 dana (štakori), a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce.

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Uporaba br. 6 – Uporaba 6 - Kućni miševi i/ili smeđi štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi</p> <p>Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi</p>
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	<p>Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).</p>
Količine kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Kućni miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja</p>
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Količina mamca po pakirnoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Poduzeti preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ovaj se proizvod može koristiti samo u zatvorenim prostorima i na mjestima koja nisu dostupna djeci ili nećiljanim životinjama.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Vidi i Opće upute za uporabu

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7. Opis uporabe

Tablica 7. Uporaba br. 7 – Uporaba 7 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i>

	<p>Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: odrasli</p> <p>Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni miš Stadij razvoja: mladi</p>
Područje primjene	<p>na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada.</p>
Načini primjene	<p>Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije). - Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.</p>
Količine kod primjene i učestalost	<p>Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini</p>
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg. Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8. Opis uporabe

Tablica 8. Uporaba br. 8 – Uporaba 8 – Smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru i odlagalištima otpada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mladi
Područje primjene	na otvorenom Područja na otvorenom

	Vanjska odlagališta otpada
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije). - Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja; jazbina: 200 g mamca po jazbini Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg. Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

4.8.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

4.8.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.8.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba):

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (npr. klopke).
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.
- Pri uporabi proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je moguće).
- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.

- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je moguće).
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvoditelja, u skladu s izvidom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodeksa dobre prakse.
- Ako je potrošnja mamca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mamca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca.

- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za profesionalne korisnike”).

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.

- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike”).
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naizmjenično antikoagulate različitog načina djelovanja ili drugačijeg načina djelovanja.
- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom između primjena.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadržava antikoagulantnu tvar.

Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.

- Antidot: Vitamin K1 daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

- Dodira s kožom, oprati kožu vodom, a zatim vodom i sapunom.
- Dodira s očima, isprati oči odgovarajućom tekućinom ili vodom, držiti kapke otvorenim najmanje 10 minuta.
- Gutanja, oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju.

Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinara.

Zaštitne kutije za mamce potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati”; „sadrži rodenticid”; „naziv proizvoda”; „aktivna tvar” i „u slučaju nesreće nazoviti Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342”.

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamce i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvorenim i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. OSTALE INFORMACIJE

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvataljke kod skupljanja i njihova odlaganja.

Proizvod sadrži gorcu tvar i boju.

Postregistracijski uvjeti:

- Studija stabilnosti proizvoda na 2 godine.