

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Biopren cockroach gel

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0316/MRP/ES/APP(NA)-2021-18-00746

Numărul curent R4BP 3: RO-0028667-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Frazе de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	15
5.1. Instrucțiuni de utilizare	15
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	15
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	15
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	16
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	16
6. Alte informații	16

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

Biopren gel pentru combaterea gândacilor de bucătărie

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Adresa	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Ungaria
Numărul curent	RO/2022/0316/MRP/ES/APP(NA)-2021-18-00746	
Numărul curent R4BP 3	RO-0028667-0000	
Data autorizației	22/03/2022	
Data de expirare a autorizației	23/03/2026	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Mylva S.A.
Adresa producătorului	Via Augusta 48 08006 Barcelona (Catalonia) Spania
Adresa locurilor de producție	Sant Galderic 23, poligon industrial ponent , Sant pol de Mar 08395 Barcelona (Catalonia) Spania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	37 - Imidacloprid
Numele producătorului	Bayer SAS
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair 90106 Lyon Cedex Franța
Adresa locurilor de producție	Alte Heerst, D-41538 Dormagen Germania
Substanța activă	1386 - S-metopren
Numele producătorului	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
Adresa producătorului	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungaria
Adresa locurilor de producție	H-1107 Budapest, Szállás u. 6. 1107 Szállás, Budapest Ungaria

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Substanța activă	138261-41-3	428-040-8	2,15
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Substanța activă	65733-16-6		0,5
OIT		Substanța inactivă	26530-20-1	247-761-7	0,04

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține 2-octil-2H-izotiazol-3-onă (OIT) și 1,2-benzotiazol-3 (2H) -onă (BIT). Poate
-------------------------	--

	provoca o reacție alergică.
Fraze de precauție	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.</p> <p>Evitați dispersarea în mediu.</p> <p>Colectați scurgerile de produs.</p> <p>Aruncați conținutul la Produsul și recipientul acestuia trebuie eliminate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările în vigoare în locuri sau la firme specializate (utilizare profesională)..</p> <p>Aruncați conținutul la Produsul și recipientul acestuia trebuie eliminate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările în vigoare (utilizare profesională și non-profesională)..</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - # 1 În interior, aplicat în găuri și crăpături - Momeală gel aplicată sub formă de picături - Utilizare populație (non-profesională)

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Periplaneta americana denumirea comună: American cockroaches etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve</p> <p>denumirea științifică: Blatta orientalis denumirea comună: Oriental cockroaches etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve</p> <p>denumirea științifică: Blattella germanica denumirea comună: German cockroaches etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve</p>
Domeniul de utilizare	<p>de interior</p> <p>În interior, aplicat în găuri și crăpături. În clădiri rezidențiale.</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Utilizarea directă a momelii gel aplicată sub formă de picături cu seringă.</p>

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:
Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g).
Gândacul german (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 picături/m²).
Gândacul de bucătărie (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²).
Gândacul american (*Periplaneta americana*): 0,16 g/m² g/m² (4-6 picături/m²).
Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă.
Frecvența tratamentului: la 3 luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat.
Până la 6 aplicări pe an.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Seringă din plastic LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 8 sau 10 grame de momeală gel

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momeală gel gata de utilizat aplicată sub formă de picături din seringă. Picăturile aderă la suprafețe neporoase.
A se aplica numai în găuri și crăpături.
A se utiliza în clădiri rezidențiale, în interior.
Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.
Produsul biocid se aplică numai local în găuri și crăpături, unde se află gândacii departe de copii și animale:
- în locuri greu accesibile
- în locuri întunecate: sub chiuvetă, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc.
- în locuri cu temperatură ridicată: în găurile și crăpăturile din spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc.
- în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc.
A nu se utiliza pe lemn și alte suprafețe absorbante.
Evitați contactul cu suprafețele tratate.
Nu expuneți momeala la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (de ex. radiator).
Nu amestecați cu alte substanțe chimice și nu utilizați în zone care au fost tratate recent cu alte insecticide.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Evitați contactul cu suprafețele tratate.
Evitați contactul cu ochii și pielea.
Este interzisă aplicarea produsului în zonele accesibile copiilor.
Tratamentul trebuie limitat la zonele care nu sunt accesibile animalelor de companie.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate și alte deșeuri generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

See Directions of use

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - # 2 În interior, aplicat în găuri și crăpături - Momeală gel aplicată sub formă de picături - Utilizare profesională

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Periplaneta americana
denumirea comună: Cucaracha americana
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blatta orientalis
denumirea comună: Cucaracha orientală
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blattella germanica
denumirea comună: Cucaracha alemană
etapă de dezvoltare: ivarérett egyedek és lárvák

Domeniul de utilizare

de interior

În interior, aplicat în găuri și crăpături.
În clădiri rezidențiale și publice.

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Utilizarea directă a momelii gel aplicată sub formă de picături cu seringă
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g). Numărul de aplicări și momentul aplicării: Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g). Gândacul german (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m ² (3-4 picături/m ²). Gândacul de bucătărie (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m ² (4-6 picături/m ²). Gândacul american (<i>Periplaneta americana</i>): 0,16 g/m ² (4-6 picături/m ²). Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă. Frecvența tratamentului: la 3 luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat. Până la 6 aplicări pe an.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Seringă din plastic LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 8 sau 10 grame de momeală gel

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Momeală gel gata de utilizat aplicată sub formă de picături din seringă. Picăturile aderă la suprafețe neporoase. A se aplica numai în găuri și crăpături. A se utiliza în clădiri rezidențiale, în interior. Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.</p> <p>Produsul biocid se aplică numai local în găuri și crăpături, unde se află gândacii departe de copii și animale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în locuri greu accesibile - în locuri întunecate: sub chiuvetă, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc. - în locuri cu temperatură ridicată: în găurile și crăpăturile din spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc. - în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc. <p>A nu se utiliza pe lemn și alte suprafețe absorbante. Evitați contactul cu suprafețele tratate. Nu expuneți momeala la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (de ex. radiator). Nu amestecați cu alte substanțe chimice și nu utilizați în zone care au fost tratate recent cu alte insecticide.</p>
--

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

<p>Evitați contactul cu suprafețele tratate. Evitați contactul cu ochii și pielea. Este interzisă aplicarea produsului în zonele accesibile copiilor. Tratamentul trebuie limitat la zonele care nu sunt accesibile animalelor de companie.</p>

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate și alte deșeurile generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeurile periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - # 3 În interior, aplicat în găuri și crăpături - Momeală gel aplicată sub formă de picături - Utilizatori profesioniști calificați

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: <i>Periplaneta americana</i> denumirea comună: Cucaracha americana etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve denumirea științifică: <i>Blatta orientalis</i> denumirea comună: Cucaracha orientală etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve denumirea științifică: <i>Blattella germanica</i> denumirea comună: Cucaracha germană etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve
Domeniul de utilizare	de interior În interior, aplicat în găuri și crăpături. În clădiri rezidențiale și publice.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Utilizarea directă a momealii gel aplicată sub formă de picături cu seringă

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:
Numărul de aplicări și momentul aplicării:
Doza: în funcție de gradul de infestare și de specia de gândaci (1 picătură = 0,04 g).
Gândacul german (*Blattella germanica*): 0,12-0,16 g/m² (3-4 picături/m²).
Gândacul de bucătărie (*Blatta orientalis*): 0,16-0,24 g/m² (4-6 picături/m²).

Gândacul american (*Periplaneta americana*): 0,16 g/m² g/m² (4-6 picături/m²).
Frecvența de aplicare: 1 aplicare la fiecare 2 săptămâni. Doar 1 aplicare suplimentară dacă infestarea persistă.
Frecvența tratamentului: la 3 luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat.
Până la 6 aplicări pe an.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Seringă din plastic LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sau 50 grame de produs
tub de plastic LDPE conținând 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450 sau 500 grame de produs

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momeală gel gata de utilizat aplicată sub formă de picături din tub. Picăturile aderă la suprafețe neporoase. A se aplica numai în găuri și crăpături.
Pentru utilizare în clădiri rezidențiale și publice, în interior:
Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.
Produsul biocid se aplică numai local în găuri și crăpături, unde se află gândacii departe de copii și animale:
- în locuri greu accesibile
- în locuri întunecate: sub chiuveță, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc.
- în locuri cu temperatură ridicată: în găurile și crăpăturile din spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc.
- în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc.
Nu amestecați cu alte substanțe chimice și nu utilizați în zone care au fost tratate recent cu alte insecticide.
A nu se utiliza pe lemn și alte suprafețe absorbante.
Evitați contactul cu suprafețele tratate.
Nu expuneți momeala la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură (de ex. radiator).
În încăperile de depozitare, produsul poate fi utilizat numai lângă alimente ambalate corespunzător.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Evitați contactul cu suprafețele tratate.
Purtați mănuși adecvate pe durata aplicării.
Evitați contactul cu ochii și pielea.
Este interzisă aplicarea produsului în zonele accesibile copiilor.
Tratamentul trebuie limitat la zonele care nu sunt accesibile animalelor de companie.
Aplicați un sistem integrat de combatere a dăunătorilor care include metode chimice și fizice precum și alte măsuri de sănătate publică. Pentru acest lucru, luați în considerare specificațiile locale (condițiile climatice, organismele țintă, condițiile de utilizare etc.)
Monitorizați eficiența produsului în timpul utilizării, dacă este necesar, trebuie identificată cauza eficienței scăzute pentru a preveni

dezvoltarea rezistenței și pentru a identifica o eventuală rezistență.
Nu utilizați produsul dacă este suspectată sau dovedită rezistența la substanța activă.
Informați titularul autorizației, dacă utilizarea produsului nu s-a dovedit a fi eficientă.

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate, apa de clătire, ambalajele și alte deșeuri generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Deșeurile trebuie marcate în conformitate cu decizia 2014/955/UE.
Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - # 4 În interior - Momeală gel aplicată în stație de momeală - Utilizare de către publicul larg (non-profesională)

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Periplaneta americana
denumirea comună: Cucaracha americana
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blatta orientalis
denumirea comună: Cucaracha orientală
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blattella germanica
denumirea comună: Cucaracha alemana
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

Domeniul de utilizare

	<p>de interior</p> <p>În interior. În clădiri rezidențiale.</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Stație de momeală gata de utilizare</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: frecvența de aplicare: dacă infecția persistă, aprox. după 4 săptămâni, stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Numărul de aplicări și momentul aplicării: Dozare: depinde de gravitatea infestării - în caz de contaminare redusă 0,16 g/m2 - în caz de contaminare severă 0,24 g/m2</p> <p>Frecvența de aplicare: dacă infestarea persistă în continuare, aprox. după 4 săptămâni stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi</p> <p>Frecvența tratamentului: la trei luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Stație de momeală din plastic (PET) / capsulă pentru stație de momeală care conține 1, 2, 2,5, 3, 4 sau 5 grame de momeală gel</p>

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momeală în stație de momeală gata de utilizare.
A se utiliza în clădiri rezidențiale, în interior.
Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.
Produsul biocid se aplică prin plasarea stațiilor de momeală numai în locurile unde gândacii se află departe de copii și animale:
- în locuri greu accesibile: în spatele mobilei etc.
- în locuri întunecate: sub chiuvetă, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc.
- în locuri cu temperatură ridicată: în spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc.
- în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu deschideți cu forța stația de momeală.
Este interzisă introducerea degetului în găurile stației de momeală.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate și alte deșeurile generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeurile periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.
La sfârșitul tratamentului, colectați și eliminați stațiile de momeală.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - # 5 În interior - Momeală gel aplicată în stație de momeală - Utilizare profesională

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Periplaneta americana
denumirea comună: Cucaracha americana
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blatta orientalis
denumirea comună: Cucaracha orientală
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blattella germanica
denumirea comună: Cucaracha germană
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

Domeniul de utilizare

de interior

În interior.
În clădiri rezidențiale și publice.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:
Stație de momeală gata de utilizare.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: frecvența de aplicare: dacă infecția persistă, aprox. după 4 săptămâni, stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi.

Diluire (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

Numărul de aplicări și momentul aplicării:

Dozare: depinde de gravitatea infestării

- în caz de contaminare redusă 0,16 g/m²

- în caz de contaminare severă 0,24 g/m²

Frecvența de aplicare: dacă infestarea persistă în continuare, aprox. după 4 săptămâni stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi.

Frecvența tratamentului: la trei luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat.

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Stație de momeală din plastic (PET) / capsulă pentru stație de momeală care conține 1, 2, 2,5, 3, 4 sau 5 grame de momeală gel

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momeală în stație de momeală gata de utilizare.

A se utiliza în clădiri rezidențiale, în interior.

Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.

Produsul biocid se aplică prin plasarea stațiilor de momeală numai în locurile unde gândacii se află departe de copii și animale:

- în locuri greu accesibile: în spatele mobilei etc.

- în locuri întunecate: sub chiuvetă, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc.

- în locuri cu temperatură ridicată: în spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc.

- în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu deschideți cu forța stația de momeală.

Este interzisă introducerea degetului în găurile stației de momeală.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate și alte deșeurile generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeurile periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.
La sfârșitul tratamentului, colectați și eliminați stațiile de momeală.

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - # 6 în interior - Momeală gel aplicată în stație de momeală - Utilizatori profesioniști calificați

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid și inhibitor al dezvoltării împotriva gândacilor

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Periplaneta americana
denumirea comună: Cucaracha americana
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blatta orientalis
denumirea comună: Cucaracha orientală
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

denumirea științifică: Blattella germanica
denumirea comună: Cucaracha germană
etapă de dezvoltare: indivizi maturi și larve

Domeniul de utilizare

de interior

În interior.
În clădiri rezidențiale și publice.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: cerere momeală
Descriere detaliată:
Stație de momeală gata de utilizare

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: frecvența de aplicare: dacă infecția persistă, aprox. după 4 săptămâni, stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:
Numărul de aplicări și momentul aplicării:
Dozare: depinde de gravitatea infestării
- în caz de contaminare redusă 0,16 g/m²

	- în caz de contaminare severă 0,24 g/m ²
	Frecvența de aplicare: dacă infestarea persistă în continuare, aprox. după 4 săptămâni stațiile de momeală trebuie înlocuite cu stații noi
	Frecvența tratamentului: la trei luni după dispariția infestării tratamentul poate fi repetat.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Stație de momeală din plastic (PET) / capsulă pentru stație de momeală care conține 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25 sau 30 grame de momeală gel.

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Momeală în stație de momeală gata de utilizare.
Pentru utilizare în clădiri rezidențiale și publice, în interior.
Înainte de tratament, îndepărtați toate sursele naturale de hrană din zona infectată pentru a facilita consumarea gelului.
Produsul biocid se aplică prin plasarea stațiilor de momeală numai în locurile unde gândacii se află departe de copii și animale:

- în locuri greu accesibile: în spatele mobilei etc.
- în locuri întunecate: sub chiuvetă, în spatele vasului de toaletă, în apropierea scurgerii, etc.
- în locuri cu temperatură ridicată: în spatele motoarelor, frigiderelor, mașinilor de spălat, mașinilor de spălat vase etc.
- în locuri în care se află deșeuri alimentare sau materii organice: sub și în spatele dulapurilor de bucătărie, lângă coșurile de gunoi, încăperi de depozitare, pivnițe, curți etc.

4.6.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu deschideți cu forța stația de momeală.
Este interzisă introducerea degetului în găurile stației de momeală.
Aplicați un sistem integrat de combatere a dăunătorilor care include metode chimice și fizice precum și alte măsuri de sănătate publică. Pentru acest lucru, luați în considerare specificațiile locale (condițiile climatice, organismele țintă, condițiile de utilizare etc.)
Monitorizați eficiența produsului în timpul utilizării, dacă este necesar, trebuie identificată cauza eficienței scăzute pentru a preveni dezvoltarea rezistenței și pentru a identifica o eventuală rezistență.
Nu utilizați produsul dacă este suspectată sau dovedită rezistența la substanța activă.
Informați titularul autorizației, dacă utilizarea produsului nu s-a dovedit a fi eficientă.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vezi Instrucțiunile de utilizare

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Recipientele goale, produsele neutilizate, apa de clătire, ambalajele și alte deșeuri generate în timpul tratamentului sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie eliminate în conformitate cu reglementările în vigoare.
La sfârșitul tratamentului, colectați și eliminați stațiile de momeală.
Deșeurile trebuie marcate în conformitate cu decizia 2014/955/UE.

Nu se permite pătrunderea produsului pe și în sol, în ape naturale, sau în sistemul de canalizare.

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vezi Instrucțiunile de utilizare

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile. Înainte de a aplica produsul, evaluați gradul de infestare și zonele afectate. A se utiliza numai în interior, în zone care nu sunt accesibile copiilor și animalelor de companie.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Pentru a preveni dezvoltarea rezistenței, produsul trebuie utilizat alternativ cu produse care nu conțin aceeași substanță activă. Nu utilizați direct pe sau lângă alimente, furaje sau băuturi sau pe orice suprafață sau dispozitiv care poate intra în contact direct cu alimente, furaje, băuturi sau animale vii. Produsul trebuie aplicat din nou până la eliminarea dăunătorilor. Utilizați produsul în dozele și cu frecvența recomandată. Pentru o eficiență cât mai mare a tratamentului, respectați bunele practici de igienă: îndepărtați sau restricționați accesul la toate sursele de hrană. Momeala trebuie să fie principala sursă de hrană disponibilă pentru gândaci. Pentru a optimiza eficiența, verificați momeala o dată pe săptămână și înlocuiți/completați dacă este deteriorată sau murdară. Produsul trebuie plasat în condiții de siguranță pentru a reduce riscul de consum de către alte animale sau copii. Utilizați în zone ascunse, la care se ajunge greu și care sunt departe de apă. Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și restul reziduurilor (de ex. insecte moarte) în conformitate cu reglementările locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acordarea primului ajutor de bază:

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

Spălați cu apă înainte de o nouă utilizare. Spălați pielea cu apă din abundență. În caz de iritație, consultați un medic specialist.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

În caz de simptome, clătiți ochii. Dacă este cazul, îndepărtați lentilele de contact, dacă acestea se îndepărtează ușor. Contactați CENTRUL TOXICOLOGIC sau medicul.

• Dacă este necesar, duceți persoana accidentată la spital și arătați ambalajul sau eticheta produsului, dacă este posibil. Nu lăsați singură persoana intoxicată.

Sfaturi medicale pentru medici și personalul medical

• Tratament simptomatic și de susținere.

DACĂ ESTE NEVOIE DE CONSULT MEDICAL, PĂSTRAȚI LA ÎNDEMÂNĂ ETICHETA SAU RECIPIENTUL ȘI SOLICITAȚI INFORMARE TOXICOLOGICĂ DE LA PERSONALULUI MEDICAL.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Vezi secțiunile 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4, 4.5.4 și 4.6.4.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Durata de păstrare în recipientul original este de 4 ani în condiții normale de depozitare.

A se feri de îngheț.

A se păstra în recipientul original bine închis.

A se păstra la loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Temperatura de depozitare recomandată: Între 5 °C și 45 °C.

A se păstra ferit de lumină.

A nu se păstra lângă alimente, băuturi sau furaje.

6. Alte informații

Definiții:

Utilizator profesionist calificat: specialist în combaterea dăunătorilor care a beneficiat formare specifică cu privire la utilizarea insecticidelor în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

Utilizator profesionist: utilizatorul care aplică produse biocide la locul de muncă. Persoana are unele cunoștințe și abilități cu privire la utilizarea substanțelor chimice și este capabil să utilizeze corect echipamentele de protecție personală (PPE), dacă este necesar.

Publicul larg (non-profesional): un utilizator neprofesional care aplică ocazional produsul în scopuri proprii.

Produsul conține o substanță amară care nu este pe placul copiilor și a animalelor de companie.

Solicitantul trebuie să se asigure că publicul larg poate face diferența între specii și poate stabili gradul de infestare, pentru utilizarea corectă a dozei.

Picăturile conțin 0,04 g de momeală sub formă de gel. Solicitantul trebuie să indice pe etichetă că o picătură echivalează cu 0,04 g de produs.

În funcție de numărul stațiilor de momeală trebuie indicat pe etichetă, ce cantitate de produs conține stația de momeală. De exemplu, 0,16 g/m² = 4 stații de momeală cu câte 1-1 grame de produs pentru un spațiu de 25 m².