

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Ratimor Plus žitni mamac

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/21-12/10

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0021617-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	9
5.1. Upute za uporabu	9
5.2. Mjere za smanjenje rizika	10
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	10
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	10
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	11
6. Ostale informacije	11

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Ratimor Plus žitni mamac

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/21-12/10	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0021617-0000	
Datum odobrenja	04/02/2014	
Datum isteka odobrenja	27/01/2026	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	12 - Bromadiolon
Naziv proizvođača	Activa Srl
Adresa proizvođača	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0,0029

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti . Sadrži oktilinon (ISO); 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć liječnika. Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada..

Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Opća javnost - suzbijanje kućnih miševa u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: Kućni miš Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se postavlja u zaštitne kutije za mamce zaštićene od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti 10 g do 40 g mamca po mjestu postavljanja. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g): - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u vreće od natron papira u količini do 50 g; - pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 50 g; - pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 50 g; - pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 50 g; - jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom

spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papir ili PE/aluminija (10 g - 50 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 50 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 50 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 50 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 50 g;
- pakirano u omot, u količini do 50 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 50 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 50 g;
- jedna ili više vrećica pakirana u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g;

- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 50 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 50 g;

- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 50 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punive zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 50 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, u količini do 50 g.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Opća javnost - suzbijanje štakora u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: Crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se postavlja u zaštitne kutije za mamce zaštićene od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti 10 g do 200 g mamca po

mjestu postavljanja.
Razrjeđivanje (%): 0
Broj i vremenski raspored primjene:
Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

1. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira u količini do 150 g;
- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papira ili PE/aluminija (10 g - 150 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 150 g;
- pakirano u omot, u količini do 150 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;
- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 150 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punjive zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 150 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, u količini do 150 g.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Opća javnost - suzbijanje štakora na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: Crni štakor Stadij razvoja: odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada Metoda: kutija za mamce

Načini primjene

Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu [u vrećicama za rasuti mamac] koji se postavlja u zaštitne kutije za mamce zaštićene od neovlaštenog otvaranja.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti 10 g do 200 g mamca po mjestu postavljanja.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal**1. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g):**

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira u količini do 150 g;
- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili vanjskoj vreći od natron papira ili kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

2. Mamac u vrećicama od PP/papira, PET/PE, PE/papir ili PE/aluminija (10 g - 150 g):

- pakirano u vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;
- pakirano u HDPE kutije, u količini do 150 g;
- pakirano u vreće od natron papira, u količini do 150 g;
- pakirano u omot, u količini do 150 g;
- pakirano u pleteni omot od PP ili višeslojni omot od papira, u količini do 150 g;
- pakirano u PP ili PE cijevi do 150 g;
- jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;
- pakirano u vrećice od PET/PE, PP/PE ili papir/PE, u količini do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150 g;
- pakirano u kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150 g;
- vrećice (od PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirane u vanjskom kartonskom omotu ili kartonskoj kutiji ili u vanjskoj vreći od natron papira ili (HDPE/PP) kante s poklopcem u količini do 150 g;

3. Ostalo pakiranje:

- rasuti mamac u prethodno napunjene ili punive zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili toplinom zapečaćenoj plastičnoj posudi ili toplinom zapečaćenoj foliji, u količini do 150 g;
- rasuti mamac na poslužavniku (od PVC ili polistirena ili polipropilena ili PET) sa toplinom zapečaćenom poklopcem (od PET/polipropilena ili polipropilena), koji se koristi za zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, u količini do 150 g.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Kada se mamci postavljaju na otvorenom kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti.

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjednom, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije uporabe rodenticida treba uzeti u obzir mogućnost suzbijanja glodavaca ne-kemijskim metodama (na primjer zamke).

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi).

Nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta primijećene aktivnosti glodavaca (na primjer: putovi kretanja, jazbine, mjesta hranjenja, rupe itd).

Godje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Ne otvarati vrećice koje sadrže mamce.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Kutije s mamcem ne smije se stavljati blizu sustava za odvod vode, jer mogu doći u dodir s vodom.

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Ne koristiti proizvod kao trajne mamce za sprečavanje infestacije glodavcima, praćenje aktivnosti glodavaca ili pulsni tretman.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja (pr. „koristiti samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja ”),

- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (pr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod”).

Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina (DDD).

Uginule glodavce treba potražiti i ukloniti barem onoliko često koliko se provjeravaju zaštitne kutije s mamcima.

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.

Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.

U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom.

U slučaju kontakta pripravka s očima treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.

U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.

Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinarskom kirurgu.

Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju tretmana treba odložiti zbrinuti neiskorištene mamce i ambalažu u skladu s lokalnim zahtjevima.
Ne dodirivati mrtve glodavce golim rukama, koristiti rukavice ili alate, kao što su kliješta.
Otrovane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.
Preporuča se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.
Čuvajte zaključano.
Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

Rok uporabe: 24 mjeseca.

6. Ostale informacije

- Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave vidljivih simptoma otrovanja.
- Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.
- Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.
- Najveća dopuštena količina za neprofesionalne korisnike u slučaju kombiniranih pakiranja za miševе i štakore je do 150 g mamaca po pakiranju za žitni mamac.