

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

RATIBROM-2 PARAFINA PRF

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-38/2016

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0013712-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	RATIBROM-2 PARAFINA PRF
-----------------------------------	-------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	IMPEX EUROPA, S.L.
	Endereço	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Vilagarcía de Arousa Espanha
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-38/2016	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0013712-0000	
Data da autorização	25/10/2013	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	IMPEX EUROPA, S.L.
Endereço do fabricante	Avda de Pontevedra, 39 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) Espanha
Localização das instalações de fabrico	Polígono Industrial de Trabanca Badiña, Parcelas 22-24 36600 Pontevedra Espanha

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Bromadiolona
Nome do fabricante	Laboratorios Agrochem S.L.
Endereço do fabricante	C/ Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Espanha
Localização das instalações de fabrico	C/ Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Espanha

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Bromadiolona	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substância ativa	28772-56-7	249-205-9	0,005
Benzoato de denatônio	N-Benzil-2-[(2,6-dimetilfenil) amino]-N,N-dietil-2-benzoato de oxoetanaminium	Substância não ativa	3734-33-6	223-095-2	0,002
Trietanolamina	2,2',2''-Nítrilotrietanol	Substância não ativa	102-71-6	203-049-8	0,05
Polietilenoglicol 200		Substância não ativa	25322-68-3	500-038-2	0,04
Propilenoglicol	Propano-1,2-diol	Substância não ativa	57-55-6	200-338-0	3,873
Butilhidroxitolueno	2,6-di-terc-Butil-4-metilfenol	Substância não ativa	128-37-0	204-881-4	0,073
Água		Substância não ativa	7732-18-5	231-791-2	0,005
Açúcar	Sacarose	Substância não ativa	57-50-1	200-334-9	8
Sal de sódio da sacarina	Sal de sódio do 2,3-di-hidro-3-oxobenzóisossulfonazolo.	Substância não ativa	82385-42-0	204-886-1	0,1
Cloreto de sódio		Substância não ativa	7647-14-5	231-598-3	0,5
Benzoato de sódio	Sal de sódio do ácido benzóico	Substância não ativa	532-32-1	208-534-8	0,5
312504 Eurocert Allura red		Substância não ativa	25956-17-6	247-368-0	0,024
Cera de parafina		Substância não ativa	64742-51-4	265-154-5	23,63

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções. P280: Usar luvas de proteção. P301 + P310: EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Rodenticida

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	O produto é um rodenticida anticoagulante/antagonista de vitamina K que pretende controlar <i>Mus musculus</i> e <i>Rattus Norvegicus</i> , por utilizadores profissionais em espaços abertos, lixeiras e esgotos.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: brown rat Estadio de desenvolvimento: outro: Adultos e Juvenis Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: house mouse Estadio de desenvolvimento: outro: Adultos e Juvenis
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior O produto será aplicado em áreas interiores, exteriores e em esgotos
Método(s) de aplicação	Método: Em estações de isco Descrição detalhada: O isco é colocado manualmente na área de infestação dos roedores. O isco tem de ser colocado em estações rateiras invioláveis, devidamente rotuladas. Para o controlo de ratazanas, cada ponto de isco contém normalmente até 200g de isco em blocos de 20,25,30 ou 50g. Ou até 100g de isco em blocos de 10, 15, 20, 25,30 e 50, devendo ser colocado a 5-10 metros de distância. Em esgotos, cada ponto de isco contém geralmente até 200g de isco em blocos de 100g. Para o controlo de ratos, cada ponto de isco contém normalmente até 50g de isco, devendo ser colocado a 5-10 metros de distância. Os roedores mortos são removidos para eliminação, a fim de se evitar que sejam ingeridos por animais não-alvo e pássaros. Quando o isco já não for ingerido e a sua função rodenticida parar, os restos dos iscos são removidos para eliminação. Os pontos de isco devem ser removidos, numa campanha normal, 6 semanas após a primeira colocação.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos: até 50 g de isco a 5-10 m de distância; Ratazanas: até 100g ou 200g de isco a 5-10 m de distância; Ratos (Esgotos): até 200g de isco por ponto de aplicação Diluição (%): 0 Número e calendário da aplicação: Verificar as estações a cada 3/4 dias (periodicidade recomendada) e os iscos consumidos deverão ser devidamente substituídos. Quando o isco já não foi ingerido e a sua função rodenticida parar, os restos dos iscos são removidos para eliminação.

	Os pontos de isco devem ser removidos, numa campanha normal, 6 semanas após a primeira colocação. Não usar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes. Alternar o uso de iscos de bromadiolona com iscos de outras substâncias activas, para evitar resistência.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Papel, cartão, Saco, 100-150-200-250-300-400-500g Papel, cartão, Saco, 1-2-3-5-10-15-20-25 kg Plástico: composto:, Saco, 100-150-200-250-300-400-500g Plástico: composto:, Saco, 1-2-3-5-10-15-20-25 kg O produto é colocado no mercado em blocos de cera de 10, 15, 20, 25, 30 e 100 g, colocados no interior de sacos de papel, plástico ou cartão de 100-150-200-250-300-400-500g e 1-2-3-5-10-15-20-25 Kg. Aplicação fechada inviolável e devidamente rotulada.

4.1.1. Instruções específicas de utilização

O uso de luvas de protecção é recomendado, durante o manuseamento do produto e dos roedores mortos, por razões de higiene.

Lavar as mãos e as zonas de pele expostas após utilização e antes das refeições

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Usar estações rateiras invioláveis, devidamente rotuladas e colocar em áreas inacessíveis para prevenir o acesso a espécies não-alvo, crianças e animais de estimação.

Os iscos não devem ser colocados onde os alimentos, rações ou água potável possam ser contaminados.

Procurar os roedores mortos e removê-los em intervalos frequentes durante o tratamento, em operações de controlo para minimizar o risco de consumo e envenenamento de crianças, animais domésticos e outros animais não-alvo.

Eliminar os roedores mortos de acordo com a regulamentação local vigente.

Remover todos os roedores mortos após o tratamento e eliminar de acordo com a regulamentação vigente via gestor de resíduos autorizado.

Não usar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes. Alternar o uso de iscos de bromadiolona com iscos de outras substâncias activas, para evitar resistência.

4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

O envenenamento pode provocar:

Diátese hemorrágica, devido ao efeito da antiprotrombina – tempo prolongado da protrombina – que pode manifestar-se num período mínimo de 24 horas e máximo de 72 horas (um tempo de protrombina normal aquando da admissão hospitalar não exclui o diagnóstico).

Primeiros Socorros:

- Retirar a vítima da zona contaminada.
- Retirar o vestuário contaminado ou manchado.
- Lavar os olhos abundantemente com água durante 15 minutos. Não esquecer de retirar as lentes de contacto.
- Lavar a pele com sabão e água abundante, sem esfregar.
- Em caso de ingestão, não provocar o vómito.
- Manter a vítima quente e em repouso.
- Verificar a respiração. Se necessário, aplicar respiração artificial.
- Se a vítima estiver inconsciente, colocá-la de lado, com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e com as pernas dobradas.
- Transportar a vítima para o hospital e mostrar, se possível, a embalagem ou o rótulo.

NUNCA DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

Aconselhamento médico para médicos e pessoal de saúde:

- Se tiverem passado menos de duas horas desde a ingestão, realizar esvaziamento gástrico, administrando uma dose de carvão activado (25 gramas).
- Antídoto: Vitamina K.
- Controlar o tempo de protrombina
- Tratar sintomaticamente

EM CASO DE ACIDENTE, CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não deitar o produto para o chão, para cursos de água, esgotos ou na canalização.

Remover todas as embalagens, iscos não consumidos e estações rateiras após tratamento e eliminar de acordo com a regulamentação vigente via gestor de resíduos autorizado.

4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar num recipiente de origem em local seco e bem ventilado.

Manter afastado da radiação solar e de outras fontes de calor. Proteger contra a geada.

O produto é estável por mais de 2 anos.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

O isco é colocado manualmente na área de infestação dos roedores.

O isco tem de ser colocado em estações rateiras invioláveis, devidamente rotuladas.

Para o controlo de ratazanas, cada ponto de isco contém normalmente até 200g de isco em blocos de 20,25,30 ou 50g. Ou até 100g de isco em blocos de 10, 15, 20, 25,30 e 50, devendo ser colocado a 5-10 metros de distância.

Em esgotos, cada ponto de isco contém geralmente até 200g de isco em blocos de 100g.

Para o controlo de ratos, cada ponto de isco contém normalmente até 50g de isco, devendo ser colocado a 5-10 metros de distância.

Os roedores mortos são removidos para eliminação, a fim de se evitar que sejam ingeridos por animais não-alvo e pássaros.

Quando o isco já não for ingerido e a sua função rodenticida parar, os restos dos iscos são removidos para eliminação. Os pontos de isco devem ser removidos, numa campanha normal, 6 semanas após a primeira colocação.

5.2. Medidas de redução do risco

Usar estações rateiras invioláveis, devidamente rotuladas e colocar em áreas inacessíveis para prevenir o acesso a espécies não-alvo, crianças e animais de estimação.

O uso de luvas de protecção é recomendado, durante o manuseamento do produto e dos roedores mortos, por razões de higiene.

Lavar as mãos e as zonas de pele expostas após utilização e antes das refeições

Os iscos não devem ser colocados onde os alimentos, rações ou água potável possam ser contaminados.

Procurar os roedores mortos e removê-los em intervalos frequentes durante o tratamento, em operações de controlo para minimizar o risco de consumo e envenenamento de crianças, animais domésticos e outros animais não-alvo.

Eliminar os roedores mortos de acordo com a regulamentação local vigente.

Remover todos os roedores mortos após o tratamento e eliminar de acordo com a regulamentação vigente via gestor de resíduos autorizado.

Não usar rodenticidas anticoagulantes como iscos permanentes. Alternar o uso de iscos de bromadiolona com iscos de outras substâncias activas, para evitar resistência.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

O envenenamento pode provocar:

Diátese hemorrágica, devido ao efeito da antiprotrombina – tempo prolongado da protrombina – que pode manifestar-se num período mínimo de 24 horas e máximo de 72 horas (um tempo de protrombina normal aquando da admissão hospitalar não exclui o diagnóstico).

Primeiros Socorros:

- Retirar a vítima da zona contaminada.
- Retirar o vestuário contaminado ou manchado.
- Lavar os olhos abundantemente com água durante 15 minutos. Não esquecer de retirar as lentes de contacto.
- Lavar a pele com sabão e água abundante, sem esfregar.
- Em caso de ingestão, não provocar o vômito.
- Manter a vítima quente e em repouso.

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

-
- Verificar a respiração. Se necessário, aplicar respiração artificial.
 - Se a vítima estiver inconsciente, colocá-la de lado, com a cabeça mais baixa que o resto do corpo e com as pernas dobradas.
 - Transportar a vítima para o hospital e mostrar, se possível, a embalagem ou o rótulo.

NUNCA DEIXAR O INTOXICADO SOZINHO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA.

Aconselhamento médico para médicos e pessoal de saúde:

- Se tiverem passado menos de duas horas desde a ingestão, realizar esvaziamento gástrico, administrando uma dose de carvão activado (25 gramas).
- Antídoto: Vitamina K.
- Controlar o tempo de protrombina
- Tratar sintomaticamente

EM CASO DE ACIDENTE, CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Não deitar o produto para o chão, para cursos de água, esgotos ou na canalização.

Remover todas as embalagens, iscos não consumidos e estações rateiras após tratamento e eliminar de acordo com a regulamentação vigente via gestor de resíduos autorizado.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazenar num recipiente de origem em local seco e bem ventilado.

Manter afastado da radiação solar e de outras fontes de calor. Proteger contra a geada.

O produto é estável por mais de 2 anos.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES