

A KEF-6046-8/2013 iktatószámú határozat 1. számú melléklete

Engedélyokirat

biocid termék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséhez

1. **A termék neve: Protect® rágcsálóirtó granulátum**

2. **Az engedély adatai:**

Engedély száma	HU-2013-PA-14-00036-0000
OTH iktatószám	KEF-6046/2013
Engedély lejáratának időpontja	2016. 06. 30.

3. **Az engedélytulajdonos adatai:**

Cégnév	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím	H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Telefon	+36-01-4320-400
Fax	+36-01-4320-401
E-mail	info@babolna-bio.com
Kapcsolattartó	Szilágyi János

4. **A gyártó adatai:**

Cégnév	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím	H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

5. **A forgalmazó adatai:**

Cégnév	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím	H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

6. **A termék általános jellemzői:**

Biocid terméktípus száma / megnevezése	14 / rágcsálóirtó szer
Felhasználási terület	házi egér (<i>Mus musculus</i>) és vándorpatkány (<i>Rattus norvegicus</i>) elpusztítására
Formuláció jellege	felhasználásra kész, granulált rágcsálóirtó csalétek
A rágcsálóirtó szer keserű anyagot (Bitrex, denatónium-benzoát) tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.	

7. **A termék összetétele:**

Hatóanyag	EK-szám	CAS-szám	m/m%	Gyártó
bromadiolon	249-205-9	28772-56-7	0,005	Dr Tezza S.r.l.
tisztasága	min. 98,0%			

A termék összetétele bizalmas adat. A teljes összetételt az engedély 2. és 4. számú melléklete tartalmazza.

8. **A termék osztályozása és címkézése az 1999/45/EK irányelv szerint:**

Osztályozás	Nem jelölésköteles, EK-veszélyjel nem szükséges.
Kockázati mondat(ok)	–
Biztonsági mondat(ok)	<p>S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.</p> <p>S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.</p> <p>S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.</p> <p>S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő.</p> <p>S35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.</p> <p>S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.</p> <p>S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.</p>

9. **A termék osztályozása és címkézése a CLP: 1272/2008/EK rendelet szerint*:**

Osztályozás	Nem jelölésköteles, veszélyt jelző piktogram nem szükséges.
Figyelmeztetés(ek)	–
Figyelmeztető mondat(ok)	–
Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)	<p>P102 Gyermekektől elzárva tartandó.</p> <p>P220 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.</p> <p>P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.</p> <p>P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.</p> <p>P280 Védőkesztyű használata kötelező.</p> <p>P301 + 310 Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.</p> <p>P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.</p>

* 2015.06.01-től alkalmazandó

10. **Forgalmazási kategória:** III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

11. **Egyéb felhasználási előírások:**

Felhasználói kör	lakossági és foglalkozásszerű felhasználók
Felhasználás helye	zárt térben és épületek környékén

12. Csomagolás:

Felhasználói kör	Kiszereles egysége	Csomagolás anyaga	Forgalomba kerülő kiszereles tömege	
Lakossági	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban, egyszer használatos, műanyag egérintő dobozba helyezve	papírdobozban	0,04 kg (2x20 gramm csalétek, 2 db egérintő dobozban)	
	–	műanyag zacskóban	0,1 és 0,2 kg	
	100 gramm csalétek, műanyag zacskóba töltve	papírdobozban	0,2 kg (2 db zacskó) 0,4 kg (4 db zacskó)	
	200 gramm csalétek, műanyag zacskóba töltve	papírdobozban	0,4 kg (2 db zacskó)	
	90 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán	papírdobozban	0,18 kg (2 db tálca)	
	175 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán	papírdobozban	0,35 kg (2 db tálca)	
	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban	papírdobozban	0,1 kg (5 db tasak)	
Foglalkozásszerű	90 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán	papírdobozban	4,32 kg (48 db tálca),	
	175 gramm csalétek, filterpapírral fedett műanyag tálcán	papírdobozban	2,1 kg (12 db tálca), 4,2 kg (24 db tálca), 8,4 kg (48 db tálca), 12,6 kg (72 db tálca) és 16,8 kg (96 db tálca)	
	20 gramm csalétek, filterpapír tasakban	kartondobozban	8 kg (400 db tasak)	
	50 gramm csalétek, filterpapír tasakban	kartondobozban	5 kg (100 db tasak)	
	– (ömlesztett)	műanyag zsákban		0,1, 0,2, 0,4 és 0,5 kg
		műanyag vödörben		1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 és 25 kg
		papírhordóban		30 kg
papírzsákban			5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 és 60 kg	

13. Használati utasítás:

13.1. Lakossági felhasználóknak szánt kiserelések:

13.1.1. A 2 db egyszer használatos egérirtó dobozt tartalmazó kiserelés külső csomagolásán

A tasakolt rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó, egyszer használatos egérirtó dobozt – a filterpapír felbontása nélkül – helyezzük az egerek által látogatott helyekre, feltételezett búvóhelyeik közelébe. Ügyeljünk arra, hogy a csalétket gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető, esőtől védett helyre tegyük. A kihelyezés előtt távolítsuk el a védőfóliát a doboz alján lévő öntapadó felületről, majd ennek segítségével rögzítsük a dobozt a kívánt helyen, úgy, hogy nyílásai a padló-fal szeglethez essenek. Ne ragasszuk a dobozt nedves, poros vagy málló felületre.

5 m²-enként 1 dobozt helyezzünk ki, erősebb egérártalom esetén ezt növeljük 2 dobozra.

13.1.2. A 2 db műanyag tálcát tartalmazó kiserelés külső csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tálcákat – a filterpapír felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

A 90 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból:

- egérirtáskor* 5 m²-enként 1 db-ot,
 - patkányirtáskor* 7-10 méterenként 2 db-ot
- helyezzünk ki.

Erősebb egérártalom esetén a tálcák számát növeljük 2 db-ra, 5 m²-enként.

A 175 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból:

- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 1 db-ot
- helyezzünk ki.

13.1.3. A 100g granulátumot tartalmazó műanyag zacskós kiserelés csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó műanyag zacskót – annak felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

Alkalmazási mennyiség:

- egérirtáskor* 5 m²-enként 100 gramm,
- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 200 gramm.

A műanyag zacskót papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rá egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A zacskót lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azt a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

13.1.4. A 200g granulátumot tartalmazó műanyag zacskós kiserelés csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó műanyag zacskót – annak felnyitása nélkül – helyezzük a patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

Alkalmazási mennyiség:

- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 200 gramm.

A műanyag zacskót papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rá egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne

férhessenek hozzá. A zacskót lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azt a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

13.1.5. Az 5 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszerelés külső csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tasakokat – a filterpapír felnyitása nélkül – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe úgy, hogy gyermekek és háziállatok ne férhessenek hozzá. Az épületek környékén esőtől védett helyre tegyük ki a rágcsálóirtó szert.

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tasakokból

- egérirtáskor* 5 m²-enként 2-4 db-ot,
- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 4-5 db-ot

helyezzünk ki.

Erősebb egérártalom esetén az 5 m²-re eső csalétek mennyiségét növeljük 5 db tasakra, 2-3 etetőhelyet kialakítva.

A tasakokat papír vagy műanyag tálcákra helyezzük ki, majd borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy a rágcsálók a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, háziállatok, nem célszervezet állatok és madarak ne férhessenek hozzá. A tasakokat lehetőség szerint rögzítsük is (pl. drót segítségével), hogy azokat a rágcsálók ne hurcolják el. A csalétket műanyag egéretető dobozban vagy patkányetető ládában is kihelyezhetjük.

13.1.1. – 13.1.5. Az összes lakossági kiszerelési formára vonatkozó, közös szövegrész

A rágcsálók elhullása a fogyasztás után 4-5 nappal kezdődik. A kihelyezett csalétket 4-7 naponként ellenőrizzük, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket pótoljuk. A beszennyezett, megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell pótolni. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók teljesen el nem tűnnek. Amennyiben a csalétek érintetlenül marad, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova. Az összes rágcsáló kiirtása, elszaporodásuk mértékétől és a terület nagyságától függően, 2-3 hét múlva várható.

A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

13.2. Foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelések:

13.2.1. A műanyag tálcákat tartalmazó kiszerelések külső csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tálcákat az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően:

A 90 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból:

- egérirtáskor* 5 m²-enként 1 db-ot,
- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 2 db-ot

helyezzünk ki.

Erősebb egérártalom esetén a tálcák számát növeljük 2 db-ra, 5 m²-enként.

A 175 g rágcsálóirtó csalétket tartalmazó tálcákból:

- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 1 db-ot

helyezzünk ki.

13.2.2. A filterpapír tasakokat tartalmazó kiszerelés külső csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot tartalmazó tasakokat az erre a célra szolgáló szerelvényben – a beépített rögzítő rúdra, tüskére felszúrva – helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően

- egérirtáskor* 5 m²-enként 40-100 gramm,
- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 150-200 gramm.

13.2.3. Az ömlesztett kiszerelések csomagolásán

A rágcsálóirtó granulátumot az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek és patkányok által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe.

Az ömlesztett (nem tasakolt) kiszerelések esetében a termék átöntésekor használjunk megfelelő (egyszer használatos, min. MSZ EN149 FFP2, vagy ezzel egyenértékű) légzésvédőt.

Alkalmazási mennyiség, az ártalomtól függően:

- egérirtáskor* 5 m²-enként 50-100 gramm,
- patkányirtáskor* 7-10 méterenként 200-250 gramm.

13.2.1. – 13.2.3. Mindhárom foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerelési formára vonatkozó, közös szövegrész

A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

A rágcsálók elhullása a fogyasztás után 4-5 nappal kezdődik. A kihelyezett csalétket 4-7 naponként ellenőrizzük, az elfogyasztott és/vagy elhurcolt csalétket pótoljuk. A beszenyezett, megromlott csalétket el kell távolítani és friss termékkel kell pótolni. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók teljesen el nem tűnnek. Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de a rágcsálók továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova. Az összes rágcsáló kiirtása elszaporodásuk mértékétől és a terület nagyságától függően 2-3 hét múlva várható.

A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

14. Figyelmeztetés:

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást!

Kizárólag rágcsálóirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A kihelyezett csalétket minden esetben figyelmeztető jelzéssel kell ellátni. Az irtószert kihelyezésekor használjon védőkesztyűt. Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.

A csalétket olyan helyekre rakja ki, ahol gyermekek, házi- és haszonállatok, valamint madarak nem férhetnek hozzá. A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. A kutya, macska, sertés és minden egyéb ragadozó és/vagy dögező állat mérgeződéskor, ha a rágcsálóirtó szertől elpusztult vagy megbetegedett patkányt, egeret elfogyasztja. Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni. Ne juttassa a készítményt élővízbe.

A beszenyezett, romlott csalétket felhasználni tilos.

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és haszonállat által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen tárolandó.

Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

15. Elsősegélynyújtás:

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.

- A szájüreget öblítse ki vízzel. Ne étkezzon és ne igyon, meleg helyen pihenjen és értesítse az orvost.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

Bőrre jutáskor:

- Vegye le a szennyezett ruhát és a további használat előtt mossa ki.
- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény véralvadásgátló hatóanyagot, bromadiolont tartalmaz. A rágszálóirtó szer lenyelését követően csökkenhet a véralvadási képesség és belső vérzés jelentkezhet. A mérgezés/expozíció és a tünetek jelentkezése között akár több nap is eltelhet.

A készítményt lenyelő mérgezett ellátásakor, amennyiben a jellemző tüneteket (pl. orrvérzés, ínyvérzés, vérköpés, véres vizelet, hosszabb véralvadási idő, nagy kiterjedésű vagy több haematoma, hirtelen fellépő, szokatlan viscerális fájdalom) észleli, adjon K₁-vitamint. Ha nem észlelhető vérzés, akkor a mérgezett ellátásakor és az expozíciót követő 48-72 óra elteltével a protrombin időt (INR) meg kell mérni. Ha a protrombin idő értéke >4, a mérgezettnek intravénásan K₁-vitamint kell adni. A kezelés többszöri megismétlésére is szükség lehet.

Ellenszere: K₁-vitamin (A kezelés hatásosságát laboratóriumi módszerrel ellenőrizni szükséges.)

16. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző, zárt helyen tárolandó. Gyújtóforrástól és oxidáló anyagoktól távol tartandó. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

A gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

17. Hulladékkezelés:

17.1. A lakossági felhasználóknak szánt kiszerezések csomagolásán feltüntetendő:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan el kell távolítani a kezelés során elpusztult rágszálókat. Az elhullott rágszáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

17.2. A foglalkozásszerű felhasználóknak szánt kiszerezések csomagolásán feltüntetendő:

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágszálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágszálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

17.1./17.2. Minden forgalomba kerülő kiszerezésen feltüntetendő:

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágszálóirtó szerelvényeket és csalétekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószert feltakarításáról.

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

18. Címkefelirat:

Protect® rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon

Gyártja: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Forgalmazza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

OTH engedélyszám: HU-2013-PA-14-00036-0000

valamint, az Engedélyezési lap alábbi pontjai, a felhasználói kör és a csomagolás jellege függvényében:

Felhasználói kör	Csomagolás jellege	Címkén feltüntetendő pontok
Lakossági	2 db egyszer használatos egéirtő dobozt tartalmazó kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.1., 14., 15., 16., 17.1.
	2 db műanyag tálcát tartalmazó kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.2., 14., 15., 16., 17.1.
	100 gramm csalétket tartalmazó műanyag zacskós kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.3., 14., 15., 16., 17.1.
	200 gramm csalétket tartalmazó műanyag zacskós kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.4., 14., 15., 16., 17.1.
	5 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.1.5., 14., 15., 16., 17.1.
Foglalkozásszerű	műanyag tálcákat tartalmazó kiszerelések	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.2.1., 14., 15., 16., 17.2.
	100 illetve 400 db filterpapír tasakot tartalmazó kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.2.2., 14., 15., 16., 17.2.
	ömlesztett csalétket tartalmazó kiszerelés	6., 8. vagy 9., 10., 11., 13.2.3., 14., 15., 16., 17.2.

Továbbá az egyszer használatos egéirtő dobozokon, a 20, illetve 50 grammos filterpapír tasakokon és a 90 és 175 grammos, filterpapírral fedett műanyag tálcákon egyedileg feltüntetendő az alábbi szöveg:

Protect® rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon


Ellenszere: K₁-vitamin

Gyártja és forgalmazza: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6.

Budapest, 2013. június „M..”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
nevében kiadmányozza




Dr. Kovács Márta
főosztályvezető