

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Mida San 311 KZ

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

**Číslo povolení:** CZ-0027651-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0027651-0003

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	3
2. Složení přípravku a jeho typ složení	4
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	4
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	5
5. Obecná pravidla pro používání	16
5.1. Pokyny pro používání	17
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	17
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	17
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	17
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	18
6. Další informace	18

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

Mida San 311 KZ  
DYBACOL LQ

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	Christeyns NV
	Adresa	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie
<b>Číslo povolení</b>	CZ-0027651-0000 1-3	

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3**

CZ-0027651-0003

**Datum udělení povolení**

15/07/2022

**Datum skončení platnosti povolení**

25/12/2031

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

<b>Název výrobce</b>	Christeyns N.V.
<b>Adresa výrobce</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie

**Název výrobce**

Christeyns s.r.o.

**Adresa výrobce**

Vitovska 453/7 742 35 Odry Česká republika

**Umístění výrobních závodů**

Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Česká republika

**Název výrobce**

Christeyns Food Hygiene sas

**Adresa výrobce**

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

**Umístění výrobních závodů**

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

**Název výrobce**

Betelgeux sl

**Adresa výrobce**

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

**Umístění výrobních závodů**

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

**Název výrobce**

Christeyns France sa

**Adresa výrobce**

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Francie

**Umístění výrobních závodů**

Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Francie

**Název výrobce**

Christeyns Professional Hygiene srl.

**Adresa výrobce**

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

**Umístění výrobních závodů**

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

**Název výrobce**

Christeyns UK Ltd.

**Adresa výrobce**

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

**Umístění výrobních závodů**

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

<b>Název výrobce</b>	Christeyns Food Hygiene Ltd.
<b>Adresa výrobce</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království
<b>Umístění výrobních závodů</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království

#### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	1354 - propan-1-ol
<b>Název výrobce</b>	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
<b>Adresa výrobce</b>	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Spojené státy

<b>Účinná látka</b>	1355 - propan-2-ol
<b>Název výrobce</b>	Brenntag GmbH
<b>Adresa výrobce</b>	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Nizozemsko
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Spojené státy

<b>Účinná látka</b>	1354 - propan-1-ol
<b>Název výrobce</b>	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
<b>Adresa výrobce</b>	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Německo
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Jižní Afrika

<b>Účinná látka</b>	1355 - propan-2-ol
<b>Název výrobce</b>	Alcoholes Montplet S.A.
<b>Adresa výrobce</b>	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 Francie
<b>Umístění výrobních závodů</b>	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Francie

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
propan-1-ol		účinná látka	71-23-8	200-746-9	49,07
propan-2-ol		účinná látka	67-63-0	200-661-7	19,54

### 2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina
------------------------------

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.  
 Způsobuje vážné poškození očí.  
 Může způsobit ospalost nebo závratě.  
 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.  
 Zamezte vdechování aerosolů.  
 Zamezte vdechování par.

Používejte ochranné brýle.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě..

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě..

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Použití 3.1 – Typ přípravku 02 Dezinfekce povrchu, postřik rozprašovačem

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	<p>Latinský název: --  Obecný název: Bakterie  Vývojové stadium: Žádné informace</p> <p>Latinský název: --  Obecný název: Kvasinky  Vývojové stadium: Žádné informace</p> <p>Latinský název: --  Obecný název: Plísňe  Vývojové stadium: Žádné informace</p> <p>Latinský název: Mycobacteriaceae  Obecný název: Mykobaterie  Vývojové stadium: Žádné informace</p> <p>Latinský název: Viry  Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus  Vývojové stadium: Žádné informace</p>
<b>Oblast použití</b>	<p>Vnitřní</p> <p>Vnitřní – V nepotravinářském průmyslu, institucích a na pracovištích: Dezinfekce malých tvrdých/neporézních povrchů postřikem rozprašovačem, s předchozím čištěním</p> <p>Metoda: Postřik rozprašovačem</p>

<b>Metoda(y) aplikace</b>	Podrobný popis: Postřikem rozprašovačem: po postřiku rozprašovačem a požadované době kontaktu lze přípravek otřít papírovým kapesníkem nebo hadříkem.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: 30 ml/m <sup>2</sup> Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: K okamžitému použití Při pokojové teplotě Aplikační množství: 30 ml/m <sup>2</sup> Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový  profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	750 ml lahve se samostatným zařízením k postřiku rozprašovačem (HDPE) 1 l lahve se samostatným zařízením k postřiku rozprašovačem (HDPE) 5, 10, 22, 25 l doplňovací kanystry (HDPE)

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

**Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemohou nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).**

**Nespecifikované místnosti:**

maximálně 1 aplikace denně

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

**Zařízení na výrobu léčiv a kosmetiky:**

Při míchání a plnění se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.



#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.2 Popis použití

##### Použití 2 - Použití 3.2 – Typ přípravku 02 Dezinfekce povrchu, nízkotlaký postřik

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Mycobacteriaceae Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Viry Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Plísňe Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Vnitřní – V potravinářském průmyslu (např. farmaceutickém): Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů nízkotlakým postřikem, s předchozím čištěním.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Nízkotlaký postřik Podrobný popis: Nízkotlakým postřikem: po nízkotlakém postřiku je přípravek ponechán, aby oschnul, ale není otřen.

## Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: 200 ml/m<sup>2</sup>  
Ředění (%): -  
Počet a načasování aplikace:  
K okamžitému použití  
Při pokojové teplotě  
Aplikační množství: 200 ml/m<sup>2</sup>  
Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu  
Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu

## Kategorie uživatelů

průmyslový

## Velikost balení a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanistry (HDPE), 220 l nádoby (HDPE)  
1000 l IBC kontejner (HDPE)

### 4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

### 4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

**Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemožno nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).**

#### Nespecifikované místnosti:

1 aplikace za den maximálně na 8 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 3.

Nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

#### Čisté místnosti:

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1 a intenzita ventilace 20/h

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

#### Laboratoře a biotechnologie:

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 2.

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

#### Zařízení na výrobu léčiv a kosmetiky:

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1.

nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

### 4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

### 4.3 Popis použití

#### Použití 3 - Použití 3.3 – Typ přípravku 04 Dezinfekce povrchu, postřík rozprašovačem

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Plisně Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Mycobacteriaceae Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Viry Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Vnitřní – Ve velkých kuchyních, restauracích, potravinářském průmyslu: Dezinfekce malých tvrdých/neporézních povrchů postříkem rozprašovačem, s předchozím čištěním
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Postřík rozprašovačem Podrobný popis: Postříkem rozprašovačem: po postříku rozprašovačem a požadované době kontaktu lze přípravek otírat papírovým kapesníkem nebo hadříkem.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: 30 ml/m <sup>2</sup> Ředění (%): -

	<p>Počet a načasování aplikace:  Přípravek je připraven k použití.  Při pokojové teplotě  Aplikační množství: 30 ml/m<sup>2</sup>  Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu  Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu</p>
<b>Kategorie uživatelů</b>	<p>průmyslový</p> <p>profesionál</p>
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	<p>750 ml lahve se samostatným zařízením k postřiku rozprašovačem (HDPE)  1 l lahve se samostatným zařízením k postřiku rozprašovačem (HDPE)  5, 10, 22, 25 l doplňovací kanystry (HDPE)</p>

#### 4.3.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

#### 4.3.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemohou nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).

**Nespecifikované místnosti:**

maximálně 1 aplikace denně

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1  
nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

**Kuchyně a jídelny:**

Při míchání a plnění se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1 a rukavice (APF 10).

#### 4.3.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.3.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.3.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

#### 4.4 Popis použití

##### Použití 4 - Použití 3.4 – Typ přípravku 04 Dezinfekce povrchu, nízkotlaký postřik

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Mycobacteriaceae Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Viry Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Plísňe Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Vnitřní – Ve velkých kuchyních, restauracích, potravinářském průmyslu: Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů nízkotlakým postřikem, s předchozím čištěním
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Nízkotlaký postřik Podrobný popis: Nízkotlakým postřikem: po nízkotlakém postřiku je přípravek ponechán, aby oschnul, ale není otřen.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: 200 ml/m <sup>2</sup> Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: K okamžitému použití Při pokojové teplotě Aplikační množství: 200 ml/m <sup>2</sup> Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový

## Velikost balení a obalový materiál

5, 10, 22, 25 l kanystry (HDPE), 220l nádoby (HDPE)  
1000 l IBC kontejner (HDPE)

### 4.4.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití.

### 4.4.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

**Následující opatření ke zmírnění rizik se použijí, pokud je nemohou nahradit technická nebo organizační opatření: Technická a organizační ochranná opatření je nutno zvážit přednostně (osobní ochranná opatření nesmí být trvalými opatřeními).**

**Nespecifikované místnosti:**

1 aplikace za den maximálně na 8 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 3  
nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

**Institucionální kuchyně a jídelny:**

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

Během aplikace se vyžaduje ochrana dýchacích cest FFP 1  
nechráněné nezúčastněné osoby nesmí být během aplikace přítomny

**Průmyslové kuchyně:**

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

**Průmyslové výrobní prostory:**

1 aplikace za den maximálně na 10 m<sup>2</sup>

### 4.4.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

### 4.4.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

### 4.4.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

## 4.5 Popis použití

### Použití 5 - Použití 3.5 – Typ přípravku 02 Dezinfekce předmětů namáčením

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Mycobacteriaceae Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: viry Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Vnitřní – V nepotravinářském průmyslu: Dezinfekce tvrdých/neporézních povrchů (předmětů) namáčením, s předchozím čištěním
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Namáčení Podrobný popis:  Dezinfekce nástrojů nebo zařízení pomocí namáčení (vkládání předmětů do předem naplněné lázně) nebo plněním (plnění prázdné lázně, která již obsahuje předměty). V obou případech jsou předměty zcela ponořeny.
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: 25 litrů Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: K okamžitému použití Při pokojové teplotě Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový  profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	5, 10, 2 2, 25 l kanystry (HDPE)

#### **4.5.1 Návod k danému způsobu použití**

Viz obecné pokyny k použití.

#### **4.5.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.5.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.5.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.5.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.



#### 4.6 Popis použití

##### Použití 6 - Použití 3.6 – Typ přípravku 04 Dezinfekce předmětů namáčením

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	není relevantní
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: -- Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Mycobacteriaceae Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Víry Obecný název: Adenovirus typu 5, myší norovirus Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: -- Obecný název: Plísně Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Dezinfekce nástrojů nebo zařízení pomocí namáčení (vkládání předmětů do předem naplněné lázně) nebo plněním (plnění prázdné lázně, která již obsahuje předměty). V obou případech jsou předměty zcela ponořeny.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Namáčení Podrobný popis: Namáčení
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	Míra aplikace: 25 litrů Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: K okamžitému použití Při pokojové teplotě Účinný proti bakteriím, mykobakteriím a kvasinkám: 5minutová doba kontaktu Účinný proti bakteriím, plísním/kvasinkám, mykobakteriím a virům: 20minutová doba kontaktu
<b>Kategorie uživatelů</b>	průmyslový  profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	5, 10, 22, 25 l kanystry (HDPE)



#### **4.6.1 Návod k danému způsobu použití**

Viz obecné pokyny k použití.

#### **4.6.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.6.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.6.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.

#### **4.6.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

Viz obecný návod k použití.

### **5. Obecná pravidla pro používání**

## 5.1. Pokyny pro používání

### - Dezinfekční postupy postřikem, stíráním nebo namáčením:

Všechny povrchy, které mají být dezinfikovány, musí být před dezinfekcí vyčištěny, opláchnuty/vysušeny: uživatel musí důkladně vyčistit, opláchnout a vypustit čisticí kapaliny z povrchů, které mají být dezinfikovány.

### - Dezinfekční cyklus:

Všechny přípravky musí být používány NEZŘEDĚNÉ.

Podívejte se, prosím, na popis způsobu aplikace, který se vztahuje k jednotlivým použití, abyste řádně znali požadovanou DOBU KONTAKTU a zda je nutné po dezinfekci provést KONEČNÉ OPLÁCHNUTÍ (pitnou vodou).

- Pro dezinfekční postupy postřikem rozprašovačem: Ujistěte se, že jste povrchy zcela namočili, nechte působit po specifikovanou dobu kontaktu.

- Dezinfekční postupy namáčením: Lázeň není určena k opakovanému použití. Použijte lázeň pouze jedenkrát denně po práci a denně ji vyměňte za čerstvý roztok.

## 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Používejte v dobře větraných prostorách.

Před vstupem do ošetřovaných místností zajistěte dostatečné větrání.

Není určeno k použití v prostorách přístupných široké veřejnosti.

### Dezinfekce postřikem rozprašovačem:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (ochranné brýle) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Během manipulace s přípravkem noste obličejový štít.

### Dezinfekce nízkotlakým postřikem:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (celoobličejové masky) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Musí být používána ochranná kombinéza, nepropustná pro biocidní přípravek.

### Dezinfekce namáčením:

Ve fázi manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím.

Používání ochrany očí (ochranné brýle) při manipulaci s přípravkem je povinné.

Během manipulace s přípravkem noste obličejový štít.

## 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Obecná opatření první pomoci: Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (ukážete štítek, pokud je to možné).

**PŘI NADÝCHÁNÍ:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud potíže s dýcháním přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

**PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

**PŘI POŽITÍ:** Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Příznaky/zdravotní újmy: Podráždění dýchacích cest a dalších sliznic. Riziko vážného poškození očí. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Pohotová akce je rozhodující.

Zabraňte úniku do životního prostředí. Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vodovodních systémů. Pokud se přípravek dostane do kanalizace nebo do veřejných vod, oznamte to úřadům.

## 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zabraňte úniku do životního prostředí. Bezpečně zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

## 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

### Technická opatření:

Je třeba dodržovat správné postupy uzemnění, aby nedošlo ke vzniku statické elektřiny.

### Podmínky skladování:

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Vyhnete se vysokým teplotám.

Chraňte před přímým slunečním světlem.

Chraňte před mrazem.

Nekompatibilní přípravky: Silné kyseliny. Silné zásady.

Skladovatelnost: 2 roky

## 6. Další informace

Přípravek obsahuje propan-2-ol, pro který byla dohodnuta AEC inhalace pro profesionálního uživatele a ta byla použita pro posouzení rizik přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402