

# Charakterystyka produktu biobójczego

**Nazwa produktu:** ClearKlens product based on IPA

**Grupa produktowa:** Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

**Numer pozwolenia:** EU-0022128-0000

**Numer referencyjny w R4BP 3:** EU-0022128-0000

## Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	3
2. Skład i postać użytkowa produktu	4
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	4
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	4
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	4
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	4
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	11
5.1. Instrukcje stosowania	12
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	12
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	12
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	12
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	13
6. Inne informacje	13

## Informacje administracyjne

### 1.1. Nazwa handlowa produktu

ClearKlens IPA
ClearKlens IPA 70%
ClearKlens IPA 70% v/v
ClearKlens IPA VH1
ClearKlens IPA Airless
ClearKlens IPA Pouch
ClearKlens IPA Non Sterile
ClearKlens IPA Non Sterile VH1
ClearKlens IPA SS
ClearKlens IPA SS VH1
ClearKlens IPA RTU
ClearKlens IPA RTU VH1
Texwipe® Sterile 70% Isopropanol
VH01 ClearKlens IPA

### 1.2. Posiadacz pozwolenia

<b>Nazwa i adres posiadacza pozwolenia</b>	Nazwa	Diversey Europe Operations B.V.
	Adres	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Holandia
<b>Numer pozwolenia</b>	EU-0022128-0000	
<b>Numer referencyjny w R4BP 3</b>	EU-0022128-0000	
<b>Data udzielenia pozwolenia</b>	24/08/2020	
<b>Data ważności pozwolenia</b>	31/07/2030	

### 1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Diversey Europe Operations B.V.

**Adres producenta substancji czynnej**

Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Holandia

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Hiszpania

Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Włochy

Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Zjednoczone Królestwo

Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Holandia

Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Niemcy

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Multifill BV

**Adres producenta substancji czynnej**

Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Holandia

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Holandia

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Flexible Medical Packaging Ltd

**Adres producenta substancji czynnej**

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Zjednoczone Królestwo

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Zjednoczone Królestwo

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Ardepharm

**Adres producenta substancji czynnej**

Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francja

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Francja

**Nazwa producenta substancji czynnej**

Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S

**Adres producenta substancji czynnej**

395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francja

**Lokalizacja zakładów produkcyjnych**

395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Francja

#### 1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

<b>Substancja czynna</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	INEOS Solvents GmbH
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Niemcy
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Niemcy
	Römerstrasse 733 D-47443 Moers Niemcy
<b>Substancja czynna</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Shell Chemicals Europe B.V.
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Holandia
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Holandia
<b>Substancja czynna</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Nazwa producenta substancji czynnej</b>	Exxon Mobil Chemicals
<b>Adres producenta substancji czynnej</b>	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgia
<b>Lokalizacja zakładów produkcyjnych</b>	4045 Scenic Highway LA 70805 Baton Rouge Stany Zjednoczone
	Southampton SO45 1TX Hampshire Zjednoczone Królestwo

## 2. Skład i postać użytkowa produktu

### 2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Propan-2-ol		Substancja czynna	67-63-0	200-661-7	63,1

### 2.2. Rodzaj postaci użytkowej

AL - Ciecz

## 3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

### Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
Działa drażniąco na oczy.  
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.  
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

### Zwroty wskazujące środki ostrożności

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. – Nie palić.  
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.  
Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.  
Usuwać zawartość do zgodnie z krajowymi przepisami..  
Usuwać pojemnik do zgodnie z krajowymi przepisami..  
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.  
W przypadku pożaru: Użyć pianki odporna na alkohol do gaszenia.

## 4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

## 4.1 Opis użycia

### Zastosowanie 1 - PT02: Środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni – profesjonalności – przecieranie mopem

<b>Grupa produktowa</b>	Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
<b>W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem</b>	Nie dotyczy
<b>Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)</b>	Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych  Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
<b>Obszar zastosowania</b>	Wewnątrz  Gotowy do użycia środek dezynfekujący do czystych, nieporowatych, twardych powierzchni w zakładach produkcyjnych farmaceutycznych i kosmetycznych z częstotliwością wymiany powietrza 60 razy na godzinę lub częściej, oraz pomieszczeniach czystych z częstotliwością wymiany powietrza 150 razy na godzinę lub częściej.
<b>Sposób (-oby) nanoszenia</b>	Dezynfekcja przy użyciu mopa - -
<b>Dawka (-i) i częstość nanoszenia</b>	Użyć 18.4 ml produktu na m2 powierzchni. - 0 - -
<b>Kategoria (-e) użytkowników</b>	Profesjonalny
<b>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</b>	Pojemniki (polietylen wysokiej gęstości) HDPE, (Polipropylen)PP, (polietylen)PE): 1 – 20 l

#### 4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni.  
Umyć i osuszyć powierzchnię przed dezynfekcją. Zamoczyć mopa w środku dezynfekującym i przetrzeć powierzchnię mopem. Całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać na działanie co najmniej 30 sekund. Użyte mopy muszą być przechowywane w zamkniętych pojemnikach.

#### 4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Stosować produkt w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wymagana minimalna częstotliwość wymiany powietrza to:  
- 60 razy na godzinę w farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych;  
- 150 razy na godzinę w pomieszczeniach czystych.

Nie używać więcej niż 18.4 ml produktu na m<sup>2</sup>.

#### 4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

### 4.2 Opis użycia

#### Zastosowanie 2 - PT02: Środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni – profesjonalści – szmatka

##### Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

##### W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy

##### Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa:  
Nazwa zwyczajowa: Bakterie  
Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa:  
Nazwa zwyczajowa: Drożdże  
Etap rozwoju: Brak danych

##### Obszar zastosowania

Wewnątrz

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do czystych, nieporowatych, twardych powierzchni w laboratoriach z częstotliwością wymiany powietrza 8 razy na godzinę lub częściej, farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych z częstotliwością wymiany powietrza 60 razy na godzinę lub częściej, oraz pomieszczeniach czystych z częstotliwością wymiany powietrza 150 razy na godzinę lub częściej.

##### Sposób (-oby) nanoszenia

Dezynfekcja przy użyciu szmatki -  
-



<b>Dawka (-i) i częstość nanoszenia</b>	Użyć 18.4 ml produktu na m2 powierzchni. - 0 - -
<b>Kategoria (-e) użytkowników</b>	Profesjonalny
<b>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</b>	-Pojemniki (Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), Polipropylen (PP, PE (Polietylen))): 1 – 20 l - Pojemniki (HDPE, PP, PE) z pompką: 200 l (wyłącznie do pomieszczeń czystych) - DPPL(duży pojemnik do przewozu luzem) z pompką (HDPE, PP, PE): 950 l i 1000 l (wyłącznie do pomieszczeń czystych)

#### 4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni.

Umyć i osuszyć powierzchnię przed dezynfekcją. Zamoczyć szmatkę w środku dezynfekującym i przetrzeć powierzchnię. Całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać na działanie co najmniej 30 sekund. W pomieszczeniach czystych dokładna wymagana ilość produktu może być również dozowana za pomocą lancy o niskim natężeniu przepływu lub do wiadra poprzez system rur. Użyte szmatki muszą być wyrzucane w zamkniętych pojemnikach.

#### 4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Stosować produkt w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wymagana minimalna częstotliwość wymiany powietrza to:

- 8 razy na godzinę w laboratoriach;
- 60 razy na godzinę w farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych;
- 150 razy na godzinę w pomieszczeniach czystych.

Nie używać więcej niż 18.4 ml produktu na m2.

W przypadku dezynfekcji przez przecieranie można rozważyć zastosować następujący osobisty środek ograniczający ryzyko, chyba że można go zastąpić środkami technicznymi i/lub organizacyjnymi: Podczas posługiwania się produktem stosować ochronę oczu.

#### 4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

### 4.3 Opis użycia

#### Zastosowanie 3 - PT02: Środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni – profesjonalności – rozpylanie

##### Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

##### W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Nie dotyczy

##### Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa:  
Nazwa zwyczajowa: Bakterie  
Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa:  
Nazwa zwyczajowa: Drożdże  
Etap rozwoju: Brak danych

##### Obszar zastosowania

Wewnątrz

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do czystych, nieporowatych, twardych powierzchni w laboratoriach z częstotliwością wymiany powietrza 8 razy na godzinę lub częściej, farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych z częstotliwością wymiany powietrza 60 razy na godzinę lub częściej, oraz pomieszczeniach czystych z częstotliwością wymiany powietrza 150 razy na godzinę lub częściej.

##### Sposób (-oby) nanoszenia

Dezynfekcja przy użyciu rozpylacza -  
Opcjonalnie możliwe jest przecieranie w celu rozprowadzenia produktu.

##### Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Użyć 18.4 ml produktu na m2 powierzchni. - 0 -

##### Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

##### Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- Worek z rozpylaczem (PE): 0.9 – 20 l  
- Worek w butelce (wielowarstwowy koekstrudowany, pięciowarstwowy worek poli(etylen-co-octan winylu)) (EVA)/EVA(chlorek poliwinylidenu )/(PVDC)/EVA/EVA w butelce z HDPE, PP lub PE): 0.9 – 2 l  
- Butelka z rozpylaczem (HDPE, PP, PE): 0.5 – 1.5 l

- Butelka z rozpylaczem typu airless (polietylen niskiej gęstości(LDPE): 0.25 – 1 l

#### 4.3.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do nieporowatych, twardych powierzchni.

Umyć i osuszyć powierzchnię przed dezynfekcją. Rozpylić na powierzchnię, w razie potrzeby przetrzeć w celu rozprowadzenia produktu. Całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać na działanie co najmniej 30 sekund. Użyte szmatki muszą zostać usunięte w zamkniętych pojemnikach.

Liczba aplikacji według typu opakowania niezbędna do uzyskania dawki 18.4 ml produktu na m<sup>2</sup> powierzchni:

- Worek z rozpylaczem: zastosować 19 rozpyleń na m<sup>2</sup> powierzchni;
- Sterylny rozpylacz (worek w butelce): zastosować 16 rozpyleń na m<sup>2</sup> powierzchni;
- Butelka z rozpylaczem: zastosować 14 rozpyleń na m<sup>2</sup> powierzchni;
- Butelka z rozpylaczem typu airless: zastosować 21 rozpyleń na m<sup>2</sup> powierzchni.

#### 4.3.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Stosować produkt w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wymagana minimalna częstotliwość wymiany powietrza to:

- 8 razy na godzinę w laboratoriach;
- 60 razy na godzinę w farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych;
- 150 razy na godzinę w pomieszczeniach czystych.

#### 4.3.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.3.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.3.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.4 Opis użycia

## Zastosowanie 4 - PT02: Środek dezynfekujący do nieporowatych rękawiczek – profesjonalności – dezynfekcja nieporowatych rękawiczek

<b>Grupa produktowa</b>	Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
<b>W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem</b>	Nie dotyczy
<b>Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)</b>	Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych  Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
<b>Obszar zastosowania</b>	Wewnątrz  Gotowy do użycia środek dezynfekujący do czystych, nieporowatych, rękawiczek w laboratoriach z częstotliwością wymiany powietrza 8 razy na godzinę lub częściej, farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych z częstotliwością wymiany powietrza 60 razy na godzinę lub częściej, oraz pomieszczeniach czystych z częstotliwością wymiany powietrza 150 razy na godzinę lub częściej.
<b>Sposób (-oby) nanoszenia</b>	Środek dezynfekujący do nieporowatych rękawiczek - -
<b>Dawka (-i) i częstość nanoszenia</b>	Nałóż 3 ml na rękawiczki. - 0 - -
<b>Kategoria (-e) użytkowników</b>	Profesjonalny
<b>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</b>	<u>Dozowanie automatyczne:</u> - Opakowania (HDPE, PP, PE): 1 – 20 l - Opakowania (HDPE, PP, PE) z pompką: 200 l (wyłącznie do pomieszczeń czystych) - DPPL z pompką (HDPE, PP, PE): 950 l i 1000 l (wyłącznie do pomieszczeń czystych)  <u>Dozowanie ręczne:</u> - Worek z rozpylaczem (PE): 0.9 – 20 l - Worek w butelce (wielowarstwowy koekstrudowany, pięciowarstwowy worek EVA/EVA/PVDC/EVA/EVA w butelce z HDPE, PP lub PE): 0.9 – 2 l - Butelka z rozpylaczem (HDPE, PP, PE): 0.5 – 1.5 l - Butelka z rozpylaczem typu airless (LDPE): 0.25 – 1 l

#### 4.4.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Gotowy do użycia środek dezynfekujący do nieporowatych rękawiczek.

Dozowanie automatyczne:

Nanieść 3 ml produktu bezpośrednio na czyste dłonie w rękawiczkach, rozprowadzić równomiernie i całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać na działanie co najmniej 30 sekund.

Dozowanie ręczne:

Rozpylić 3 ml produktu bezpośrednio na czyste dłonie w rękawiczkach, rozprowadzić równomiernie i całkowicie zwilżyć powierzchnię. Poczekać na działanie co najmniej 30 sekund.

Liczba aplikacji według typu opakowania niezbędna do naniesienia 3 ml produktu na czyste dłonie w rękawiczkach:

- Worek z rozpylaczem: zastosować 3 rozpylenia produktu na obie dłonie;
- Sterylny rozpylacz (worek w butelce): zastosować 3 rozpylenia produktu na obie dłonie;
- Butelka z rozpylaczem: zastosować 3 rozpylenia produktu na obie dłonie;
- Butelka z rozpylaczem typu airless: zastosować 4 rozpylenia produktu na obie dłonie.

#### 4.4.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Stosować produkt w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Wymagana minimalna częstotliwość wymiany powietrza to:

- 8 razy na godzinę w laboratoriach;
- 60 razy na godzinę w farmaceutycznych i kosmetycznych zakładach produkcyjnych;
- 150 razy na godzinę w pomieszczeniach czystych.

#### 4.4.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.4.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

#### 4.4.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz ogólne instrukcje użycia.

### 5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

## 5.1. Instrukcje stosowania

Patrz instrukcje specyficzne dla zastosowania.

## 5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Podczas obchodzenia się z produktem nosić nowe rękawiczki ochronne odporne na chemikalia (materiał, z którego wykonane są rękawiczki, powinien zostać określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie).

Unikać kontaktu z oczami.

## 5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Wdychanie: może powodować senność lub zawroty głowy.

Kontakt z oczami: powoduje poważne podrażnienie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

### Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Produkt nie powinien dostać się do wody ściekowej ani rowów melioracyjnych w stanie nierozcieńczonym lub niezneutralizowanym. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Rozcieńczyć dużą ilością wody. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Zebrać za pomocą materiału wiążącego cieczę (piasek, diatomit, uniwersalne materiały wiążące, trociny).

## 5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Produkt i jego opakowanie muszą być usuwane w sposób bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwiać lub spalać zgodnie z lokalnymi przepisami.

## 5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Okres ważności: 2 lata.  
Przechowywać jedynie w pierwotnym opakowaniu.  
Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz w temperaturze poniżej 30°C.  
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

## 6. Inne informacje

Produkt zawiera propan-2-ol (nr CAS: 67-63-0), dla którego uzgodniona europejską wartość referencyjna dla użytkownika profesjonalnego i stosowaną do oceny ryzyka tego produktu. wynosi 129.28 mg/m<sup>3</sup>