

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

MURIN Dife Mehka Vaba

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0012065-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0012065-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Murin Dife Mehka Vaba
--------------	-----------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Naslov	via Desman, 43 35010 Borgoricco Italija
Številka dovoljenja		SI-0012065-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0012065-0000
Datum dovoljenja		13/09/2018
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Naslov proizvajalca	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija
Kraj proizvodnih obratov	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Difenacoum
Ime proizvajalca	Dr Tezza s.r.l.
Naslov proizvajalca	via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija
Kraj proizvodnih obratov	via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. Vrsta(-e) formulacije

PA Pasta

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H373: Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}. H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku.
Previdnostni stavki	P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P280: Nositi zaščitne rokavice. P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč. P501: Odstraniti vsebino z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. strokovnjaki

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem v notranjih prostorih in zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: podgane 200 g, miši 20-40 g Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: <u>miši Proizvodi v obliki vabe:</u> 20-40 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 2 metrov. Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je

	<p>bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. <u>podgane Proizvodi v obliki vabe:</u> 200 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 10 metrov.</p> <p>V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 5 metrov.</p> <p>Postaje pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba ; strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>MURIN Dife Mehka Vaba je na voljo v dveh različnih formatih</p> <p>1 vroče varjene vrečke iz papirja, namenjenega stiku z živili, ali PE zaščita: od 1 0g, 12,5g, 15g, 20g na vabo</p> <p>2 plastične posodice z odmerki po 25- 30- 40- 50- 75 -80 -100- 150 g Velikost embalaže: od 1,5 kg do 25 kg</p> <p><i>V primeru embalaže, težje od 10 kg, so posamezni embalažni ovitki ločeno zapakirani največja velikost vreč 5 ali 10 kg</i></p> <p>Material pakiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovoj, plastika: koekstrudirana / HDPE / polietilen - pločevinka, papir, lepenka; - posodica, papir, lepenka z vsebovanim ovojem koekstrudirana / HDPE / polietilen - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - posodica: HDPE

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.

-
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane).
 - Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
 - Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
 - Upošteвайте preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
 - Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
 - Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
 - Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
 - Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvreči iz postaje za nastavljanje vab.
 - Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
 - Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
 - Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (UNI EN 374)

 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite.
 - Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
 - Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
 - Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
 - Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

 - ne segajte v vedro.
 - Če uporabljate izdelek v posodica z enkratnim odmerkom, morate pred namestitvijo vabe z zgornje strani posodice odstraniti zaščitno folijo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev

- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve iščite in odstranjujte poginule glodavce dovolj pogosto med obdobjem tretiranja (npr. najmanj dvakrat tedensko).
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.
- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:
- proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);
- se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;
- morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod).
- Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh.

Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.

- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- dstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje

- V primeru:

- izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

-izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo.

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.

Ne izzivajte bruhanja.

Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.

Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; Murin dife mehka vaba in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Nevarno za divje živali.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki.

- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.

- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

- Rok uporabnosti: 2 leta

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. usposobljeni poklicni uporabniki

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem hišne miši in podgane: v notranjih prostorih in zunaj okrog stavb podgane: odprta zunanja območja podgane: Zunanja odlagališča odpadkov
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. namestiti v pokrite in zaščitene pasti za vabo Neposredna uporaba vabe, pripravljene za uporabo, v rovu
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerki: podgane 200 g, miš 20-40g, trajnih vab 100g Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: <u>miš Proizvodi v obliki vabe: 20-40g</u> vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 2 metrov.

	<p>miš Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> <p><u>podgane: proizvodi v obliki vabe</u> : 200 g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 10 metrov.</p> <p>V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 5 metrov.</p> <p>podgane: Postaje za nastavljanje vab pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> <p>- <u>trajnih vab</u> 100g</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>MURIN Dife Mehka Vaba je na voljo v dveh različnih formatih</p> <p>1 vroče varjene vrečke iz papirja, namenjenega stiku z živili, ali PE zaščita: od 10g, 12,5g, 15g, do 20g</p> <p>2 plastične posodice z odmerki po 25- 30- 40- 50- 75 -80 -100- 150 g</p> <p>Velikost embalaže: od 1,5 kg do 25 kg</p> <p><i>V primeru embalaže, težje od 10 kg, so posamezni embalažni ovitki ločeno zapakirani največja velikost vreč 5 ali 10 kg</i></p> <p>Material pakiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovoj, plastika: koekstrudirana / HDPE / polietilen - pločevinka, papir, lepenka; - posodica, papir, lepenka z vsebovanim ovojem koekstrudirana / HDPE / polietilen

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45- plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60- posodica: HDPE |
|--|--|

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane).
- Razen tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odtok vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.
- Proizvod nastavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrдите postaje na tla ali druge strukture.

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; Murin dife mehka vaba in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
- Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.

- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (UNI EN 374)

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.
- Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.
- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljene poplavi.
- Zamenjajte morebitne vabe v postajah za nastavljanje vab, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.
- Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvreči iz postaje.
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
- Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja.
- Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
- Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
- Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
- Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja (če se izdelek ne uporablja v sistemu stalne vabe)

V primeru uporabe v sistemu stalne vabe

- Kjer je mogoče, je priporočljivo, da območje učinkovanja vabe pregledate najmanj vsake štiri tedne, da se izognete odporni populaciji.
- ne segajte v vedro.

- Če uporabljate izdelek v posodicah z enkratnim odmerkom, morate pred namestitvijo vabe z zgornje strani posodice odstraniti zaščitno folijo.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

- Proizvoda ne uporabljajte v pulzirajoči vabi.

- Nastavljanje trajnih vab je omejeno izključno na območja z visoko možnostjo ponovne invazije, kadar so se druge metode nadzora izkazale za nezadostne.

- TNastavljanje trajnih vab pregledovati v rednih časovnih presledkih v okviru celostnega sistema zatiranja škodljivcev in ocene tveganja ponovnega napada škodljivcev.

- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“).

- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino.

- Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo.

Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.

– Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščitnih mestih za vabo, ne umivajte z vodo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

-
- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
 - V primeru:

- izpostavljenosti kože umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
- izpostavljenosti oči izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.
- oralne izpostavljenosti previdno izperite usta z vodo.

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Nevarno za divje živali.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Ob koncu tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo
- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
 - Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabe: 2 leta.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

se obrnite na pooblaščen službe

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

se obrnite na pooblaščen službe

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje

- V primeru:

- izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo.

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.

Ne izzivajte bruhanja.

Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.

Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; Murin dife mehka vaba in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Ob koncu tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo.

- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice (UNI EN 374).

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

-
- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
 - Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
 - Rok uporabe: 2 leta.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni od zaužitja vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.
- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.