

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: IMIDASECT ANTS

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/21-12/44

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0017414-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	2
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	7
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	8
6. Ostale informacije	8

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

IMIDASECT ANTS

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Sharda Europe B.V.B.A
	Adresa	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/21-12/44	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0017414-0000	
Datum odobrenja	29/06/2016	
Datum isteka odobrenja	30/03/2027	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Španjolska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	37 - Imidaklopid
Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD. 393 East Heping Road Shijizhuang Kina

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2. Vrsta formulacije

GD - Gel za izravnu primjenu

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima. Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Neprofesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Monomorium pharaonis Uobičajeno ime: Faraonski mrav Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Linepithema humile Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Unutarnji prostori. Primjena u vanjskim prostorima oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: Primjena gel mamca iz šprice, ampule ili kapaljke (pipete) Detaljan opis: - Metoda: Primjena klopki s mamcima Detaljan opis: -
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 0,2g/m ² ; U unutarnjim prostorima: 0,2g/m ² ; U vanjskim prostorima: 0,2g na ulazu u gnijezdo ili 0,2 g po metru kretanja mrava ili 0,2 g/m opsega zgrade; Otvorena primjena u unutarnjim prostorima: na 1 m ² nanosite najviše jednu kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g). Otvorena primjena u vanjskim prostorima: Nanesite 1 kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g) izravno na ulaz u gnijezdo ili 1 kap po metru kretanja mrava. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine. Stopa primjene: Unutarnji prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m ² . Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m ² , klopka s 1 g mamca na 5 m ² , klopka s 1.2 g mamca na 6 m ² , klopka s 1.4 g mamca na 7m ² ; Vanjski prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m opsega zgrade. Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m, klopka s 1 g mamca na 5 m, klopka s 1.2 g mamca na 6 m, klopka s 1.4 g mamca na 7 m. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih klopki s mamcima ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	3 g, 5 g, 10 g, 15 g Plastična šprica (HDPE i transparentni polipropilen) 5mL ampula (HDPE) 4mL, 10mL kapaljka (pipeta) (HDPE)

Klopke (HDPE i transparentni polipropilen) s 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g mamca

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nema

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite spremnik ili etiketu proizvoda.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nema

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Profesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Monomorium pharaonis Uobičajeno ime: Faraonski mrav Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Linepithema humile Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Unutarnji prostori. Primjena u vanjskim prostorima oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: Primjena gel mamca iz patrone, ampule ili kapaljke (pipete) Detaljan opis: - Metoda: Primjena klopki s mamcima Detaljan opis: -
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 0,2g/m ² ; U unutarnjim prostorima: 0,2g/m ² ; U vanjskim prostorima: 0,2g na ulazu u gnijezdo ili 0,2 g po metru kretanja mrava ili 0,2 g/m opsega zgrade; Otvorena primjena u unutarnjim prostorima: na 1 m ² nanosite najviše jednu kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g). Otvorena primjena u vanjskim prostorima: Nanesite 1 kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g) izravno na ulaz u gnijezdo ili 1 kap po metru kretanja mrava. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine. Stopa primjene: Unutarnji prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m ² . Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m ² , klopka s 1 g mamca na 5 m ² , klopka s 1.2 g mamca na 6 m ² , klopka s 1.4 g mamca na 7 m ² ; Vanjski prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m opsega zgrade. Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m, klopka s 1 g mamca na 5 m, klopka s 1.2 g mamca na 6 m, klopka s 1.4 g mamca na 7 m. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih klopki s mamcima ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	30 g, 35 g, 50 g, 75 g, 100 g patrona, Plastika (HDPE i transparentni polipropilen) 5mL ampula (HDPE) 4mL, 10mL kapaljka (pipeta) (HDPE) Klopke (HDPE i transparentni polipropilen) s 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g mamca

--

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nema

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nema

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nema

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nema

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Nema

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

- 1) Prije primjene ukloniti sve izvore hrane za mrave (otpad, ostatke hrane...) sa zaraženog područja kako bi se potaknuo unos gela.
- 2) Kada su mravi prisutni u unutarnjim prostorima, primijeniti kapi gela u blizini kretanja mrava, na mjestima ulaska i u njihovim gnijezdima.
- 3) Kada su mravi prisutni u vanjskim prostorima, primijeniti kapi gela u blizini kretanja mrava ili u njihovim gnijezdima.
- 4) Na mjestima gdje je uočena samo sporadična pojava mrava, preporučuje se primjena klopki s mamcima.
- 5) Proizvod treba nanijeti samo na ograničeno područje i to na površine koje se ne čiste redovito, npr. iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili grijala za vodu.
- 6) Proizvod primijeniti samo na područjima koja se ne mogu potopiti ili smočiti, odnosno zaštićena od kiša, poplava i vode nakon pranja.
- 7) Jednom tjedno provjeriti klopke s mamcima.
- 8) Tijekom pregleda provjeriti tretirano područje i ako je potrebno zamijeniti klopku s mamcem ili primijeniti novu dozu gela.
- 9) Proizvod ne primjenjivati na površinama koje upijaju.
- 10) Primijeniti proizvod dalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline (npr. ne primijeniti ispod radijatora).
- 11) Izbjegavati kontinuiranu upotrebu proizvoda.
- 12) Primjetno smanjenje broja mrava očekuje se unutar 4 tjedna. Djelotvornost je dokazana samo protiv odraslih jedinki, ne protiv svih jedinki u gnijezdu.
- 13) Ako je zaraza i dalje prisutna unatoč primjeni proizvoda prema uputama za uporabu, obratiti se profesionalnoj službi za dezinfekciju.
- 14) Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita.
- 15) Na vanjskim površinama primjenjivati samo na asfaltiranim/popločanim površinama (ne primjenjivati na nezaštićeno tlo).
- 16) Ukloniti klopke s mamcima kada infestacija prestane.
- 17) Koristiti biocidni proizvod u preporučenim dozama i vremenskim razmacima.
- 18) Ne koristiti neonicotinoide za naknadni postupak suzbijanja gdje je došlo do otpornosti organizama i smanjenja učinkovitosti.
- 19) Pratiti problematične populacije štetnih organizama radi otkrivanja prvih promjena osjetljivosti.
- 20) U svrhu izbjegavanja pojave otpornosti na bilo koju aktivnu tvar, naizmjenično koristiti proizvode s različitim načinima djelovanja i izbjegavati čestu ponovnu uporabu iste aktivne tvari.
- 21) Primjena biocidnih pripravaka može se kombinirati s drugim sanitarnim mjerama.
- 22) Proizvode uvijek koristiti u skladu s preporukama na etiketi.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Ne koristiti proizvod izravno ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića, niti na površinama ili priboru koji bi mogli biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje, pićima i životinjama.
- 2) Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) NAKON DODIRA S KOŽOM: Operite izloženu kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.
- 2) NAKON DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 3) NAKON GUTANJA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 4) NAKON UDISANJA: Ne očekuje se inhalacijska izloženost.
- 5) Ovaj biocidni proizvod sadrži imidakloprid koji je opasan za pčele.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Odložiti sadržaj / spremnik na siguran način u skladu s nacionalnim propisima.
- 2) EWC: 200119 - Europski kodeks otpada: pesticidi (samo STL)
- 3) EWC: 150110 - Europski kodeks otpada: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je zagađena opasnim tvarima (samo STL)
- 4) Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod na tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) niti u odvodne kanale.
- 5) Odložite neiskorišteni proizvod, njegovu ambalažu i sav ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.
- 6) Ne čistiti klopku s mamicima prije odlaganja.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- 1) Ne skladištiti u blizini hrane, pića i stočne hrane. Čuvati izvan dohvata djece.
- 2) Proizvod ne izlagati sunčevom svjetlu.
- 3) Rok upotrebe proizvoda: 24 mjeseca

6. Ostale informacije

Proizvod sadrži goru tvar.