

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Masocare 1:4

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Číslo autorizácie: SK19-MRP-007-00-000

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0013904-0012

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	10
5.1. Pokyny na používanie	11
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	11
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	11
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	11
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	11
6. Ďalšie informácie	11

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Masocare 1:4

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

Evans Vanodine Europe

Adresa

6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Írsko

Číslo autorizácie

SK19-MRP-007-00-000 1-8

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0013904-0012

Dátum autorizácie

29/03/2019

Dátum skončenia platnosti autorizácie

19/03/2029

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu

Evans Vanodine International

Adresa výrobcu

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Spojené kráľovstvo

Miesto výrobných priestorov

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Spojené kráľovstvo

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1319 - Jód
Meno/Názov výrobcu	ACF Minera S.A.
Adresa výrobcu	San Martin č. 499 – Iquique Čile
Miesto výrobných priestorov	Baña Lagunas – Pozo Almonte Čile

Účinná látka	1319 - Jód
Meno/Názov výrobcu	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adresa výrobcu	Los Militares 4290, Piso 4 – Las Condes, Santiago Čile
Miesto výrobných priestorov	Závod spoločnosti Nueva Victoria, Závod spoločnosti Pedro de Valdivia – Severné Čile Čile

Účinná látka	1319 - Jód
Meno/Názov výrobcu	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa výrobcu	Hnos Amunategui 178 – Santiago Čile
Miesto výrobných priestorov	S.C.M. Cosayach Cala Cala – Pozo Almonte Čile

Účinná látka	1319 - Jód
Meno/Názov výrobcu	ISE CHemical Corporation
Adresa výrobcu	Kitaimaizumi 3695 – Oamishirasato City Chiba Japonsko
Miesto výrobných priestorov	Závod Shirasato – – Japonsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2,346
Alkohol etoxylát	C13-15 alkohol etoxylát (11EO)		157627-86-6	500-337-8	19,993

2.2. Typ úpravy

SL - Rozpustný koncentrát

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávať iba v pôvodnom balení.
 Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám.
 Uchovávať v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.
 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi
 Noste ochranné okuliare.
 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Pred dojením

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

DEZINFEKČIA NA VETERINÁRNU HYGIENU: Výrobky na dezinfekciu strukov dojných zvierat (kráv, byvolov, oviec, kôz) na použitie pred dojením.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Vedecký názov: Kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne použitie – Struky dojných zvierat.

Spôsob(y) aplikácie

Ručné namáčanie/napeňovanie -
Aplikácia pred dojením
Aplikujte každý deň pred každým dojením (1 – 3 krát denne). Pri ručnej aplikácii sa musí celý struk pokryť na minimálny kontaktný čas 60 sekúnd.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie:
a. Namáčanie
Krávy a byvolov: 10 ml/zviera na ošetrenie
Ovce: 5 ml/zviera na ošetrenie
Kozy: 6 ml/zviera na ošetrenie

b. Napeňovanie
Krávy a byvolov: 5 ml/zviera na ošetrenie
Ovce: 2,5 ml/zviera na ošetrenie
Kozy: 3 ml/zviera na ošetrenie

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača -
Aplikácia pred dojením
Pred dojením postriekajte struky všetkých kráv prípravkom.
Postrekom sa musí pokryť celý povrch všetkých strukov. Prípravok ponechajte na strukoch aspoň 60 sekúnd. Potom struky dôkladne utrite a osušte jednorazovou papierovou utierkou.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:
Krávy a byvolov: 10 – 15 ml/zviera na ošetrenie
Ovce: 5 – 7,5 ml/zviera na ošetrenie
Kozy: 7 – 10 ml/zviera na ošetrenie

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Pozri vyššie - - -
Pozri vyššie

Pozri vyššie. - - -
Pozri vyššie.

Kategória(ie) používateľov

Vyškolенý profesionál

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša/Balenie (HDPE) 5 – 25 l
Barel (HDPE) 200 l
IBC nádrž (HDPE) 1 000 l

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.
Tento prípravok sa musí pred použitím zriediť.
Pridajte 1 prostriedku do 9 častí čistej vody a poriadne premiešajte.
Každý deň pripravte čerstvý roztok.
Nádobky na roztok musia byť čisté a vhodné na toto použitie.
Pred použitím tohto prípravku skontrolujte, či sú vemená a struky čisté a suché.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie

Naplňte nádobku zriedeným prostriedkom do 2/3. Pred dojením namočte struky všetkých kráv, skontrolujte, či sú namočené po celej dĺžke struku. Prípravok ponechajte na strukoch aspoň 60 sekúnd. Potom struky dôkladne utrite a osušte jednorazovou papierovou utierkou.

Doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom, ak je to potrebné.

Nádobky po použití vyprázdňte a vymyte vodou.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača

Pred dojením postriekajte struky všetkých kráv zriedeným prostriedkom. Postrekom sa musí pokryť celý povrch všetkých strukov. Prípravok ponechajte na strukoch aspoň 60 sekúnd. Potom struky dôkladne utrite a osušte jednorazovou papierovou utierkou.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte mimo dosahu detí.

V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu po dojení zväziť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.

Pri ručnom namáčaní/napeňovaní:

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:

Počas fázy narábania s prípravkom používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o registrácii v informáciách o prípravku).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

–

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

–

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

–

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Po dojení

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

DEZINFEKČIA NA VETERINÁRNU HYGIENU: Výrobky na dezinfekciu strukov dojných zvierat (kráv, byvolov, oviec, kôz) na použitie po dojení.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Vedecký názov: Kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne použitie – Struky dojných zvierat.

Spôsob(y) aplikácie

Ručné namáčanie/napeňovanie -

Aplikácia po dojení

Aplikujte po každom dojení každý deň (1 – 3 krát denne). Pri ručnej aplikácii sa musí pokryť celý struk a zvieratá sa musia nechať stáť aspoň 5 minút.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie

a. Namáčanie

Kravy a byvolvy: 10 ml/zviera na ošetrenie

Ovce: 5 ml/zviera na ošetrenie

Kozy: 6 ml/zviera na ošetrenie

b. Napeňovanie

Kravy a byvolvy: 5 ml/zviera na ošetrenie

Ovce: 2,5 ml/zviera na ošetrenie

Kozy: 3 ml/zviera na ošetrenie

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača -

Aplikácia po dojení

Aplikujte po každom dojení každý deň (1 – 3 krát denne). Pri ručnej aplikácii sa musí pokryť celý struk a zvieratá sa musia nechať stáť aspoň 5 minút.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:

Kravy a byvolvy: 10 – 15 ml/zviera na ošetrenie

Ovce: 5 – 7,5 ml/zviera na ošetrenie

Kozy: 7 – 10 ml/zviera na ošetrenie

automatické namáčanie -

Aplikácia po dojení

Aplikujte po každom dojení každý deň (1 – 3 krát denne).

3. Automatické namáčanie:

Kravy a byvolvy: 10 ml/zviera na ošetrenie

Ovce: 5 ml/zviera na ošetrenie

Kozy: 6 ml/zviera na ošetrenie

Automatický postrek pomocou robota -

Aplikácia po dojení

Aplikujte po každom dojení každý deň (1 – 3 krát denne).

4. Automatický postrek pomocou robota:

Kravy a byvolvy: 10 – 15 ml/zviera na ošetrenie

Ovce: 5 – 7,5 ml/zviera na ošetrenie

Kozy: 7 – 10 ml/zviera na ošetrenie

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Pozri vyššie - - -
Pozri vyššie

Pozri vyššie. - - -
Pozri vyššie.

pozri vyššie - - -
pozri vyššie

pozri vyššie - - -
pozri vyššie

Kategória(ie) používateľov

Vyškolený profesionál

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša/Balenie (HDPE) 5 – 25 l
Barel (HDPE) 200 l
IBC nádrž (HDPE) 1 000 l

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.

Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.

Po aplikácii treba zaistiť, aby sa prípravok neodstránil, aby sa zabezpečil dostatočný kontaktný čas (napr. nechajte kravy stáť aspoň 5 minút).

Tento prípravok sa musí pred použitím zriediť.

Pridajte 1 prostriedku do 4 častí čistej vody a poriadne premiešajte.

Každý deň pripravte čerstvý roztok.

Nádobky na roztok musia byť čisté a vhodné na toto použitie.

Pred použitím tohto prípravku skontrolujte, či sú vemená a struky čisté a suché.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie

Naplňte nádobku zriadeným prostriedkom do 2/3. Namočte struky všetkých kráv okamžite po dojení a skontrolujte, či sú ponorené po celej dĺžke struku.

Doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom, ak je to potrebné.

Po dojení vyprázdňte a vymyte nádobky vodou.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača

Okamžite po dojení postriekajte struky všetkých kráv zriadeným prostriedkom.

Postrekom sa musí pokryť celý povrch všetkých strukov.

3. Automatické namáčanie

Po odobratí nádobiek na struky pomocou zariadenia na automatické odobratie dojacej súpravy (ACR) sa struky pokrývajú zriadeným prostriedkom. Celý proces je automatizovaný.

4. Automatický postrek robotom

Po robotickom dojení sa zriadený prostriedok automaticky nastrieka na struky zo skupinového ramena. Oplachovanie postrekovača sa vykonáva automaticky.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávať mimo dosahu detí.
V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu pred dojením zväziť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.
Ručné namáčanie/napeňovanie, automatické namáčanie a automatický postrek robotom:
Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.
Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:
Počas fázy narábania s prípravkom používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o registrácii v informáciách o prípravku).
Pri aplikácii tohto prostriedku noste vhodnú ochrannú obuv (EN 13832).
Musí sa nosiť ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).
Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

–

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

–

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

–

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Pred dojením a po dojení

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

DEZINFEKCIA NA VETERINÁRNU HYGIENU: Výrobky na dezinfekciu strukov dojných zvierat (kráv, byvolov, oviec, kôz) na použitie po dojení.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Vedecký názov: Kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: Neuplatňuje sa

Oblasti použitia

Vnútorne

Vnútorne použitie – Struky dojných zvierat.

Spôsob(y) aplikácie

Ručné namáčanie/napeňovanie -
Aplikácia pred dojením a po ňom
Aplikujte pred každým dojením a po ňom každý deň (celkovo až 5 aplikácií denne). Pri ručnej aplikácii zaistíte, aby bol pred dojením celý struk pokrytý v kontaktnom čase 60 sekúnd a po dojení aby bol celý struk pokrytý a zvieratá zostali stáť 5 minút.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie:
 - a. Namáčanie
Kravy a byvoly: 10 ml/zviera na ošetrovanie
Ovce: 5 ml/zviera na ošetrovanie
Kozy: 6 ml/zviera na ošetrovanie
 - b. Napeňovanie
Kravy a byvoly: 5 ml/zviera na ošetrovanie
Ovce: 2,5 ml/zviera na ošetrovanie
Kozy: 3 ml/zviera na ošetrovanie

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača -
Aplikácia pred dojením a po ňom
Aplikujte pred každým dojením a po ňom každý deň (celkovo až 5 aplikácií denne). Pri ručnej aplikácii zaistíte, aby bol pred dojením celý struk pokrytý v kontaktnom čase 60 sekúnd a po dojení aby bol celý struk pokrytý a zvieratá zostali stáť 5 minút.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:
Kravy a byvoly: 10 – 15 ml/zviera na ošetrovanie
Ovce: 5 – 7,5 ml/zviera na ošetrovanie
Kozy: 7 – 10ml/zviera na ošetrovanie

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Pozri vyššie - - -
Pozri vyššie

Pozri vyššie. - - -
Pozri vyššie.

Kategória(ie) používateľ'ov

Vyškolený profesionál
Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša/Balenie (HDPE) 5 – 25 l
Barel (HDPE) 200 l
IBC nádrž (HDPE) 1 000 l

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.
Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.
Po dojení: Po aplikácii sa treba uistiť, že sa prípravok neodstráni, aby sa zabezpečil dostatočný kontaktný čas (napr. nechajte kravy stáť minimálne 5 minút).
Tento prípravok sa musí pred použitím zriediť.
Roztoky sú rôzne na použitie pred dojením a na použitie po dojení, preto treba použiť rôzne nádoby na struky. Pozri špecifické

pokyny.

Každý deň pripravte čerstvý roztok.

Nádobky na roztok musia byť čisté a vhodné na toto použitie.

Pred použitím tohto prípravku skontrolujte, či sú vemená a struky čisté a suché.

Pred dojením – Zmiešajte 1 diel prípravku s 9 dielmi čistej vody a poriadne premiešajte.

Po dojení – Zmiešajte 1 diel prípravku so 4 dielmi čistej vody a poriadne premiešajte.

1. Ručné namáčanie/napeňovanie

Naplňte nádobku na struk prípravkom do 2/3. Pred dojením namočte struky všetkých kráv, skontrolujte, či sú namočené po celej dĺžke struku.

Prípravok ponechajte na strukoch aspoň 60 sekúnd. Potom struky dôkladne utrite a osušte jednorazovou papierovou utierkou.

Namočte struky všetkých kráv okamžite po dojení a skontrolujte, či sú ponorené po celej dĺžke struku.

Doplňte čerstvým dezinfekčným prostriedkom, ak je to potrebné.

Nádobky po použití vyprázdňte a vmyte vodou.

2. Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača

Pred dojením postriekajte struky všetkých kráv zriadeným prostriedkom. Postrekom sa musí pokryť celý povrch všetkých strukov.

Prípravok ponechajte na strukoch aspoň 60 sekúnd. Potom struky dôkladne utrite a osušte jednorazovou papierovou utierkou.

Okamžite po dojení postriekajte struky všetkých kráv zriadeným prostriedkom. Postrekom sa musí pokryť celý povrch všetkých strukov.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pri ručnom namáčaní/napeňovaní:

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača:

Počas fázy narábania s prípravkom používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o registrácii v informáciách o prípravku).

Pri aplikácii tohto prostriedku noste vhodnú ochrannú obuv (EN 13832).

Musí sa nosiť ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prostriedkom je povinné.

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

–

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

–

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

–

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pozri konkrétny návod na použitie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozri opatrenia na zmiernenie rizika.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pravdepodobné priame alebo nepriame nepriaznivé účinky môžu zahŕňať:

Podráždenie očí

Všeobecnú nevoľnosť pri prehltnutí

Opatrenia prvej pomoci

Vdýchnutie: Nepravdepodobný spôsob expozície, keďže prostriedok neobsahuje prchavé látky. Pri vdýchnutí postrekovej hmly presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch, udržiajte v teple a dajte do polohy, v ktorej sa jej pohodlne dýcha.

Prehltnutie: Nevyvolávajte zvracanie. Je potrebné vypiť veľké množstvo vody. Pri dlhšom pociťovaní nevoľnosti vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Kontakt s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody.

Kontakt s očami: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Ak sa príznaky vyskytujú aj po umytí, okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.

NIKDY NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOZORU

Odporúčanie pre lekárske a zdravotnícke personál:

Poskytnite podpornú liečbu podľa príznakov.

AK POŽIADATE O LEKÁRSKU POMOC, MAJTE OBAL ALEBO ETIKETU K DISPOZÍCII A VOLAJTE MIESTNE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM [+421 2 54 774 166].

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci ošetrovania nepoužitý prípravok, obal a všetok kontaminovaný materiál zneškodnite v súlade s miestnymi požiadavkami. Prípravok nevypúšťajte do kanalizácie.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Čas použiteľnosti 24 mesiacov.

Uchovávajte v pôvodnej utesnenej nádobe a chráňte pred príliš vysokou a príliš nízkou teplotou.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Chráňte pred mrazom. Ak sa obsah zmrazí, musí sa pred použitím rozmraziť a poriadne premiešať.

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste.

Skladujte pri teplote pod 25 °C.

6. Ďalšie informácie

Upozorňujeme, že ak so skupinou výrobkov Meta-SPC používate ďalšie prísady, používané koncentrácie musia spadať do rámca posúdenia environmentálneho rizika.