



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/25
URBROJ: 534-03-3-2/3-23-3
Zagreb, 24. siječnja 2023.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italija, u predmetu međusobnog priznavanja procjene rizika i odobrenja za biocidne proizvode, donosi

R J E Š E N J E

I. Trgovačkom društvu VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Via Desman 43,, S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italija (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Mirmex GR**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **1.11.2032.**

O b r a z l o ž e n j e

Trgovačko društvo VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italija, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za usporednim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države članice Grčke.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 1.11.2032. u skladu s datumom odobrenje referentne države. a temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

izv.prof.dr.sc. Vili Beroš, dr.med.



Dostaviti:

1. VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l., Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italija
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Mirmex GR

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/25

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0029871-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	Mirmex GR
-----------------	-----------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.
	Adresa	Via Desman 43, S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italija
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/25	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0029871-0000	
Datum odobrenja	24.1.2023.	
Datum isteka odobrenja	1.11.2032.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Adresa proizvođača	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	(RS)- α -cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)
Naziv proizvođača	Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd)
Adresa proizvođača	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, B-3583 BERINGEN Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Tagros Chemicals India Private Ltd. Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu Indija

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
(RS)- α -cijano-3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (cipermetrin)		Aktivna tvar	52315-07-8	257-842-9	0,632
acetatna kiselina	Acetic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,012

2.2. Vrsta formulacije

GR - granule

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Pažljivo pročitajte i slijedite upute. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Opća uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Za suzbijanje mrava (radilica i gnijezda) u zatvorenim prostorima Za suzbijanje mrava (radilica) na otvorenom oko objekata samo na terasama i balkonima.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: mravi Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru u zatvorenom, na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	Metoda: Raspršivanjem Detaljan opis: Raspršivanjem Proizvod spreman za uporabu Primjena u pukotinama i procjepima. Nanesite proizvoda u tankim slojevima u otvore i pukotine (npr. iza ili ispod aparata, ispod sudopera), prazninama i šupljinama (pregrade između zidova, rupe itd.) gdje se obično skrivaju insekti. Za vanjski tretman oko zgrade: Nanositi u otvore i pukotine samo na popločenim površinama i krovovima (zaštićenim od kiše) na terasama i balkonima.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 8 g/ m ² Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene:

	Tretman se može provesti do 2 puta godišnje s minimalnim razmakom od 4 tjedana između aplikacija.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Omotnica: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g</p> <p>Materijal omotnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -plastični: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 -plastični: PP 25+PET MET 12 +PE60 -plastični: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 -plastični: PP25+PE80 -plastični: PP25+PET12+PE60 <p>Posipač: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 350 g</p> <p>boca : LDPE, HDPE</p> <p>čep: PP; LDPE</p> <p>Bočica s aplikatorom: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 350 g</p> <p>boca: HDPE</p> <p>čep: PP; LDPE</p>

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod je granula protiv mrava formulirana s mikroinkapsuliranim cipermetrinom. 8 grama proizvoda jednako je otprilike 2 žličice. Treba koristiti jednokratnu ili namjensku čajnu žličicu. Pažljiv prethodni pregled područja gdje insekti prolaze ili se skrivaju povećava učinkovitost tretmana. Posebno treba paziti na tamna i topla mjesta, u podrumima i skladištima. Također, u prostorima oko vodovodnih cijevi, grijanja i ventilacije, ispod ormara i drugih glomaznih predmeta. Prije uporabe pročitati naljepnicu ili upute i slijediti sve dostupne informacije. U slučaju trajne infestacije, kontaktirati profesionalne stručnjake. Učinak ubijanja dogodit će se unutar 60 minuta. Preostali učinak trajat će do 4 tjedana. Preostali će učinak, međutim, ovisiti o prirodi i čistoći tretirane površine. Uklonite (očistite) proizvod nakon isteka preostalog vremena. Nakon tretmana uklonite mrtve insekte.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ne koristiti izravno ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića ili na površinama ili sredstvima koja će biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje i stokom/kućnim ljubimcima. Za zatvorenim prostorima primjenu, proizvod treba nanijeti samo na ograničeno područje na površine koje se ne čiste redovito, npr. iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili grijala za vodu, u sve pukotine i procjepe koji mogu biti skloništa. Primjena je ograničena samo na područja u kojima se ne provodi mokro čišćenje. Za tretman oko zgrade: nanositi samo na popločanim površinama i krovovima. Nemojte primjenjivati blizu površinskih voda ili na području zona zaštite voda. Za uporabu samo u prostorima koji nisu dostupni dojenčadi, djeci, kućnim ljubimcima i životinjama kojima proizvod nije namijenjen. Ne koriste se postupci mokrog čišćenja. Koristite samo postupke suhog čišćenja (usisavač ili metlu) ili koristite vlažan papir. Primjena je ograničena samo na područja u kojima se ne provodi mokro čišćenje.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Proizvod sadrži: cipermetrin. Može izazvati paresteziju. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

AKO SE UDIŠE: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Ne postoji protuotrov, savjetuje se simptomatsko liječenje.

Ne očekuju se štetni učinci ako se proizvod koristi sukladno uputama za uporabu.

Broj telefona centra za otrovanje:

Spriječiti ulazak u odvođe, kanalizaciju i vodene tokove. Pokupiti i organizirati odlaganje bez stvaranja oblaka prašine. Sakupite proliveno i stavite ga u prikladne spremnike dobro zatvorene za odlaganje. Kontaminirane površine očistite vlažnim papirom i nakon čišćenja odložite u čvrsti otpad.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Metode zbrinjavanja otpada:

- Na kraju postupka neutrošeni pripravak i ambalažu treba zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.
- Ne dopustite otjecanje u kanalizaciju, vodotokove ili tlo.

Proizvod i/ili spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Spremnike čuvati dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu, dalje od djece, životinja, hrane i stočne hrane.

Proizvod je stabilan 2 godine ako se čuva u originalnom neoštećenom pakiranju, zaštićen od svjetlosti i sunčeve svjetlosti, te kada se čuva na sobnoj temperaturi.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Profesionalni korisnici

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Za suzbijanje mrava (radilica i gnijezda) u zatvorenim prostorima Za suzbijanje mrava (radilica) na otvorenom oko objekata samo na terasama i balkonima.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: mravi Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Zatvorenim prostorima, vanjski oko zgrade
Načini primjene	Metoda: Raspršivanjem Detaljan opis: Raspršivanjem Proizvod spreman za uporabu Primjenu u pukotinama i procjepima. Za zatvorenim prostorima primjenu: Nanesite proizvoda u tankim slojevima u otvore i pukotine (npr. iza ili ispod aparata, ispod sudopera), prazninama i šuplinama (pregrade između zidova, rupe itd). Za vanjski tretman oko zgrade: Nanositi u otvore i pukotine samo na popločanim površinama i krovovima (zaštićenim od kiše) na terasama i balkonima.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 8g/ m ² Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Tretman se može provesti do 2 puta godišnje s minimalnim razmakom od 4

	tjedana između aplikacija.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Omotnica: 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2kg, 2.5 kg; 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg</p> <p>Materijal omotnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -plastični: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 -plastični: PP 25+PET MET 12 +PE60 -plastični: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 -plastični: PP25+PE80 -plastični: PP25+PET12+PE60 <p>Posipač: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750g, 1000 g</p> <p>boca: LDPE, HDPE</p> <p>čep: PP; LDPE</p> <p>Bočica s aplikatorom: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g 500 g, 750g</p> <p>boca: HDPE</p> <p>čep: PP; LDPE</p> <p>Kanta CPP; 5 kg, 10 kg</p>

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ne miješajte s drugim kemikalijama ili proizvodima.

Proizvod je granula protiv mrava formulirana s mikroinkapsuliranim cipermetrinom.

8 grama proizvoda jednako je otprilike 2 žličice. Treba koristiti jednokratnu ili namjensku čajnu žličicu.

Prije uporabe pročitati naljepnicu ili upute i slijediti sve dostupne informacije.

Preostali učinak trajat će do 4 tjedana. Preostali će učinak, međutim, ovisiti o prirodi i čistoći tretirane površine.

Uklonite (očistite) proizvod nakon isteka preostalog vremena.

Nakon tretmana uklonite mrtve insekte.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ne koristiti izravno ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića ili na površinama ili sredstvima koja će biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje i stokom/kućnim ljubimcima.

Za zatvorenim prostorima primjenu, proizvod treba nanijeti samo na ograničeno područje na površine koje se ne čiste redovito, npr. iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili grijala za vodu, u sve pukotine i procjepe koji mogu biti skloništa. Primjena je ograničena samo na područja u kojima se ne provodi mokro čišćenje.

Za tretman oko zgrade: nanositi samo na popločanim površinama i krovovima (zaštićenim od kiše).

Nemojte primjenjivati blizu površinskih voda ili na području zona zaštite voda.

Za uporabu samo u prostorima koji nisu dostupni dojenčadi, djeci, kućnim ljubimcima i životinjama kojima proizvod nije namijenjen.

U slučaju upotrebe s alatom za nanošenje: radi zaštite podzemne vode, organizama u tlu i biljaka tlo mora biti pokriveno tijekom primjene ili odstranjivanja proizvoda. Preostale količine i ostaci koji sadrže proizvod, moraju biti odloženi kao kemijski otpad.

Ne koristite se postupci mokrog čišćenja. Koristite samo postupke suhog čišćenja (usisavač ili metlu) ili koristite vlažan papir. Nakon čišćenja, odložite skupljeni materijal u suhi otpad ili korišteni vlažni papir kao čvrsti otpad.

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Proizvod sadrži: cipermetrin. Može izazvati paresteziju.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

AKO SE UDIŠE: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili

liječnika.

Ne postoji protuotrov, savjetuje se simptomatsko liječenje.

Ne očekuju se štetni učinci ako se proizvod koristi sukladno uputama za uporabu.

Broj telefona centra za otrovanje:

Spriječiti ulazak u odvođe, kanalizaciju i vodene tokove. Pokupiti i organizirati odlaganje bez stvaranja oblaka prašine. Sakupite proliveno i stavite ga u prikladne spremnike dobro zatvorene za odlaganje. Kontaminirane površine očistite vlažnim papirom i nakon čišćenja odložite u čvrsti otpad.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Kada koristite uređaje za jednokratnu upotrebu (uređaji za višekratnu upotrebu): Očistite uređaje vlažnim papirom, a papir nakon čišćenja odložite u kruti otpad.

Metode zbrinjavanja otpada:

- Na kraju postupka neutrošeni pripravak i ambalažu treba zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.
- Ne dopustite otjecanje u kanalizaciju, vodotokove ili tlo.

Proizvod i/ili spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Spremnike čuvati dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu, dalje od djece, životinja, hrane i stočne hrane.

Zaštititi od svjetlosti i sunčeve svjetlosti.

Proizvod je stabilan 2 godine ako se čuva u originalnom neoštećenom pakiranju, zaštićen od svjetlosti i sunčeve svjetlosti, te kada se čuva na sobnoj temperaturi.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Proizvod je granula protiv mrava formulirana s mikroinkapsuliranim cipermetrinom.

Prije uporabe pročitati naljepnicu ili upute i slijediti sve dostupne informacije.

Pažljiv prethodni pregled područja gdje insekti prolaze ili se skrivaju povećava učinkovitost tretmana. Posebno treba paziti na tamna i topla mjesta, u podrumima i skladištima. Također, u prostorima oko vodovodnih cijevi, grijanja i ventilacije, ispod ormara i drugih glomaznih predmeta.

Ne miješajte s drugim kemikalijama ili proizvodima.

Uklonite (očistite) proizvod nakon isteka preostalog vremena. Nakon tretmana uklonite mrtve insekte.

Strategije za upravljanje razvojem otpornosti:

- Gdje je moguće, treba preporučiti kombiniranje tretmana primjene s nekemijskim mjerama.
- Mijenjati proizvode s različitim aktivnim tvarima s različitim načinom djelovanja (radi uklanjanja otpornih jedinki iz populacije).
- U slučajevima kada doze na etiketi, pravilno primijenjene, ne daju očekivanu razinu kontrole i pokaže se otpornost, treba prestati koristiti bilo koji proizvod koji sadrži aktivne tvari s istim načinom djelovanja.
- Korisnici bi trebali obavijestiti ako je tretman neučinkovit i izravno prijaviti nositelju autorizacije. Nositelj autorizacije treba prijaviti sve uočene incidente otpornosti nadležnim tijelima (CA) ili drugim imenovanim tijelima uključenim u upravljanje otpornošću.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ne koristiti (upotrebljavati/primjenjivati) izravno ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića ili na površinama ili sredstvima koja će biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje i stokom/kućnim ljubimcima.

Za zatvorenim prostorima primjenu, proizvod treba nanijeti samo na ograničeno područje na površine koje se ne čiste redovito, npr. iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhinjskog sudopera, ispod pećnice ili grijala za vodu, u sve pukotine i procjepe koji mogu biti skloništa. Primjena je ograničena samo na područja u kojima se ne provodi mokro čišćenje.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Za tretman oko zgrade: nanositi samo na popločanim površinama i krovovima.
Nemojte primjenjivati blizu površinskih voda ili na području zona zaštite voda.
Za uporabu samo u prostorima koji nisu dostupni dojenčadi, djeci, kućnim ljubimcima i životinjama kojima proizvod nije namijenjen.
Ne koriste se postupci mokrog čišćenja. Koristite samo postupke suhog čišćenja (usisavač ili metlu) ili koristite vlažan papir. Nakon čišćenja, odložite skupljeni materijal u suhi otpad ili korišteni vlažni papir kao čvrsti otpad.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Proizvod sadrži: cipermetrin. Može izazvati paresteziju.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

AKO SE UDIŠE: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Ne postoji protuotrov, savjetuje se simptomatsko liječenje.

Ne očekuju se štetni učinci ako se proizvod koristi sukladno uputama za uporabu.

Broj telefona centra za trovanje:

Spriječiti ulazak u odvođe, kanalizaciju i vodene tokove. Pokupiti i organizirati odlaganje bez stvaranja oblaka prašine. Sakupite proliveno i stavite ga u prikladne spremnike dobro zatvorene za odlaganje. Kontaminirane površine očistite vlažnim papirom i nakon čišćenja odložite u čvrsti otpad.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Metode zbrinjavanja otpada:

- Na kraju postupka neutrošeni pripravak i ambalažu treba zbrinuti u skladu s lokalnim zahtjevima.
- Ne dopustite otjecanje u kanalizaciju, vodotokove ili tlo.

Proizvod i/ili spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Spremnike čuvati dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu, dalje od djece, životinja, hrane i stočne hrane.

Proizvod je stabilan 2 godine ako se čuva u originalnom neoštećenom pakiranju, zaštićen od svjetlosti i sunčeve svjetlosti, te kada se čuva na sobnoj temperaturi.

6. OSTALE INFORMACIJE

Proizvod sadrži sljedeći nanomaterijal: "Silicij dioksid (nano)."

Koncentracija aktivne tvari: 0.6 % w/w (čista); 0.632 % w/w (tehnička)