

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: Autan Tropical Dry Spray

Product type(s): PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Authorisation number: 2107-2, 2107-4

R4BP 3 asset reference number: BG-0010777-0000

Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	1
2. Product composition and formulation	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Type of formulation	2
3. Hazard and precautionary statements	2
4. Authorised use(s)	2
5. General directions for use	4
5.1. Instructions for use	5
5.2. Risk mitigation measures	7
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	9
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	11
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	13
6. Other information	15

Administrative information

1.1. Trade names of the product

Autan Tropical Dry Spray
Autan Protection Plus Dry Spray
Autan Multi Insect Dry Spray

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder	Name	SC Johnson Wax SRL
	Address	Strada Plantelor, Nr. 37A Sector 2 Bucuresti Romania
Authorisation number	2107-2, 2107-4	
R4BP 3 asset reference number	BG-0010777-0000	
Date of the authorisation	30/03/2017	
Expiry date of the authorisation	20/02/2027	

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Address of the manufacturer	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poland
Location of manufacturing sites	UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Poland

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	23 - N,N-diethyl-meta-toluamide
Name of the manufacturer	Vertellus Performance Materials Inc
Address of the manufacturer	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro United States
Location of manufacturing sites	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro United States

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Active Substance	134-62-3	205-149-7	25

2.2. Type of formulation

aerosol

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements	
Precautionary statements	

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - repellent

Product type

PT19 - Repellents and attractants (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use

Биоцидът е репелент, който защитава от ухапвания от комари и кърлежи. Осигурява защита от обикновени, тропически, тигрови комари до 8 часа и от кърлежи до 8 часа.

Target organism(s) (including development stage)

Scientific name: mosquitos
Common name: Mosquitoes
Development stage: Adults

Field(s) of use

Outdoor

Application method(s)

aerosol dispenser -

Apply at the rate
of 1.0 g product per 645 cm² (0.388 mg DEET cm²).

Multi-mosquito repellency

Repels common, tropical and tiger mosquitoes
immediately that may carry Malaria, Yellow Fever, Dengue Fever, and West Nile
Virus for up to 8 hours per application.

Repels ticks for up to 8 hours per
application.

Do not apply more than once in 24 hours and
avoid over-application

Application rate(s) and frequencies

Apply at the rate of 1.0 g product per 645 cm² (0.388 mg DEET cm²). - 25 -

**Продължителност на
репелентния ефект:**
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между

обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

Category(ies) of users

General public (non-professional)

Pack sizes and packaging material

Аерозолни флакони от калайдисана стомана, с обем 100 ml.

4.1.1 Use-specific instructions for use

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от един път за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

5.2. Risk mitigation measures

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от един път за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от един път за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от един път за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Биоцидът е готов за употреба (аерозол). Преди употреба опаковката да се разклати добре.

Прилага
се върху откритите части на тялото, които са изложени на ухапвания, като се пръска от разстояние 15 – 20 cm от повърхността за около 1 секунда и се нанася на равен, тънък слой. Да се нанася най-малкото количество, достатъчно да омокри участъците от кожата, които трябва да бъдат защитени.

Разходна норма: 1 g биоцид на 645cm² кожа.

За възрастни: прилага се внимателно върху кожата на лице, врат, длани, долните части на ръцете и краката.

За деца над 2 години: прилага внимателно на по-ограничени части от тялото - лице, врат, долната части на краката.

Да
не се прилага при деца под 2 годишна възраст.

Да
не се прилага повече от един път за 24 часа и да се избягва прекалената употреба.

Да
не се пръска директно върху лицето. При обработка на лицето, продукта първо се пръска върху дланта и след това се нанася внимателно, без да се засягат очите и устата.

За
деца между 2 и 12 години обработката на кожата да се извършва от възрастен, който нанася препарата на дланите на ръцете си и обтрива кожата на детето.

Репелентът
да не се нанася върху дланите и ръцете на деца под 12 годишна възраст.

Да

не се прилага под дрехите. Препоръчва се останалата нетретирана част от тялото да се защитава от дрехите (по възможност дълги панталони или дрехи с дълги ръкави) и така да се ограничи достъпа на хапещи насекоми до кожата.

След
прекратяване на контакта с насекоми и кърлежи, участъкът от кожата, върху който е нанесен биоцида да се измие обилно с вода и сапун.

Да
не се замърсяват с продукта храни и напитки, съдове предназначени за тяхната употреба и повърхности, които влизат в контакт с храни.

Да
се използва само на открито или на добре проветриво място и да не се вдишват парите.

Продължителност на репелентния ефект:
комари до 8 часа, кърлежи до 8 часа.

Интервал между обработките: Да не се прилага повече от един път за 24 часа.

6. Other information