

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: RED PEARL PASTA

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0016256-0002

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0021166-0002

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	9
5.1. Pokyny pro používání	9
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	10
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	10
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	11
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	12
6. Další informace	12

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

RED PEARL PASTA

1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa
držitele povolení**

Jméno (název)

LODI S.A.S.

Adresa

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie

Číslo povolení

CZ-0016256-0002 1-1

**Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3**

CZ-0021166-0002

Datum udělení povolení

06/08/2019

**Datum skončení
platnosti povolení**

31/12/2024

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Lodi S.A.S.

Adresa výrobce

Parc d'activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie

Umístění výrobních závodů

Parc d'activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

3 - A-chloralosa

Název výrobce

Lodi S.A.S.

Adresa výrobce

Parc d'activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francie

Umístění výrobních závodů

HIKAL Ltd T-21 MIDC Industrial Area Taloja Raigad District 410208 Maharashtra Indie

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
A-chloralosa	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	účinná látka	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Typ složení přípravku

RB - Nástraha k přímému použití

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty
o nebezpečnosti

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné
zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah v souladu s místními požadavky.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Použití v průmyslu / školenými profesionály

Typ přípravku	Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	<p>Přípravek ve formě pasty s obsahem účinné látky A-chloralosa (40 g/kg) aplikovaný do deratizačních staniček nebo na zakrytá nástražná stanoviště určený k hubení myši uvnitř obytných, průmyslových a komerčních budov včetně zemědělských budov v zamořených oblastech (podél stěn, oken...) za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů (např. historické budovy, technické objekty).</p> <p>Přípravek je určen pro průmyslové, profesionální použití</p>
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	<p>Latinský název: Mus musculus Obecný název: Myš domácí Vývojové stadium: -</p>
Oblast použití	<p>Vnitřní</p> <p>Vnitřní</p>
Metoda(y) aplikace	<p>Metoda: Aplikace návnady Podrobný popis: Přípravek se aplikuje aplikovaný do deratizačních staniček nebo na zakrytá nástražná stanoviště do míst, kde se hlodavci aktivně pohybují.</p> <p>Použití ve vnitřních prostorech:</p> <p>Myši (silné zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 3 m.</p> <p>Myši (slabé zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 5 m.</p> <p>.</p>
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	<p>Míra aplikace: - Myši, silné zamoření: od 5 g do 20 g produktu na deratizační krmítko nebo zakryté návnadné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními krmítky a zakrytými návnadnými stanovišti: 3 m. - Myši, slabé zamoření: od 5 g do 20 g produktu na deratizační krmítko nebo zakryté návnadné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními krmítky a zakrytými návnadnými stanovišti: 5 m.</p> <p>Ředění (%): Počet a načasování aplikace: Použití ve vnitřních prostorech:</p> <p>Myši (silné zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 3 m.</p>

Myši (slabé zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 5 m.

Počet deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je určen velikostí ošetřované oblasti a mírou zamoření.

Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště zkontrolujte a doplňte po několika dnech od první aplikace a poté jednou týdně, dokud dochází ke konzumaci nástrahy.

Kategorie uživatelů

průmyslový

Vyškolený profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Použití v průmyslu a školenými profesionály

Typ Materiál Velikost

Deratizační stanička PP nebo PS 5, 10, 20g

Krabice Papír, karton 1, 1,5, 2,5, 3 a 5 kg

Kazeta Plast PP 50, 100 a 310 g

Kbelík Plast PP 1, 1,5, 2,5, 3 a 5 kg

Přípravek je dodáván v následujících baleních:

- jednotlivé balíčky v papíru

- kartuše do aplikačních pistolí.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště lze použít uvnitř obytných, průmyslových a komerčních budov včetně zemědělských budov v zamořených oblastech (podél stěn, oken...). Dávku nebo počet sáčků na deratizační staničku a zakryté nástražné stanoviště je nutno přizpůsobit účinné dávce. Počet deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je určen velikostí ošetřované oblasti a mírou zamoření.

Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti. Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště zkontrolujte a doplňte po několika dnech od první aplikace a poté jednou týdně, dokud dochází ke konzumaci nástrahy.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Na štítku produktu a na štítku sáčku musí být uvedeno varování „Neotevírejte sáček“. Na kazetách musí být uvedeno varování „Nepoškozujte kazety, ani prázdné“. Držitel oprávnění musí zajistit dostupnost neprůhledných a zabezpečených deratizačních staniček. Za zabezpečené deratizační staničky jsou považovány obaly, v nichž je návnada nepřístupná pro děti a jiné než cílové organismy.

Dále je nutné zajistit prostředky, které zabrání dětem v otevření obalu. Za zakrytá nástražná stanoviště jsou považována nástražná

stanoviště, která poskytují stejnou úroveň ochrany osob a životního prostředí jako deratizační staničky a jsou upevněná, takže jimi nelze pohnout a nedojde k přímému kontaktu nástražky s životním prostředím. Tato zařízení musí být zkonstruována tak, aby návnada nebyla přístupná nepovolaným osobám a jiným než cílovým organismům.

Udržujte mimo dosah dětí.

Udržujte v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

Nepokládejte na povrchy a materiály, které mohou přijít do styku s potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci potravin nebo krmiv pro zvířata.

Zabraňte přístupu dětí, domácích a volně žijících zvířat.

Deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště umísťujte na místa chráněná před zaplavením.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště smí obsahovat pouze rodenticidy.

Doporučujeme nosit rukavice.

Neotevírejte sáčky.

Nepoškozujte kazety, ani pokud jsou prázdné.

Po použití si umyjte ruce.

Po ošetření odstraňte všechna deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště.

Při ošetření je nutné střídat produkt s jinými aktivními látkami, aby nedošlo ke vzniku rezistencí a křížových rezistencí k antikoagulantům.

Zaveďte opatření integrované ochrany proti škůdcům, která zahrnují chemické a fyzické prostředky a hygienické postupy. Kontrolujte účinnost produktu na stanovišti: v případě potřeby je nutné zjistit příčiny snížené účinnosti a odhalit výskyt rezistencí. Nepoužívejte produkt na místech, kde existuje podezření na rezistenci nebo kde byla rezistence prokázána. Uživatelé by měli držitelé registrace ihned oznámit jakékoli známky vznikající rezistence.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

V případě expozice ihned kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře a popište situaci (uvedte informace ze štítku a zhodnoťte míru expozice):

V případě vdechnutí:
Dýchejte čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu.

V případě kontaktu s pokožkou:
Odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

V případě kontaktu s očima:
Několik minut důkladně oplachujte proudem vody (pokud možno vlažné), přičemž držte oči otevřené.

V případě požití:
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte tuto nádobu nebo štítek. Nevyvolávejte zvracení. Bez ohledu na množství požitého produktu nejezte a nepijte. Umístěte postiženého do stabilní polohy a chraňte jej před poraněním v důsledku náhlých pohybů nebo křečí. Sledujte dech. Řiďte se pokyny lékaře.

Poznámka pro lékaře:
produkt obsahuje inhibitor nervového systému a látku vyvolávající křeče. K zablokování plic dochází rychle. Léčba je symptomatická, specifická protilátka neexistuje.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

--

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Mezi aplikacemi nečistěte deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště. Tento materiál a jeho obal musí být likvidován bezpečným způsobem. Nelikvidujte produkt uložením do životního prostředí nebo vypuštěním do kanalizace. Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště nechte zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu. Balení nesmí být opakovaně používáno ani recyklováno. Nespotřebovanou, nepoužitou a vyvrženou návnadu v okolí deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je nutné sebrat a nechat zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu.
--

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Produkt lze uchovávat a používat do 2 let od data výroby.

4.2 Popis použití

Použití 2 - Použití pro profesionály a širokou veřejnost

Typ přípravku	Typ přípravku 14 - Rodenticidy (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Přípravek ve formě pasty s obsahem účinné látky A-chloralosa (40 g/kg) aplikovaný do deratizačních staniček nebo na zakrytá nástražná stanoviště určený k hubení myši uvnitř obytných, průmyslových a komerčních budov včetně zemědělských budov v zamořených oblastech (podél stěn, oken...) za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů (např. historické budovy, technické objekty). Přípravek je určen pro profesionální a neprofesionální použití.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Mus musculus Obecný název: Myš domácí Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: Aplikace návnady Podrobný popis: Přípravek se aplikuje aplikovaný do deratizačních staniček nebo na zakrytá nástražná stanoviště do míst, kde se hlodavci aktivně pohybují. Použití ve vnitřních prostorách: Myši (silné zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 3 m.

Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Myši (slabé zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 5 m.

Míra aplikace: Myši, silné zamoření: od 5 g do 20 g produktu na deratizační krmítko nebo zakryté návnadné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními krmítky a zakrytými návnadnými stanovišti: 3 m. - Myši, slabé zamoření: od 5 g do 20 g produktu na deratizační krmítko nebo zakryté návnadné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními krmítky a zakrytými návnadnými stanovišti: 5 m.

Ředění (%):

Počet a načasování aplikace:

Použití ve vnitřních prostorách:

Myši (silné zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 3 m.

Myši (slabé zamoření): od 5 g do 20 g produktu na deratizační staničku nebo zakryté nástražné stanoviště. Vzdálenost mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti: 5 m.

Počet deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je určen velikostí ošetřované oblasti a mírou zamoření. Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště zkontrolujte a doplňte po několika dnech od první aplikace a poté jednou týdně, dokud dochází ke konzumaci nástrahy.

Kategorie uživatelů

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Neprofesionální a profesionální použití

Typ Materiál Velikost

Deratizační stanička PP nebo PS 5, 10, 20g

Krabice Papír, karton 80, 100, 120, 150, 160, 200, 300, 400, 500

a 1000 g

Kbelík Plast PP 1 kg

Přípravek je dodáván v následujících baleních:

- jednotlivé balíčky v papíru

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště lze použít uvnitř obytných, průmyslových a komerčních budov včetně zemědělských budov v zamořených oblastech (podél stěn, oken...).

Dávku nebo počet sáčků na deratizační staničku a zakryté nástražné stanoviště je nutno přizpůsobit účinné dávce. Počet deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je určen velikostí ošetřované oblasti a mírou zamoření.

Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti. Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště zkontrolujte a doplňte po několika dnech od první aplikace a poté jednou týdně, dokud dochází ke konzumaci nástrahy.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Na štítku produktu a na štítku sáčku musí být uvedeno varování „Neotevírejte sáček“. Na kazetách musí být uvedeno varování „Nepoškozujte kazety, ani prázdné“. Držitel oprávnění musí zajistit dostupnost neprůhledných a zabezpečených deratizačních staniček. Za zabezpečené deratizační staničky jsou považovány obaly, v nichž je návnada nepřístupná pro děti a jiné než cílové organismy.

Dále je nutné zajistit prostředky, které zabrání dětem v otevření obalu. Za zakrytá nástražná stanoviště jsou považována nástražná stanoviště, která poskytují stejnou úroveň ochrany osob a životního prostředí jako deratizační staničky a jsou upevněná, takže jimi nelze pohnout a nedojde k přímému kontaktu nástrahy s životním prostředím. Tato zařízení musí být zkonstruována tak, aby návnada nebyla přístupná nepovolaným osobám a jiným než cílovým organismům.

Udržujte mimo dosah dětí.

Udržujte v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

Nepokládejte na povrchy a materiály, které mohou přijít do styku s potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci potravin nebo krmiv pro zvířata.

Zabraňte přístupu dětí, domácích a volně žijících zvířat.

Deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště umísťujte na místa chráněná před zaplavením.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště smí obsahovat pouze rodenticidy.

Doporučujeme nosit rukavice.

Neotevírejte sáčky.

Nepoškozujte kazety, ani pokud jsou prázdné.

Po použití si umyjte ruce.

Po ošetření odstraňte všechna deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště.

Při ošetření je nutné střídát produkt s jinými aktivními látkami, aby nedošlo ke vzniku rezistencí a křížových rezistencí k antikoagulantům.

Zaveďte opatření integrované ochrany proti škůdcům, která zahrnují chemické a fyzické prostředky a hygienické postupy.

Kontrolujte účinnost produktu na stanovišti: v případě potřeby je nutné zjistit příčiny snížené účinnosti a odhalit výskyt rezistencí.

Nepoužívejte produkt na místech, kde existuje podezření na rezistenci nebo kde byla rezistence prokázána.

Uživatelé by měli držitelé registrace ihned oznámit jakékoli známky vznikající rezistence.

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

V případě expozice ihned kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře a popište situaci (uvedte informace ze štítku a zhodnoťte míru expozice):

V případě vdechnutí:

Dýchejte čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu.

V případě kontaktu s pokožkou:

Odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

V případě kontaktu s očima:

Několik minut důkladně oplachujte proudem vody (pokud možno vlažné), přičemž držte oči otevřené.

V případě požití:

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte tuto nádobu nebo štítek. Nevyvolávejte zvracení. Bez ohledu na množství požitého produktu nejezte a nepijte. Umístěte postiženého do stabilní polohy a chraňte jej před poraněním v důsledku náhlých pohybů nebo křečí. Sledujte dech. Řiďte se pokyny lékaře.

Poznámka pro lékaře:

produkt obsahuje inhibitor nervového systému a látku vyvolávající křeče. K zablokování plic dochází rychle. Léčba je symptomatická, specifická protilátka neexistuje.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Mezi aplikacemi nečistěte deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště.

Tento materiál a jeho obal musí být likvidován bezpečným způsobem.

Nelikvidujte produkt uložením do životního prostředí nebo vypuštěním do kanalizace.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště nechte zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu.

Balení nesmí být opakovaně používáno ani recyklováno.

Nespotřebovanou, nepoužitou a vyvrženou návnadu v okolí deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je nutné sebrat a nechat zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu.

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Produkt lze uchovávat a používat do 2 let od data výroby.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště lze použít uvnitř obytných, průmyslových a komerčních budov včetně zemědělských budov v zamořených oblastech (podél stěn, oken...). Dávku nebo počet sáčků na deratizační staničku a zakryté nástražné stanoviště je nutno přizpůsobit účinné dávce. Počet deratizačních staniček a zakrytých nástražných stanovišť je určen velikostí ošetřované oblasti a mírou zamoření. Je nutné dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými deratizačními staničkami a zakrytými nástražnými stanovišti.
Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště zkontrolujte a doplňte po několika dnech od první aplikace a poté jednou týdně, dokud dochází ke konzumaci nástrahy

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Na štítku produktu a na štítku sáčku musí být uvedeno varování „Neotevírejte sáček“. Na kazetách musí být uvedeno varování „Nepoškozujte kazety, ani prázdné“. Držitel oprávnění musí zajistit dostupnost neprůhledných a zabezpečených deratizačních staniček. Za zabezpečené deratizační staničky jsou považovány obaly, v nichž je návada nepřístupná pro děti a jiné než cílové organismy.

Dále je nutné zajistit prostředky, které zabrání dětem v otevření obalu. Za zakrytá nástražná stanoviště jsou považována nástražná stanoviště, která poskytují stejnou úroveň ochrany osob a životního prostředí jako deratizační staničky a jsou upevněná, takže jimi nelze pohnout a nedojde k přímému kontaktu nástrahy s životním prostředím. Tato zařízení musí být zkonstruována tak, aby návada nebyla přístupná nepovolaným osobám a jiným než cílovým organismům.

Udržujte mimo dosah dětí.

Udržujte v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

Nepokládejte na povrchy a materiály, které mohou přijít do styku s potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci potravin nebo krmiv pro zvířata.

Zabraňte přístupu dětí, domácích a volně žijících zvířat.

Deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště umísťujte na místa chráněná před zaplavením.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště smí obsahovat pouze rodenticidy.

Doporučujeme nosit rukavice.

Neotevírejte sáčky.

Nepoškozujte kazety, ani pokud jsou prázdné.

Po použití si umyjte ruce.

Po ošetření odstraňte všechna deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště.

Při ošetření je nutné sřítat produkt s jinými aktivními látkami, aby nedošlo ke vzniku rezistencí a křížových rezistencí k antikoagulantům.

Zaveďte opatření integrované ochrany proti škůdcům, která zahrnují chemické a fyzické prostředky a hygienické postupy.

Kontrolujte účinnost produktu na stanovišti: v případě potřeby je nutné zjistit příčiny snížené účinnosti a odhalit výskyt rezistencí.

Nepoužívejte produkt na místech, kde existuje podezření na rezistenci nebo kde byla rezistence prokázána.

Uživatelé by měli držitel registrace ihned oznámit jakékoli známky vznikající rezistence.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

V případě expozice ihned kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře a popište situaci (uvedte informace ze štítku a zhodnoťte míru expozice):

V případě vdechnutí:

Dýchejte čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu.

V případě kontaktu s pokožkou:

Odstraňte kontaminovaný oděv a omyjte pokožku mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla ani ředidla.

V případě kontaktu s očima:

Několik minut důkladně oplachujte proudem vody (pokud možno vlažné), přičemž držte oči otevřené.

V případě požití:

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte tuto nádobu nebo štítek. Nevyvolávejte zvracení. Bez ohledu na množství požitého produktu nejezte a nepijte. Umístěte postiženého do stabilní polohy a chraňte jej před poraněním v důsledku náhlých pohybů nebo křečí. Sledujte dech. Řiďte se pokyny lékaře.

Poznámka pro lékaře:

produkt obsahuje inhibitor nervového systému a látku vyvolávající křeče. K zablokování plic dochází rychle. Léčba je symptomatická, specifická protilátka neexistuje.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Mezi aplikacemi nečistěte deratizační staničky nebo zakrytá nástražná stanoviště.
Tento materiál a jeho obal musí být likvidován bezpečným způsobem.
Nelikvidujte produkt uložením do životního prostředí nebo vypuštěním do kanalizace.
Deratizační staničky a zakrytá nástražná stanoviště nechte zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu.
Balení nesmí být opakovaně používáno ani recyklováno.
Nespotebovanou, nepoužitou a vyvrženou návnada v okolí deratizačních staničkách a zakrytých nástražných stanovišť je nutné sebrat a nechat zlikvidovat ve sběrném středisku odpadu.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Produkt lze uchovávat a používat do 2 let od data výroby.

6. Další informace