

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Anti Mosquito

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0018558-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0018558-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	2
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	2
4. Povolené(á) použití	3
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	5
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Anti Mosquito
Mosquito Shield
Insect Stop
IR 35/10

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
	Adresa	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Německo
Číslo povolení	CZ-0018558-0000	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0018558-0000	
Datum udělení povolení	16/05/2017	
Datum skončení platnosti povolení	16/05/2027	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo
Umístění výrobních závodů	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo
	Elektronstraße 8 06749 Bitterfeld-Wolfen Německo

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck S.L.U.
Adresa výrobce	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Španělsko
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Španělsko
Účinná látka	1320 - Ethyl-butylacetylaminopropionát
Název výrobce	Merck KGaA
Adresa výrobce	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Německo
Umístění výrobních závodů	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Španělsko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Ethyl-butylacetylaminopropionát		účinná látka	52304-36-6	257-835-0	20
Etanol 96%	Ethanol		64-17-5	200-578-6	35

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Sprej, který odpuzuje komáry a klíšťata od lidské kůže (široká veřejnost)

Typ přípravku	Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Repelent
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Culicidae: Obecný název: Mosquitoes Vývojové stadium: Dospělci Hmyz, savci (například hlodavci) Latinský název: Ixodidae: Obecný název: Ticks Vývojové stadium: other:všechny
Oblast použití	Vnitřní Venkovní Používejte jen v dobře větraných místnostech a ve venkovních prostorách. Anti Mosquito je přípravek k okamžitému použití, který v mírném podnebí odpuzuje hmyz a chrání tak lidi před komáry a klíšťaty. Tento přípravek není určený k použití v tropických oblastech. Repelent aplikujte na kůži, výhradně na nechráněné části těla (jen na tvář, ruce, paže, nohy a chodidla).
Metoda(y) aplikace	Stříkání - Stříkejte přímo na obnaženou kůži a rukou rozetřete.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	dospělí: 3 g nebo asi 26 stříků; děti: 1,6 g nebo asi 14 stříků; batolata: 0,83 g nebo asi 7 stříků - Připraven k použití (není třeba ředit) -

Aplikujte velmi tenkou rovnoměrnou vrstvu na nechráněné části těla (jen na tvář, ruce, paže, nohy a chodidla).

Dávka na použití:

- dospělí: 3 g nebo asi 26 stříků
- Děti: 1,6 g nebo asi 14 stříků
- batole: 0,83 g nebo asi 7 stříků

Anti Mosquito je určen k použití v létě, kdy je hmyzu nejvíce. Obvykle se aplikuje jednou denně, v závislosti na venkovních aktivitách, počasí a přítomnosti hmyzu. Aplikaci lze opakovat v případě potřeby (výrazné snížení ochrany), pokud je to povoleno (viz pokyny na štítku). Sprej s pumpičkou lze aplikovat až 3krát denně u dospělých, až 2krát denně u dětí nad 2 roky a jednou denně u dětí mezi 1 a 2 roky. Tento přípravek lze používat jen u dětí starších 1 roku.

Kategorie uživatelů

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Láhev, plastová: HDPE, ≥ 25,0 - ≤ 750,0 mL

Láhev je uzavřena pumpičkou, která je chráněna krytkou.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Stříkejte přípravek přímo na obnaženou kůži a nanesenou kapalinu rukou rozetřete. Přípravek nanášejte POUZE na obnažené části těla a to výhradně na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář.

Přípravek nestříkejte přímo na tvář. Pokud chcete přípravek nanést na tvář, nastříkejte roztok repelentu do dlaně a rozetřete roztok po pleti, dávejte při tom pozor, abyste nezasáhli oči. Nestříkejte přípravek do očí ani na oční okolí.

U dětí pod 11 let by měli přípravek aplikovat dospělí.

Neaplikujte na dětské ruce.

Neaplikujte přes řezné rány, poranění, nebo čerstvě oholenou či podrážděnou pokožku. Neaplikujte pod oblečení. Jen pro vnější použití.

Repelent je nutné v případě silného pocení nebo po plavání aplikovat znovu. Pokud si všimnete výrazného snížení ochrany, pak můžete přípravek nejdříve po osmi hodinách po první aplikaci použít znovu.

Při opakované aplikaci dodržujte maximální denní povolený počet aplikací: třikrát denně u dospělých, dvakrát denně u dětí nad 2 roky a jednou denně u dětí mezi 1 a 2 roky.

Tento přípravek lze používat u dětí starších 1 roku.

Při používání těchto přípravků u dětí je nutné být na pozoru. Používejte tyto přípravky s rozvahou.

Mechanická ochrana (oblečení, síť proti komárům) je vždy lepší volbou.

Vyhnete se kontaktu se syntetickými materiály. Syntetické materiály by se měly při aplikaci chránit.

Aplikací přípravků nebo kosmetiky se sluneční ochranou po použití repelentu se účinnost repelentu značně sníží.

Tento přípravek není určený k použití u zvířat/domácích mazlíčků.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Repelent používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o přípravku. Vhodné k použití jen u dětí starších 1 roku.

Udržujte mimo dosah dětí.
Zabraňte vdechnutí přípravku. Přípravek nestříkejte přímo na tvář.
Používejte jen venku nebo v dobře odvětrávaných prostorách.
Přípravek nanášejte POUZE na paže, ruce, nohy, chodidla a tvář.
Neaplikujte pod oblečení.
Mechanická ochrana (oblečení, sítě proti komárům) je vždy lepší volbou. Jen pro vnější použití. Používejte pouze podle pokynů.
Pokud je ošetření neúčinné, pak by uživatelé měli informovat přímo držitele registrace.

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Způsobuje vážné podráždění očí.
Po vdechnutí: čerstvý vzduch.
V případě zasažení očí: vypláchněte velkým množstvím vody. Zavolejte očního lékaře.
V případě spolknutí: okamžitě dejte postiženému napít vodu (nanejvýš dvě sklenice). Konzultujte lékaře.
Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní a zpožděné: dráždivé účinky
Indikace nutného okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Žádné informace nejsou k dispozici
Osobní bezpečnostní opatření, ochranné pomůcky a nouzové postupy
Informace pro nepohotovostní personál: Zabraňte vdechnutí výparů a aerosolů. Zabraňte kontaktu s látkou. Zajistěte dostatečnou ventilaci. Vyklidte nebezpečnou oblast, dodržujte nouzové postupy a poradte se s profesionálem.
Opatření na ochranu životního prostředí: Nevypouštějte nadbytečné kapaliny do odtoku.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Odpadní materiál musí být likvidován v souladu se směrnicí o odpadech 2008/98/ES, jakož i s dalšími národními a místními předpisy. Chemikálie ponechte v původních obalech. Nevyhazujte společně s dalším odpadem.
Nevypouštějte nadbytečné kapaliny do odtoku.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Podmínky skladování:
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.
Tento přípravek by neměl být dlouhodobě skladován při teplotách >40 °C.
Skladovatelnost: 18 měsíců
Pokyny pro bezpečné zacházení: Dodržujte pokyny na štítku. Uchovávejte mimo dosah ohně, horkých povrchů a zdrojů vznícení.
Proveďte preventivní opatření proti statickému výboji.
Správa vystavení životnímu prostředí: Nedovolte, aby přípravek vnikl do odtoku.

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

Viz návod k použití pro konkrétní použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Viz opatření ke zmírnění rizika pro konkrétní použití.

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Viz specifické údaje o použití.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz specifické pokyny k použití

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Viz specifické podmínky k použití

6. Další informace