

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

ACTIBLOCK-BROD

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0018495-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0018495-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	NEO ACTIBLOCK-BROD
--------------	--------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Activa s.r.l.
	Naslov	via Feltre, 32 20132 Milano Italija
Številka dovoljenja		SI-0018495-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0018495-0000
Datum dovoljenja		26/01/2018
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2026

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Activa s.r.l.
Naslov proizvajalca	via Feltre, 32, 20132 Milano, Italija
Kraj proizvodnih obratov	Colkim s.r.l., via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO), Italija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Brodifacoum
Ime proizvajalca	Activa S.r.l.
Naslov proizvajalca	via Feltre, 32, 20132 Milano, Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza S.r.l., via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR), Italija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H373: Lahko škoduje organom (srčno-žilni sistem) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.
Previdnostni stavki	P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite doctor. P308 + P313: PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško advice. P501: Odstraniti contents v skladu z nacionalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Hišne miši – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 - 40 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Od 1,5 kg do 25 kg (vsebujejo parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 2-3 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sproti odstranjevati. Po končanem tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitene pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Podgane – poklicni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
-----------------	--

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Od 1,5 kg do 25 kg (vsebuje parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrдите postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sproti odstranjevati. Po končanem tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitene pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Hišne miši in/ali podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Hišne miši: 20 - 40 g vabe na postajo; Rjave podgane: 100 - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Od 1,5 kg do 25 kg (vsebuje parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg). Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena vodi.

Postaje pregledujte pri miših na 2-3 dni, pri podganah na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poškodovano vabo zamenjajte s svežo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrдите postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sproti odstranjevati. Po končanem tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitene pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Hišne miši – splošni uporabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 20 - 40 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 300 g (vsebuje parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 2-3 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.4.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekli ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sprti odstranjevati. Po končanem tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.4.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitenega pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Podgane – splošni upodabniki – notranji prostori

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih

Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 - 200 g vabe na postajo Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 300 g (vsebuje parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Postaje pregledujte najmanj enkrat na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.5.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sproti odstranjevati. Po končanem tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.5.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitene pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Podgane – splošni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni relevantno za rodenticide.
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: drugo: Juveniles to adults
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah za nastavljanje vab, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 - 200 g vabe na postajo

	Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Če je potrebnih več postaj za nastavljanje vab, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	Do 300 g (vsebuje parafinske bloke mase 10-20 g). Embalaža: PE / aluminij / poliester

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg). Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena vodi.

Postaje pregledujte na 5-7 dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta ali ne. Po potrebi postaje ponovno napolnite vabo. Poškodovano vabo zamenjajte s svežo. Poginule glodavce varno odstranite.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.6.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrдите postaje na tla ali stene. Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč:

Vdihavanje: Prizadeto osebo umaknite iz kontaminiranega območja na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo: Odstranite vso umazano obleko. Kožo temeljito umijte z milom in vodo. Če se pojavijo simptomi, se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi: Odstranite kontaktne leče. S palcem in kazalcem razprite očesni vekci ter oko temeljito izperite s čisto vodo. Če draženje ne mine, se posvetujte z zdravnikom ali okulistom.

Zaužitje: Takoj se posvetujte z zdravnikom. Posredujte mu navedbe z etikete. Prizadetemu izperite usta z vodo. Ne izzivajte bruhanja, razen če tako svetuje zdravnik.

Najpomembnejši učinki in znaki zastrupitve: Proizvod je antikoagulacijski rodenticid. Pri zastrupitvi pride do motenj strjevanja krvi in povečane nagnjenosti h krvavenju. Pri hudi zastrupitvi lahko močne krvavitve povzročijo odpoved krvnega obtoka in posledično smrt. Simptomi lahko nastopijo z zakasnitvijo nekaj dni. Protistrup je vitamin K1, ki se daje pod zdravniškim nadzorom.

Varstvo okolja:

Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se **prepričajte**, da vaba ne more priti v stik z vodo. Mrtve glodalce je treba sproti odstranjevati. Po **končanem** tretiranju morate preostale vabe skrbno zbrati in odstraniti na varen način.

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Ostankov vabe ne smete odmetavati v kanalizacijo in na komunalna odlagališča. Pripravek je strupen za toplokrvne živali, zato ostankov ne smete odlagati v okolje.

4.6.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Biocidni proizvod je potrebno hraniti v originalni embalaži, nedostopnega otrokom, v prostoru, ki ni namenjen skladiščenju hrane, pijače in živalske krme, ter zaščitenega pred mrazom, toploto, svetlobo in vlago. Rok uporabe in skladiščenja je 2 leti od datuma proizvodnje.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Poklicni uporabniki:

Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.

Pred nastavljanjem vab opravite pregled prizadetega območja. Opredelite vrsto glodavcev, mesta aktivnosti in določite verjeten razlog ter obseg napada škodljivcev. Odstranite hrano, ki je glodavcem na voljo (npr. razsuto zrnje, odpadki hrane). Pred nastavljanjem vab napadenega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.

Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora. Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje vab in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

Postaje z vabami postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene. Postaje morajo biti jasno označene, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati.

Kadar uporabljate proizvod na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena. V bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo ukrepov v primeru zastrupitve.

Postaje namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali, izven dosega hrane, pijače in krme za živali, in tudi izven dosega pripomočkov ali površin, s katerimi so sicer v stiku.

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi. Po uporabi si umijte roke in druge izpostavljene dele telesa.

Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi proizvoda. Če se uživanje vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je potrebno ugotoviti verjeten razlog. Če obstaja verjetnost, da so glodavci na vabo odporni, uporabite močnejši antikoagulacijski rodenticid ali rodenticid, ki ni antikoagulacijski. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativnem ukrepu nadzora.

Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo in postaje za nastavljanje vab.

Splošni uporabniki:

Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.

Odstranite hrano, ki je glodavcem na voljo (npr. razsuto zrnje, odpadki hrane). Pred nastavljanjem vab napadenega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.

Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je ste opazili aktivnost glodavcev, npr. na poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd. Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali stene. Namestite jih zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali, izven dosega hrane, pijače in krme za živali, in tudi izven dosega pripomočkov ali površin, s katerimi so sicer v stiku. Postaj ne nameščajte blizu sistemov za odtok vode, kjer bi lahko prišle v stik z vodo.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Poklicni uporabniki:

Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev, v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo.

Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve odstranjujte poginule glodavce najmanj dvakrat tedensko v obdobju tretiranja. Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.

Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda. Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:

- proizvod ni na voljo za splošno uporabo, temveč samo za poklicne uporabnike;
- se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.

Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: »Ne premikajte in ne odpirajte.«; »Vsebuje rodenticid.«; »ime proizvoda in številka dovoljenja«; »naziv in vsebnost aktivne snovi« in »V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.«

V bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo ukrepov v primeru zastrupitve.

Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.

Splošni uporabniki:

Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

Antikoagulacijskih rodenticidov ne uporabljajte kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve odstranjujte poginule glodavce najmanj dvakrat tedensko v obdobju tretiranja. Poginule glodavce zapakirajte v dvojno plastično vrečko in odstranite kot komunalni odpadek.

Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) povprašati za nasvet dobavitelja proizvoda.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu. Antidot je vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.

V primeru stika s kožo umijte kožo z vodo in milom.

V primeru stika z očmi oči najmanj 10 minut spirajte s tekočino za izpiranje oči ali z vodo.

V primeru oralne izpostavljenosti usta previdno izperite z vodo. Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja.

V primeru zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.

Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi, stran od direktne sončne svetlobe. Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od 4 do 10 dni po zaužitju vabe.

Glodavci so lahko prenašalci bolezni.

Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.

Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.