

**RO**

**ANEXĂ**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

FERPASTA BRODI 25

**Tip(uri) de produs**

TP 14: Rodenticide

**Numărul autorizației:** RO/2022/0329/MRS/ IT/2018/00480/AUT

**Numărul deciziei de reglementare R4BP:** RO-0029389-0000

## Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

### 1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	FERPASTA BRODI 25 APTIRAT PASTA BRODIFAST PASTA ENDERAT PASTA FIGHTER PASTA IKURAT PASTA BROM ESCA NEW STARKORAT PASTA XTREME RAT PASTA
--------------------------------	---

### 1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	FERBI S.r.l.
	Adresă	I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italia
Numărul autorizației		RO/2022/0329/MRS/ IT/2018/00480/AUT
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0029389-0000
Data autorizației		05/02/2014
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

### 1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	FERBI S.r.l.
Adresa producătorului	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia
Adresa locurilor de producție	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia

### 1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Brodifacoum
Denumirea producătorului	Activa S.rl
Adresa producătorului	via Feltre 32 20132 milano Italia
Adresa locurilor de producție	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italia

---

## Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

### 2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromofenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naphtyl]-4-hidroxicoumarin	substanță activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (de greutate)

### 2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

---

### Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor sanguine în caz de expunere prelungită sau repetată {1:indica#i ca lea de expunere, dacă există probe concludente că nici o altă cale de expunere nu provoacă acest pericol:}.
Fraze de precau#ie	P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHI#IRE: Suna#i imediat la un suna#i imediat la un CENTRU DE INFORMAR E TOXICOLOGICĂ/un medic/...  P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical ad vice/attention.  P501: Arunca#i conținutul la în conformitate cu regle mentările na#ionale #i interna#ionale.

## Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

### 4.1. Descrierea utilizării

**Tabel 1. Șoareci de casă – profesional – interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu se aplică pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Mus musculus</i> Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 20 g - 40 g momeală pasta per capcană. Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Formularea momelii: 10 - 20 g plicuri de hârtie filtrată. Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, gălele, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate. Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat. Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

#### 4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se verifică la fiecare 2 - 3 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndalătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar

#### 4.1.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

#### 4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Șobolani- profesional - interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu se aplică pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g per capcană. Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Formularea momelii: 20 g plicuri de hârtie filtrată. Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

	<p>Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.</p> <p>Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.</p>
--	--

#### 4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndalătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### 4.2.2. Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Când amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

#### 4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

#### 4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

### 4.3. Descrierea utilizării

**Tabel 3. Șoareci de casă și șobolani - profesional - exterior, în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>Denumirea științifică: <i>Mus musculus</i> Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți</p> <p>Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți</p>

Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: #oarecele de casă: 20 – 40 g momeală pastă per capcană #obolanul maro: 100 g - 200 g momeală pastă per capcană Diluare (%): 0,0025 Numărul și calendarul de aplicare: Capcanele ar trebui vizitate [pentru #oareci - la cel puțin 2 - 3 zile] [pentru #obolani - numai după 5 - 7 zile după] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momelile sunt acceptate și dacă capcanele sunt intacte și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Re-umpleți cu momeli de câte ori este necesar.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Formularea momelii: 10 - 20 g plicuri de hârtie filtrată. Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate. Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat. Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

#### 4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de intemperii (ex. ploaie, zăpadă, etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Capcanele se inspectează cel puțin (pentru #oareci) la fiecare 2- 3 zile, (pentru #obilani) la fiecare 5-7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.
- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu mizerie.



#### 4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu introduce#i produsul direct în vizuini.

#### 4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când amplasa#i capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei (ex. râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de iriga#ie) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigura#i-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

#### 4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

#### 4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

#### 4.4. Descrierea utilizării

**Tabel 4. Șoareci de casă – populație – interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: house mouse Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adul#i
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: 20 – 40 g momeală pastă per capcană Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distan#a minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioni#ti)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă). Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, gălele, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate. Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.
--	---

#### 4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează cel puțin la fiecare 2- 3 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### 4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

#### 4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

#### 4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

#### 4.5. Descrierea utilizării

**Tabel 5. Șobolani –Populație – interior**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adulți
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g per capcană Numărul și calendarul de aplicare:

	Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distan#a minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioni#ti)
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Până la 150 g (con#ine momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).  Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găle#i, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.  Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

#### 4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului #i apoi cel pu#in săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată #i dacă se men#ine integritatea capcanelor, precum #i pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umple#i cu momeală când este necesar.

#### 4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

#### 4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

#### 4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

#### 4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

#### 4.6. Descrierea utilizării

**Tabel 6. Șobolani – profesional și populație – în jurul clădirilor**

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea știintifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: brown rat Etapă de dezvoltare: altele: de la tineri la adul#i
Domeniul (domeniile) de utilizare	altele: Other

	În jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și deteriorării.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 100 g - 200 g momeală sub formă de pastă per capcană Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Dacă sunt necesare mai multe capcane, atunci distanța minimă dintre acestea ar trebui să fie 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă). Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, gălele, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate. Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

#### 4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

- Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Înlocuiți momelile deteriorate de apă sau contaminate cu mizerie
- Capcanele se inspectează după fiecare 5 - 7 zile de la începerea tratamentului și apoi cel puțin săptămânal pentru a verifica dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a înlătura rozătoarele prinse. Re-umpleți cu momeală când este necesar.

#### 4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Pentru uz profesional, în jurul clădirilor. Nu introduceți produsul direct în vizuini.

#### 4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Pentru uz profesional: când amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei (ex. râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigație) sau a sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

---

**4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

**4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

---

## Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE<sup>1</sup>

### 5.1. Instrucțiuni de utilizare

Uz profesional:

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare

- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate ale acestora și pentru a determina cauzele posibile și amploarea infestării.

- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem de combatere integrată a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și atunci când este posibil, metode fizice de combatere.

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventivă (ex. astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum al produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.

- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu avertismente clare privind informațiile înscrise la punctul 5.3 de pe etichetă.

- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate pe toată perioada tratamentului, iar în apropierea momelii trebuie să se amplaseze avertismenteprivind riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsurile de prim-ajutor, care se iau în caz de intoxicare.

- Momeala trebuie să fie fixată pentru a nu putea fi îndepărtată de capcană.

- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale neavizate.

- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafețe cu care ar putea intra în contact.

---

<sup>1</sup>Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

---

- În timpul manipulării produsului, nu mâncați, beți sau fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.

- Dacă asimilarea momelii este redusă comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare mutarea capcanelor în alte locuri și eventual o nouă schimbare a formulei momelii.

- Dacă după 35 zile după tratament momeala continuă să fie consumată și nu se observă o diminuare a activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza posibilă. Dacă s-au exclus alte cauze, este posibil ca rozătoarele să aibă un grad înalt de rezistență, astfel încât poate fi necesară utilizarea unui rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare și utilizarea de curse-capcane, ca și măsură de combatere alternativă.

- Îndepărtați momeala rămasă la finalul tratamentului.

Uz - Populație:

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt furnizate la vânzare

- Înainte de a folosi produse rodenticide, ar trebui să luați în considerare și utilizarea unor metode non-chimice (ex. curse)

- Îndepărtați hrana la care rozătoarele pot ajunge ușor (ex. boabe de cereale sau resturi de mâncare)). Pe lângă acestea, nu curățați zona infestată imediat înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.

- Purtați mănuși de protecție (cauciuc) rezistente la substanțele chimice în timpul manipulării produsului.

- Frecvența vizitelor în zona tratată rămâne la discreția operatorului, în funcție de rezultatele studiului efectuat la începutul perioadei de tratament. Această frecvență trebuie să fie conformă cu recomandările cuprinse în codul de bune practici.

- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care s-au observat prezența rozătoarelor (ex. căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire, găuri, vizuini, etc).

- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate pe sol sau pe alte structuri.

- Amplasați produsul la distanță de îndemâna copiilor, păsări, animale de companie sau alte specii de animale neavizate.

- Amplasați produsul la distanță de alimente, băuturi și alte lucruri pentru animale, ustensile sau suprafețe cu care ar putea intra în contact.

- 
- Nu amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde ar putea intra în contact cu apa.
  - În timpul manipulării produsului, nu mâncați, beți sau fumați. Spălați-vă mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului.
  - Îndepărtați momeala rămasă la finalul tratamentului.

## 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Uz profesional:

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele (utilizatorii zonei tratate și împrejurimile acestora) care s-ar putea afla în preajma capcanelor ce au legătură cu campania de combatere a rozătoarelor (dacă e cazul).
- Pentru a reduce riscul de intoxicație secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe perioada tratamentului (ex. cel puțin de două ori pe săptămână). [Dacă este relevant, specificați dacă este necesară o inspecție mai frecventă sau zilnică]
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 zile fără o evaluare a stării de infestare a eficacității tratamentului.
- Nu utilizați momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau monitorizarea activităților rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (adică eticheta și / sau prospectul) trebuie să arate clar că:
  - produsul nu va fi furnizat publicului larg (de ex. „numai pentru uz profesional”). produsul trebuie utilizat în stadii de momeli adecvate, rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în stadii de momeli rezistente la manipulare”) utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător stadiile de momeală cu informațiile menționate în secțiunea 5.3 din RCP (de exemplu, eticheta și stadiile de momeală conform recomandărilor produsului ”).
  - Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informațiile despre produs (ex. eticheta și / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfârșitul tratamentului (dacă se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control împotriva dăunătorilor.
- Nu spălați stadiile de momeală cu apă între aplicații.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.



---

Uz- Popula#ie:

- Analiza#i posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (ex. astupa#i găurile, îndepărta#i cât mai mult posibil eventualele surse de hrană #i băutură) pentru a cre#te #ansa de consum al produsului #i pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Nu utiliza#i prin rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (ex. pentru preven#ia inefestării cu rozătoare sau pentru a detecta activitatea rozătoarelor) .
- Informa#iile despre produs (ex. eticheta #i / sau prospectul) trebuie să arate în mod clar că:
- produsul trebuie utilizat în sta#ii de momeli adecvate rezistente la manipulare (de exemplu, „se utilizează numai în sta#iile de momeală rezistente la manipulare”).
- utilizatorii trebuie să eticheteze în mod corespunzător sta#iile de momeală cu informa#iile men#ionate în sec#iunea 5.3 din RCP (de exemplu, „eticheta#i sta#iile de momeală conform recomandărilor produsului”).
- utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile. Informa#iile despre produs (ex. eticheta #i / sau prospectul) recomandă în mod clar că, în cazul lipsei de eficacitate suspectată până la sfâr#itul tratamentului (adică se mai observă activitatea rozătoarelor), utilizatorul trebuie să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze un serviciu de control pentru combaterea dăunătorilor.
- Căuta#i #i elimina#i rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel pu#in atât de des cât sunt inspectate sta#iile de momeală.
- Elimina#i rozătoarele moarte conform cu cerin#ele locale.

### **5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Pentru uz profesional si popula#ie:

Acest produs con#ine o substan#ă anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot să includă sângerări nazale #i gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze pe suprafa#a pielii #i sânge în fecale sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/ veterinar.

- În caz de:

- Expunere cutanată, spăla#i pielea cu apă, apoi cu apă #i săpun.

---

- Expunere oculară, clătiți ochii cu lichid de uz ocular, țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

- Expunere orală, clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat dacă produsul a fost înghițit de vreun animal.

- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: “a nu se muta sau deschide”, “conține rodenticid”, “denumirea produsului sau numărul autorizației”, “substanța activă” și “în caz de incident, sunați la un centru de informare toxicologică”.

- Periculos pentru animalele sălbatice.

#### **5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

La sfârșitul perioadei de tratament, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

#### **5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare**

Depozitați în locuri uscate, răcoroase și bine ventilate. Păstrați ambalajele închise departe de razele soarelui.

Depozitați în locuri unde nu au acces copiii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.

Termen de valabilitate: 2 ani

---

## **Cap. 6. ALTE INFORMAȚII**

Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4 la 10 zile de la consumul momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși sau instrumente, ca și clești, atunci când le îndepărtați.

Acest produs conține un agent amar și colorant.