



Bratislava, 16. mája 2022
Naša značka: 40026/2022-4320-65283
Ref. číslo: bio/1463/O/22/RB

ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd., Szállás u. 6., H-1107 Budapešť, Maďarsko** identifikačné číslo BC-BC070515-60 o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku, podanej podľa článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **11. októbra 2021** v súlade s článkom 33 ods. 3 nariadenia o biocídnych výrobkoch v spojení s článkom 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 492/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznananiu (ďalej len „nariadenie o obnovách“) a s článkom 52 nariadenia o biocídnych výrobkoch rozhodlo tak, že

**a u t o r i z u j e b i o c í d n y v ý r o b o k
na základe postupného vzájomného uznania**

Názov biocídneho výrobku:

Biopren 4 GR PLUS Larvicide granule

Číslo autorizácie biocídneho výrobku: **SK22-007**

Platnosť autorizácie do:

31. januára 2030

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu autorizácie biocídneho výrobku č. NL-0022257-0000 platnej do 31. januára 2030 a udelenej príslušným orgánom referenčného členského štátu Holandsko dňa 21. februára 2020;

a pre prípad, keď nebude predložená žiadosť o obnova tejto autorizácie v lehote podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch a/alebo nariadenia o obnovách poskytuje dodatočnú lehotu na sprístupnenie existujúcich zásob tohto biocídneho výrobku na trhu do 20. júla 2030 a ďalšiu lehotu na jeho použitie do 6. januára 2031 v súlade s príslušnou legislatívou.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd., Szállás u. 6., H-1107 Budapešť, Maďarsko doručením žiadosti identifikačné číslo BC-BC070515-60 zo dňa 11. októbra 2021 prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (ďalej len „R4BP“) v zmysle čl. 71 nariadenia o biocídnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku č. NL-0022257-0000 udelenej rozhodnutím o autorizácii platnej do 31. januára 2030 príslušným orgánom referenčného členského štátu Holandsko dňa 21. februára 2020.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadost o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o biocídnych výrobkoch. Vykonaním hodnotenia biocídneho výrobku MH SR dospelo k záveru, že biocídny výrobok definovaný v predloženom zhrnutí charakteristík biocídneho výrobku spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocídny výrobok môže sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizáciách biocídnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristik biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokial ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

Poučenie:

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznamenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznamenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.

generálny riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Bábola Bioenvironmental Centre Ltd., Szállás u. 6., H-1107 Budapešť, Maďarsko

Príloha 1

Bratislava, 16. mája 2022
Naša značka: 40026/2022-4320-65283
Ref. číslo: bio/1463/O/22/RB

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Názov výrobku | Biopren 4 GR PLUS Larvicide granule |
| Obchodné názvy výrobku | Biopren 4 GR PLUS |

1.2. Držiteľ autorizácie

| | | |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Názov a adresa držiteľa autorizácie | Názov | Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. |
| | Adresa | Szállás u. 6., H-1107, Budapešť, Maďarsko |
| Číslo autorizácie | SK22-007 | |
| R4BP žiadosť o autorizáciu č. | BC-BC070515-60 | |
| Dátum autorizácie | 16. mája 2022 | |
| Dátum skončenia platnosti autorizácie | 31. januára 2030 | |

1.3. Výrobcu výrobku

| | |
|-----------------------------|---|
| Názov výrobcu | Babolna Bio Ltd |
| Adresa výrobcu | Szállás utca 6, 1107 Budapešť, Maďarsko |
| Miesto výrobných priestorov | Köves J. u 1, 2943 Bábolna, Maďarsko |

1.4. Výrobca účinnej látky

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Účinná látka | S-metoprén |
| Názov výrobcu | Babolna Bio Ltd |
| Adresa výrobcu | Szállás u. 6, 1107 Budapešť, Maďarsko |
| Miesto výrobných priestorov | Szállás u 6, 1107 Budapešť, Maďarsko |

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|-------------|---|--------------|------------|----|-----------|
| S-metoprén | Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate | Účinná látka | 65733-16-6 | | 0,421 |

2.2. Typ úpravy

GR - Granuly

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

| | |
|--------------------------|--|
| Výstražné upozornenia | H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje polyetylénglykol 15-hydroxystearát. Môže vyvoláť alergickú reakciu. |
| Bezpečnostné upozornenia | P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu |

| | |
|--|--|
| | výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. |
|--|--|

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Larvy múch – široká verejnosť a profesionálni používateľia

| | |
|---|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Insekticíd |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií) | <p>Vedecký názov: Musca domestica Bežný názov: Mucha domáca Vývojové štadium: larvy</p> <p>Vedecký názov: Stomoxys calcitrans Bežný názov: Bodavka stajňová Vývojové štadium: larvy</p> <p>Vedecký názov: Eristalis tenax Bežný názov: Pestrica trúdovitá Vývojové štadium: larvy</p> |
| Oblasti použitia | <p>Vnútorné Vonkajšie Vnútorné: hnoj/podstielka v uzavretých ošipárňach, kravínoch a hydinárňach, ako aj v stajniach a iných budovách na chov dobytku.</p> <p>Exteriér: hnojisko, ktoré je nepriepustné a zaizolované.</p> |
| Spôsob aplikácie | <p>Spôsob: Rozsypanie</p> <p>Detailný opis:</p> <p>Výrobok je potrebné rovnomerne rozsypať po povrchu hnoja ručne, pomocou odmerky alebo vhodného zariadenia, napr. ručného aplikátora granulátu podľa nasledujúcich pokynov:</p> |
| Dávkovanie a frekvencia | <p>Aplikačná dávka: 30 g/m²</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie:</p> <p>Ošipárne, stajne pre dobytok:</p> <p>- roštová podlaha: Aplikujte na 3. deň po ustajnení nového dobytka. Ošetrite celý povrch hnoja/podstielky. Po každom vyhádzaní hnoja je potrebné ošetrenie zopakovať.</p> <p>- hlboká podstielka: Aplikujte na každú novú vrstvu podstielky a ošetrenie zopakujte po každom zväčšení vrstvy o 8 – 10 cm.</p> <p>Hydinárske farmy:</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>- klietka: Ošetríte nahromadený hnoj (každú 10 cm vrstvu) pod klietkami.</p> <p>- hlboká podstielka: Aplikujte na každú novú vrstvu podstielky a ošetrenie zopakujte po každom zväčšení vrstvy o 10 cm.</p> <p>V prípade veľmi suchých substrátov (napr. podstielka sliepok) môže účinok výrobku nastupovať pomalšie. Pridanie 100 – 200 ml vody/m² do substrátu urýchli nástup larvicídneho účinku v prípade veľmi suchých podmienok prostredia.</p> <p>Hnoj skladovaný vonku:</p> <p>mal by sa ošetrovať iba vtedy, ak je umiestnený v hnojisku, ktoré je nepriepustné, zaizolované a zodpovedá ostatným požiadavkám na bezpečné skladovanie hnoja. Pri ošetrovaní hnoja uskladneného vonku aplikujte výrobok v dávke 30 g/m².</p> <p>Ošetrenie hnoja larvicídom ukončíte najmenej dva mesiace pred rozhádzaním/zapracovaním hnoja na poliach.</p> <p>Výrobok môže inhibovať vývoj múch na obdobie až 12 týždňov po ošetrení, za predpokladu, že budú dodržané vyššie uvedené pokyny na aplikáciu. Maximálny počet ročných aplikácií je šest.</p> |
| Kategórie používateľov | <p>Vyškolený profesionál Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne)</p> |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | <p>Profesionálne použitie:</p> <p>10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg papierové vrecko s vnútornou vrstvou z LDPE 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg vrecko/vrece z PP alebo HDPE 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g kartónová škatuľa s vnútornou vrstvou z LDPE 0,5 kg, 0,75 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg vedro z PP alebo HDPE 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g škatuľa alebo vrecko z PP alebo HDPE</p> <p>Široká verejnosť:</p> <p>100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g kartónová škatuľa s vnútornou vrstvou z LDPE 0,5 kg, 0,75 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg vedro z PP alebo HDPE 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g škatuľa alebo fľaša z PP alebo HDPE</p> |

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Larvy potemníka stajňového – široká verejnosť a odborníci

| | |
|---|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | Insekticíd |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií) | Vedecký názov: Alphitobius diaperinus Bežný názov: Potemník stajňový Vývojové štadium: larvy |
| Oblasti použitia | Vnútorné Vonkajšie Vnútorné: hnoj v uzavretých hydinárňach Vonkajšie: jama na hydinový hnoj, ktorá je nepriepustná a zaizolovaná |
| Spôsob aplikácie | Spôsob: Rozsypanie Detailný opis: Výrobok je potrebné rovnomerne rozsypať po povrchu hnoja ručne pomocou odmerky alebo vhodného zariadenia, napr. ručného aplikátora granulátu podľa nasledujúcich pokynov: |
| Dávkovanie a frekvencia | Aplikačná dávka: 30 g/m ² Počet a časový rozvrh aplikácie: Hydinárske farmy: - klietka: Ošetríte nahromadený hnoj (každú 10 cm vrstvu) pod klietkami. - hlboká podstielka: Aplikujte na každú novú vrstvu podstielky a ošetrenie zopakujte po každom zväčšení vrstvy o 10 cm. Len pre širokú verejnosť, neprofesionálnych používateľov: Výrobok aplikujte po každom čistení navrch prvej novej vrstvy hnoja/čerstvej podstielky. V prípade veľmi suchých substrátov (napr. podstielka sliepok) môže účinok výrobku nastupovať pomalšie. Pridanie 100 – 200 ml vody/m ² do substrátu urýchli nástup larvicídneho účinku v prípade veľmi suchých podmienok prostredia. Výrobok môže inhibovať vývoj potemníka stajňového na obdobie až 12 týždňov po ošetrení, za predpokladu, že budú dodržané vyššie uvedené pokyny na aplikáciu. Maximálny počet ročných aplikácií je šest. |
| Kategórie používateľov | Vyškolený profesionál Profesionálne Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Profesionálne použitie: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg papierové vrecko s vnútornou vrstvou z LDPE 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg vrecko/vrece z PP alebo HDPE 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g, 1500 g, 2000 g kartónová škatuľa s vnútornou vrstvou z LDPE 0,5 kg, 0,75 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg vedro z PP alebo HDPE |

| | |
|--|---|
| | 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g škatuľa alebo vrecko z PP alebo HDPE Široká verejnosť: 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g, 1500, 2000 g kartónová škatuľa s vnútornou vrstvou z LDPE 0,5 kg, 0,75 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg vedro z PP alebo HDPE 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1000 g škatuľa alebo fľaša z PP alebo HDPE |
|--|---|

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Vždy si prečítajte etiketu alebo sprievodný leták pred použitím a dodržiavajte uvedené pokyny.

Nepoužívajte výrobok nepretržite.

Pri aplikácii výrobku zohľadňujte vývojový cyklus a charakteristiku druhov cieľového hmyzu. Predovšetkým dávajte pozor, aby ste sa zamerali na najvhodnejšiu vývojovú fázu škodcu, a dbajte na vhodné časovanie aplikácie na mieste použitia výrobku.

Aplikujte integrované spôsoby ničenia škodcov, ako napr. kombináciu chemického a manuálneho spôsobu ochrany proti škodcom a uplatnenie iných hygienických opatrení, pri zohľadnení miestnych špecifík (klimatické pomery, cieľové organizmy, podmienky použitia, a pod.).

Striedajte tento výrobok s výrobkami obsahujúcimi účinné látky s odlišným mechanizmom účinku (na odstránenie rezistentných jedincov z populácie).

Dôležité je, aby ste do 3 dní po zavedení nových hospodárskych zvierat rozsypali granuly na povrch trusu, potom vždy po vzniku ďalšej 10 cm vrstvy hnoja aplikujte výrobok znova. Granuly rozsýajte rovnomerne na povrch zostatkov trusu, a to zakaždým po odstránení hnoja. Výrobok rozsypate na povrch trusu pomocou odmerného pohára, alebo vhodného nástroja, napr. pomocou ručného rozmetača granúl, podľa nižšie uvedených pokynov:

V prípade hospodárstva s chovom ošípaných a hovädzieho dobytka:

V prípade chovu na roštovej podlahe: Výrobok aplikujte na 3. deň po zavedení nových hospodárskych zvierat.

Granuly aplikujte na celej ploche jamy na hnoj. Výrobok je potrebné aplikovať vždy po odstránení hnoja.

V prípade chovu na hlbokej podstielke: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podstielky a ošetrenie zopakujte po vzniku každej novej 8-10 cm vrstvy.

V prípade hydinárni:

V prípade kletkového chovu: granuly rozsype na trus zhromaždený pod kletkami (na každú 10 cm vrstvu).

V prípade chovu na hlbokej podstielke: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podstielky a ošetrenie zopakujte po vzniku každej ďalšej 10 cm vrstvy.

V prípade veľmi suchého povrchu (napr. podstielka kurenec) sa môže stať, že účinok výrobku sa vyvinie

pomalšie. Pridaním 100-200 ml vody na m² povrchu, sa podporí účinok hubenia lariev aj v prípade veľmi suchých podmienok prostredia.

Použitie v prípade kozieho hnoja nie je povolené v chovných priestoroch pre kozy a v ovčincoch.

V prípade maštaľného hnoja, skladovaného vo vonkajšom prostredí:

Výrobok sa smie aplikovať len vtedy, ak je hnoj skladovaný v nepriepustnej, izolovanej jame, a spôsob uskladnenia zodpovedá aj ďalším požiadavkám bezpečného uskladnenia hnoja. Pri ošetrení hnoja skladovaného vonku výrobok aplikujte v dávke 30 g/m².

Aplikáciu larvicídneho výrobku na hnoj treba ukončiť aspoň dva mesiace pred jeho aplikáciou/zapracovaním do ornej pôdy.

Výrobok dokáže počas 12 týždňov po aplikácii obmedziť množstvo novo vyvinutých múch, ak dodržíte vyššie uvedený návod na použitie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pri aplikácii dodržujte príslušné predpisy, aby ste zabránili poškodzovaniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia.

Zabráňte kontaktu zvierat s výrobkom. Ak by to nebolo možné uskutočniť, premiestnite zvieratá počas doby aplikácie výrobku. Ošetrte hnoj zhromaždený pod roštovou podlahou, kovovými mrežami, systémom s hlbokou podstielkou, alebo pod klietkami.

Granuly nesypte do priamej blízkosti krmiva a zavlažovaných plôch, alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť ku konzumácii výrobku zvieratami. V prípade, že by mohlo dôjsť ku kontaminácii krmiva alebo pitnej vody, pred ošetrením plochy vyprázdnite alebo zakryte kŕmidlá, kŕmne a napájacie zariadenia.

Udržujte mimo dosahu detí a domáčich zvierat.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Uschovajte oddelené od potravín, krmív, osív a priemyselných hnojív.

Nepoužívajte výrobok v takých chovných priestoroch, v ktorých nemožno zabrániť styku s čistiarňou odpadových vôd alebo možnosti priameho vniknutia do povrchových vôd.

Riešenie problému rezistencia

Pre zabránenie vzniku rezistence odporúčame, aby ste v rámci programu ničenia škodcov používali aj insekticídy s iným mechanizmom účinku. V prípade Biopren 4 GR PLUS Larvicide granule na hubenie muších lariev odporúčame po niekoľkých aplikáciach larvicídneho výrobku používať adulticidný výrobok, lepovú pascu a lapače hmyzu s UV svetlom. Lepové pasce sa môžu používať aj na účely pozorovania.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Predpokladané priame alebo nepriame škodlivé účinky:

V prípade opakovaného vystavenia sa môžu vyskytnúť alergické reakcie.

Opatrenia prvej pomoci:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 15 minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu treba okamžite odstrániť/vyzliecť. Opláchnite pokožku veľkým množstvom/prúdom vody.

V prípade expozície alebo podozrenia z nej požiadajte o radu lekára/lekársku starostlivosť.

5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Prázdne obaly a zvyšky výrobku musia byť zneškodené ako nebezpečný odpad.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo sálavých tepelných zdrojov v pôvodnom uzavretom obale pri teplote do 35°C.

Nepoužívaný výrobok skladuje na dobre vetranom mieste chránenom od priameho slnečného žiarenia.

Skladovateľnosť: 3 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE