

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

**ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ
НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДЕН ПРОДУКТ**

ACTIPELLET-BROD

Продуктов(и) тип(ове)

PT14: Родентициди

Номер на разрешително: 2346-1, 2346-2, 2346-4

Номер на актив R4BP: BG-0018962-0000

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Търговско(и) наименование(я) на продукта

Търговско наименование	NEO ACTIPELLET-BROD
------------------------	---------------------

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Farma Vet LTD
	Адрес	Otets Paisii 40 Saedinenie 66 9700 Shumen България
Номер на разрешително	2346-1, 2346-2, 2346-4	
Номер на актив <i>R4BP</i>	BG-0018962-0000	
Дата на издаване на разрешението	30/01/2014	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/12/2026	

1.3. Производител(и) на продукта

Име на производителя	Activa srl
Адрес на производителя	via Feltre, 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	Colkim srl., via Piemonte 50 40064 Ozzano Emilia (BO) Италия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	Бродифакум
Име на производителя	Activa S.r.l
Адрес на производителя	via Feltre, 32 20132 Milano Италия
Местонахождение на производствените обекти	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Италия

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Бродифакум	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	активно вещество	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (w/w)

2.2. Вид(ове) формулация

RB Готова за употреба примамка

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за опасност	H373: Може да причини увреждане на органи (blood) при продължителна или повтаряща се експозиция {1: посочете път на експозиция, ако е доказано убедително, че няма други пътища на експозиция, които причиняват опасността: }.
Препоръки за безопасност	P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P301+P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на POISON CENTER or a doctor/physician/. P308+P313: ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински медицински съвет. P501: Да се изхвърли съдържанието в hazardous waste facilities in accordance with national regulations..

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)

4.1. Описание на употребите

Таблица 1. Таблица 1. Употреба 1 — домашни мишки — професионални потребители — на закрито

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: house mouse Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка
Степен и честота на приложение	Дозирание: 20 g - 40 g примамка на една поставка. Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester

4.1.1. Специфични инструкции за употреба

Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2—3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.1.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.1.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри.

4.1.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.1.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.2. Описание на употребите

Таблица 2. Таблица 2. Употреба 2 — плъхове — професионални потребители — на закрито

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: brown rat Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка
Степен и честота на приложение	Дозирание: 100 g - 200 g примамка на една поставка Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester

4.2.1. Специфични инструкции за употреба

Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5—7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.2.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.2.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- Когато поставяте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри.

4.2.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.2.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.3. Описание на употребите

Таблица 3. Таблица 3. Употреба 3 — домашни мишки и/или плъхове — професионални потребители — на открито около сгради

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: house mouse Етап на развитие: други: Juveniles to adults Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: brown rat Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other на открито около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка

Степен и честота на приложение	<p>Дозирание: House mice: 20 – 40 g примамка на една поставка; Brown rat: 100 g - 200 g примамка на една поставка</p> <p>Разреждане (%): 0,0025</p> <p>Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.</p>
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	<p>Number of packed bags per packaging: Грама/килограма примамка в торба: from 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax block) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester</p>

4.3.1. Специфични инструкции за употреба

Предпазвайте примамката от метеорологичните условия (напр. дъжд, сняг и пр.). Поставете поставките за примамка на места, защитени от наводняване.

Поставките за примамка трябва да се посещават [за мишки — поне веднъж на 2—3 дни в] [за плъхове — само 5—7 дни след] началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване.

4.3.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- Не насипвайте този продукт направо в тунелите.

4.3.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

- Когато поставяте поставки за примамка близо до повърхностни води (напр. реки, езера, канали, язовири, напоителни съоръжения) или отводнителни съоръжения, погрижете се примамката да не се мокри.

4.3.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.3.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.4. Описание на употребите

Таблица 4. Таблица 1. Употреба 1 — домашни мишки — масови потребители — на закрито

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Mus musculus</i> Общоприето наименование: house mouse Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 20 g - 40 g примамка на една поставка. Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester

4.4.1. Специфични инструкции за употреба

Поставките за примамка трябва да се посещават най-малко веднъж на всеки 2—3 дни в началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.4.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.4.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.4.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.4.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.5. Описание на употребите

Таблица 5. Таблица 2. Употреба 2 — плъхове — масови потребители — на закрито

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: brown rat Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка.
Степен и честота на приложение	Дозирание: 100 g - 200 g примамка на една поставка Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester

4.5.1. Специфични инструкции за употреба

Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5—7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали

поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупите на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.5.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.5.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.5.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.5.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.6. Описание на употребите

Таблица 6. Таблица 3. Употреба 3 — плъхове — масови потребители — на открито около сгради

Вид продукт	PT14: Родентициди
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Не се отнася за отрови за гризачи
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: <i>Rattus norvegicus</i> Общоприето наименование: brown rat Етап на развитие: други: Juveniles to adults
Област(и) на употреба	други: Other на открито около сгради
Метод(и) на прилагане	Метод: Залагане на примамки Подробно описание: Готова примамка за използване в защитени срещу манипулации поставки за примамка.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 100 g - 200 g примамка на една поставка Разреждане (%): 0,0025 Брой и времеви график на прилагане: Ако е необходима повече от една поставка за примамка, минималното разстояние между поставките за примамка трябва да бъде 5 метра.
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Up to 300 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in block bait) Опаковъчен материал: PE/Aluminium/Polyester

--	--

4.6.1. Специфични инструкции за употреба

Поставяйте поставките за примамка на места, защитени от наводняване.

Сменяйте всяка примамка в поставка, в която примамката е повредена от вода или заразена поради замърсяване.

Поставките за примамка трябва да се посещават само в период от 5—7 дни след началото на третирането и поне седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали поставките за примамка са невредими и за да се отстранят трупове на гризачите. Примамката се зарежда отново при необходимост.

4.6.2. Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

4.6.3. Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

4.6.4. Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

4.6.5. Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА¹

5.1. Указания за употреба

Професионални потребители

Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате.

- Извършете проучване на нападнатата област преди поставянето на примамката и оценка на място, за да идентифицирате видовете гризачи, техните места на действие и да определите вероятната причина и мащабите на нахлуването.

Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци).

Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката.

- Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегрирана борба с вредители (ИБВ), включваща освен всичко друго мерки за хигиена и — при възможност — физически методи за контрол.

Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване.

- Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани преди това действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.).

- Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции.

- Поставките за примамка трябва да бъдат ясно надписани, че съдържат отрови за гризачи и че не трябва да се преместват и отварят (вижте раздел 5.3 за информацията, която надписът трябва да съдържа).

[...] Когато продуктът се използва на обществени места, третираните площи трябва да бъдат обозначени по време на периода на третирането и до примамките трябва да бъде поставена табела с обяснение на риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта и мерките за първа помощ при евентуално отравяне.

- Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде отнесена от поставката.

¹Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

- Поставяйте продукта извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелевни животни.

- Поставяйте продукта далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива.

[Когато е необходимо според оценката на риска:

Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта)

Когато е необходимо, посочете всички други необходими ЛПС (напр. очила или маска) при боравенето с продукта]

Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете.

Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта.

- Ако поемането на примамката е сравнително слабо спрямо явните мащаби на нахлуването, помислете за преместване на поставките за примамката и — евентуално — за преминаване към друга формула на примамката.

Ако след 35-дневен период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в действията на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това.

След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи, затова преценете възможността за употреба на неантикоагулантна — ако има — или по-силна антикоагулантна отрова за гризачи.

Също така преценете възможността за използване на капани като алтернативна мярка за контрол.

- Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането.

Масови потребители

Прочетете и спазвайте информацията за продукта и данните, придружаващи продукта или предоставени на мястото на продажба, преди да го използвате.

- Преди употребата на отрови за гризачи трябва да се прецени възможността за използване на нехимически методи за контрол (напр. капани).

Отстранете леснодостъпната за гризачите храна (напр. разсипано зърно или хранителни отпадъци).

Не правете обаче друго почистване на нападнатата област непосредствено преди третирането, защото това само ще обезпокои популацията от гризачи и ще затрудни приемането на примамката.

- Поставките за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата със забелязани действия на гризачи (напр. пътеки, свърталища, хранилки, дупки, тунели и пр.).
- Където е възможно, поставките за примамка трябва да се закрепват за земята или за други конструкции.
- [Не отваряйте сашетата с примамката — когато това е от значение за формулата на примамката в продукта].
- Поставяйте поставките за примамка извън досега на деца, птици, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни.
- Поставяйте поставките за примамка далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива.
- Не поставяйте поставки за примамка близо до отводнителни съоръжения, където могат да влязат в контакт с вода.

Докато използвате продукта, не се хранете, не пийте и не пушете.

Измийте ръцете и изложената на пряк контакт кожа, след като използвате продукта.

- Отстранете останалата примамка или поставките за примамка в края на периода на третирането.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Професионални потребители

Когато е възможно, преди третирането уведомете евентуалните минавачи (напр. потребителите на третираната площ и нейните околности) за кампанията за борба с гризачите [„по съответния правилник за добра практика, ако има такъв“].

За да намалите риска от вторично отравяне, редовно търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането (напр. поне два пъти седмично). [...].

- Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на нахлуването и ефективността на третирането.
 - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи.
- В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че:
- Продуктът не трябва да се доставя на масови потребители (напр. „само за професионални потребители“).
 - продуктът трябва да се използва в достатъчно защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр.: „За употреба само в защитени срещу манипулации поставки за примамка“).
 - потребителите трябва да надписват правилно поставките за примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 на кратката характеристика на продукта (SPC) (напр. „Надпишете поставките за примамка, както е указано в препоръките за продукта“).
- Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни.
- Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители.
- Не мийте поставките за примамка с вода, преди да поставите нова примамка.
- Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания [...].

Масови потребители

Преценете възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобрите приемането на продукта и намалите вероятността от повторно нахлуване.

- Не използвайте антикоагулантни отрови за гризачи като постоянни примамки (напр. за предотвратяване на нахлуване или установяване на присъствие на гризачи).

В информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) ясно трябва да бъде посочено, че:

- продуктът трябва да се използва в достатъчно защитени срещу манипулации поставки за примамка (напр.: „За употреба само в защитени срещу манипулации поставки за примамка“).

- потребителите трябва да надписват правилно поставките за примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 на кратката характеристика на продукта (SPC) (напр. „Надпишете поставките за примамка, както е указано в препоръките за продукта“).

Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни.

Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действия на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители.

- Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането — най-малко при всяка проверка на поставките за примамка.

Изхвърляйте мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания [...].

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Този продукт съдържа антикоагулантно вещество.

Ако бъде погълнат, е възможно — с евентуално забавяне — да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа и венците.

В тежки случаи може да се появят синини и кръв в изпражненията или урината.

- Противоотрова: Витамин K1, който трябва да се дава само от медицински/ветеринарни специалисти.

- При:

- Експозиция на кожата: да се измие с вода и след това с вода и сапун.

- Експозиция на очите: да се промият с течност за промивка на очите или вода, клепачите да се държат отворени поне 10 минути.

Експозиция на устата: да се изплакне внимателно с вода.

Нищо не трябва да се дава в устата на човек в безсъзнание.

Не предизвиквайте повръщане.

При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ и покажете съда или етикета на продукта [...].

Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от домашен любимец [...].

Поставките за примамка трябва да бъдат надписани със следната информация: „да не се премества или отваря“; „съдържа отрова за гризачи“; „наименование или номер на разрешително на продукта“; „активно вещество/вещества“ и „при злополука се обадете на център за отравяния [...]“.

- Опасно за дивата природа.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането изхвърлете неизядената примамка и опаковката в съответствие с местните изисквания [...].

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Дръжте съда затворен и далеч от пряка слънчева светлина.

- Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни.

- Срок на годност: 2 years

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката.

Гризачите могат да пренасят болести.

Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте.

- Този продукт съдържа вгорчаващ агент и оцветител.