

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Ratimor Brodifacoum Fresh Bait

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I:543-04/18-12/38

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0013242-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	21
5.1. Upute za uporabu	22
5.2. Mjere za smanjenje rizika	24
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	25
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	26
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	26
6. Ostale informacije	26

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Ratimor Brodifacoum Fresh Bait
Ratimor Brodifakum meki mamac
Glodacid plus meki mamac
Brodifakum meki mamac

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I:543-04/18-12/38	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0013242-0000	
Datum odobrenja	06/08/2013	
Datum isteka odobrenja	01/07/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	11 - Brodifakum
Naziv proizvođača	Activa Srl
Adresa proizvođača	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0029

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
Oznake obavijesti	Čuvati izvan dohvata djece. Pažljivo pročitajte i slijedite upute. Ne udisati prašinu. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada..

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Opća javnost - suzbijanje kućnih miševa u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije mjerodavno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: Kućni miš Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu [u jestivim papirnatim vrećicama] postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g): <ul style="list-style-type: none">- pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 50 g;- pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 50 g;- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 50 g;- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 50 g;- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 50g;- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 50g;- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 50g;- Jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punjive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g;- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 50 g

- Jedna ili više vrećica pakirane u posudu za mamac s zavarenim poklopcem zapakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 50 g.
Ostalo:
Mamci na tacni/podlošku (10 g do 20 g), sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 50 g.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Opća javnost - suzbijanje štakora u zatvorenom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije mjerodavno za rodenticide

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: Smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: *Rattus rattus*
Uobičajeno ime: Crni štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu [u jestivim papirnatim vrećicama] postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja.

Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g)

- pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 150 g;

- pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 150 g;

- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 150 g;

- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150g;

- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150g;

- Jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

- Jedna ili više vrećica pakirane u posudu za mamac s zavarenim poklopcem zapakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom

zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 150 g.

Ostalo:

Mamci na tacni/podlošku od 10 g, 10,5 g, 11 g, 11,5 g, 12 g, 12,5 g, 13 g, 13,5 g, 14 g, 14,5 g, 15 g, 15,5 g, 16 g, 16,5 g, 17 g, 17,5 g, 18 g, 18,5 g, 19 g, 19,5 g ili 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 150 g.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Opća javnost - suzbijanje štakora na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije mjerodavno za rodenticide

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: Smeđi štakor
Stadij razvoja: Mlade i odrasle životinje

Znanstveno ime: *Rattus rattus*
Uobičajeno ime: Crni štakor
Stadij razvoja: Mlade i odrasle životinje

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom, oko zgrada

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca

Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu [u jestivim papirnatim vrećicama] postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Razrjeđivanje (%): 0

Broj i vremenski raspored primjene:

Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja.

Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g)

- pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 150 g;

- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 150 g;

- pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 150 g;

- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 150 g;

- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 150g;

- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 150g;

- Jedna ili više vrećica pakirane u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zavarenom spremniku ili zavarenoj foliji do 150 g;

- Jedna ili više vrećica pakirane u posudu za mamac s zavarenim poklopcem zapakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe i štakore, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 150 g.

Ostalo:

Mamci na tacni/podlošku od 10 g, 10,5 g, 11 g, 11,5 g, 12 g, 12,5 g, 13 g, 13,5 g, 14 g, 14,5 g, 15 g, 15,5 g, 16 g, 16,5 g, 17 g, 17,5 g, 18 g, 18,5 g, 19 g, 19,5 g ili 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 150 g.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.

Svaki mamac koji je oštećen vodom ili onečišćen prljavštinom u zaštitnoj kutiji za mamce treba zamijeniti. Kada se mamci postavljaju na otvorenom kutije za mamce treba staviti na područja koja ne mogu biti poplavljena.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Profesionalni korisnici - suzbijanje kućnih miševa u zatvorenom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: Kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:

Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra.
Razrjeđivanje (%): 0
Broj i vremenski raspored primjene:
Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja od 5 kg.
Maksimalna veličina vanjskog pakovanja do 25 kg.

Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g)

- pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg;
- pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg;
- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg;
- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg;
- pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg;
- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili toplinom zavarenoj foliji do 20 kg;

Ostalo:

- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj oмотnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg.
- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg.
- 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševe, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u

kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;
- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / Špatule do 20 kg.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima.
Potrebno je slijediti sve dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamcima postavljaju u blizini sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Profesionalni korisnici - suzbijanje štakora u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: Crni štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja od 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g) - pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg; - pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg; - pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg; - pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u

plastičnom zapečaćenom spremniku ili toplinom zavarenoj foliji do 20 kg;

Ostalo:

- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg.

- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg.

- 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševе, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;

- 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;

- 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;

- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / špatule do 20 kg.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku 5-7 dana, kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamicima.

Potrebno je slijediti sve dodatne upute navedene u mjerodavnom kodeksu najbolje prakse.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamicima postavljaju u blizini sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Profesionalni korisnici - suzbijanje kućnih miševa i/ili štakora na otvorenom, oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: Kućni miš Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Uobičajeno ime: Crni štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razrijeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja od 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g) - pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg; - pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg;

- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg;
- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanihom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg;
- pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg;
- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili toplinom zavarenoj foliji do 20 kg;

Ostalo:

- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg.
- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg.
- 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševе, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;
- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / špatule do 20 kg.

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštiti mamac od nepovoljnih atmosferskih uvjeta (npr. kiša, snijeg itd.). Staviti kutije za mamce u područja koja ne mogu poplaviti. Nakon postavljanja treba provoditi redovitu provjeru mamaca, u početku svaka 2-3 dana (miševi), odnosno svakih 5-7 dana (štakori), kasnije jednom tjedno, kako bi se provjerila prihvaćenost (konzumacija) mamaca, da li su kutije za mamce oštećene i kako bi se uklonili uginuli glodavci. Kada je potrebno treba nadopuniti kutiju za mamce novim mamcima. Zamijeniti sve mamce u zaštitnim kutijama za mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni. Potrebno je slijediti sve dodatne upute navedene u odgovarajućem kodeksu dobre prakse.

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Ovaj proizvod ne primjenjivati izravno u jazbine.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada su mjesta postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeke, ribnjaci, kanali za vodu, brane, kanali za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba izbjegavati dodir mamca s vodom.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Osposobljeni profesionalni korisnici - suzbijanje kućnih miševa i/ili štakora u zatvorenom

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: Kućni miš Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: Rattus rattus Uobičajeno ime: Crni štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na pokrivena/zaštićena mjesta postavljanja mamaca.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Minimalna veličina pakiranja od 5 kg.
Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg.
Mamac u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g):

- pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg;
- pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg;
- pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg;
- pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg;
- pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg;
- pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg;
- pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg;
- pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili toplinom zavarenoj foliji do 20 kg;

Ostalo:

- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg.
- Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg.
- 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševе, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;
- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / špatule do 20 kg.

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Ukloniti preostali proizvod pri kraju razdoblja tretiranja [Nije primjenjivo u slučaju primjene mamca u jazbinu].
Ako se koristi za povremenu primjenu mamca: Pojedene mamce zamijeniti tek nakon 3 dana, a nakon toga u razdoblju ne duljem od 7 dana. Skupiti prosuti mamac i uginule glodavce.
Potrebno je slijediti sve dodatne upute navedene u odgovarajućem kodeksu dobre prakse.

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.
Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.
U cilju sprečavanja sekundarnih otrovanja, tijekom trajanja postupka deratizacije često treba potražiti i ukloniti uginule glodavce, u skladu s preporukama iz odgovarajućeg kodeksa najbolje prakse.
Ne koristiti proizvode kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada se kutije s mamcem postavljaju blizu sustava za odvod vode, treba izbjegavati kontakt mamca i vode.

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Osposobljeni profesionalni korisnici - suzbijanje kućnih miševa i/ili štakora na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije mjerodavno za rodenticide

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: Kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: Smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: *Rattus rattus*
Uobičajeno ime: Crni štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene

	<p>na otvorenom</p> <p>Na otvorenom oko zgrada</p>
Načini primjene	<p>Metoda: primjena mamaca</p> <p>Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na pokrivena/zaštićena mjesta postavljanja mamaca. Izravna primjena mamca u jazbinu.</p>
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Stopa primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja.</p> <p>Razrjeđivanje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene: Kod infestacije miševima treba upotrijebiti do 20 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 5 metara, a u područjima jake infestacije 2 metra. Kod infestacije štakorima treba upotrijebiti do 60 g mamca po mjestu postavljanja. Razmak između mjesta postavljanja treba biti 10 metara, a u područjima jake infestacije 5 metara.</p>
Kategorije korisnika	<p>osposobljeni profesionalac</p>
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Minimalna veličina pakiranja od 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg.</p> <p>Mamci u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg; - pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg; - pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg; - pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili topline zavarenoj foliji do 20 kg; <p>Ostalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševе, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg. - Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg. - 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševе, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg; - 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg; - 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;

- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / špatule do 20 kg.

4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Zaštititi mamac od nepovoljnih atmosferskih uvjeta (npr. kiša, snijeg itd.). Staviti kutije za mamce u područja koja ne mogu poplaviti. Zamijeniti sve mamce u zaštitnim kutijama za mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni. Ukloniti preostali proizvod pri kraju razdoblja tretiranja [Nije primjenjivo u slučaju primjene mamca u jazbinu]. Ako se koristi za povremenu primjenu mamca: Pojedene mamce zamijeniti tek nakon 3 dana, a nakon toga u razdoblju ne duljem od 7 dana. Skupiti prosuti mamac i uginule glodavce. Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

Potrebno je slijediti sve dodatne upute navedene u odgovarajućem kodeksu dobre prakse.

Izravna primjena mamca u jazbinu: Mamce treba postaviti tako da se smanji izloženost ne-ciljnih vrsta i djece. Pokriti ili na drugi način zatvoriti ulaze u legla s mamcima kako bi se smanjio rizik od odbacivanja ili prosipanja mamca.

4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

U cilju sprečavanja sekundarnih otrovanja, tijekom trajanja postupka deratizacije često treba potražiti i ukloniti uginule glodavce, u skladu s preporukama iz odgovarajućeg kodeksa najbolje prakse.

Ne koristiti proizvode kao trajne mamce za sprečavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada su mjesta postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeke, ribnjaci, kanali za vodu, brane, kanali za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba izbjegavati dodir mamca s vodom.

4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Osposobljeni profesionalni korisnici - suzbijanje štakora u kanalizaciji

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	Other Kanalizacija
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu postavlja se u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: Kod jake infestacije štakorima u kanalizaciji treba upotrijebiti 200 g mamca po šahtu, a u slučaju blage infestacije do 200 g mamca po mjestu postavljanja. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Kod jake infestacije štakorima u kanalizaciji treba upotrijebiti 200 g mamca po šahtu, a u slučaju blage infestacije do 200 g mamca po mjestu postavljanja, ovisno o stupnju/opsegu infestacije .
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Minimalna veličina pakiranja od 5 kg. Maksimalna veličina vanjskog pakiranja do 25 kg. Mamac u jestivim papirnatim vrećicama (10 g - 20 g) - pakirano u vanjske vrećice od polietilena (PE), polipropilena (PP), PE/PP, ili papir/PE, u vanjskom kartonskom omotu ili omotu od vlaknatice, u ukupnoj količini do 20 kg; - pakirano u vanjski omot od polietilena (PE) ili polipropilena (PP), u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u aluminijski ili laminirani PP ili PET / PE vrećice s ili bez vanjskog kartona, u ukupnoj količini do 25 kg; - pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u vrećice (PE ili PE/PP ili PP ili papir/PE) pakirano u vanjske vreće od natron papira u količini do 25 kg; - pakirano u PP ili PE kante s poklopcem ili kanilom ili kante s poklopcem ili cijevi do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice s PE vrećicom ili linerom do 20 kg; - pakirano u vanjskoj kartonskoj ili kutiji od vlaknatice do 20 kg; - pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za mamce za miševe, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili zavarenoj foliji do 20 kg; - pakirano u PE ili PP blister pakiranju. Blisteri pakirani u vanjsku kartonsku ili u plastičnom zapečaćenom spremniku ili toplinom zavarenoj foliji do 20 kg; Ostalo: - Mamci na PP, PE ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem pakirano u prethodno napunjene ili punive plastične (HDPE ili PP) zaštitne kutije za

mamce za miševe, zaštićene od neovlaštenog otvaranja. Kutije za mamce su pakirane u vanjskoj kartonskoj kutiji ili blister pakiranju ili kartonskoj omotnici ili toplinom zapečaćenoj vrećici s kartonskim poklopcem do 10 kg.

- Mamci na PP, Pe ili PET tacni/podlošku do 20 g, sa toplinom zapečaćenim poklopcem ili PE ili PP ili aluminijskom naljepnicom i vanjskim kartonom, u ukupnoj količini do 10 kg.
- 20 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za miševe, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 60 g polietilenske 'kobasica' u vanjskom kućištu od kolagena ili PE za uporabu u kutijama za mamce za štakore, pakirano u vanjsku vlaknaticu do 10 kg;
- 0,1; 0,15; 0,2 ili 0,3 kg paste u plastičnim tubama za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja do 20 kg;
- pasta u PP ili PE omotu za primjenu pomoću dekoratorskog noža / špatule do 20 kg.

4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamci se moraju primijeniti na način da ne dođu u dodir s vodom i budu odneseni (odvučeni). Preporuča se slijediti dodatne upute navedene u kodeksu dobre prakse na nacionalnoj razini.

4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mamce se smije stavljati samo u kanalizacijske sustave koji su povezani s uređajem za obradu otpadnih voda.

Ne primjenjivati kao stalne mamce niti u svrhu praćenja aktivnosti glodavaca.

4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3

4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4

4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Opća javnost:

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije uporabe rodenticida treba uzeti u obzir mogućnost suzbijanja glodavaca ne-kemijskim metodama (na primjer zamke).

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi).

Nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta primijećene aktivnosti glodavaca (na primjer: putovi kretanja, jazbine, mjesta hranjenja, rupe itd).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Ne otvarati vrećice koje sadrže mamce.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Kutije s mamcem ne smije se stavljati blizu sustava za odvod vode, jer mogu doći u dodir s vodom.

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima i pri tome spriječiti kontakt pripravka s kožom.

Profesionalni korisnici:

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), kolje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole.

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (na primjer putovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, rupa, jazbina itd.).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju premještati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3).

Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN374).

Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Ako se sumnja da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmisliti o premještanju kutija s mamcima na dalja mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.

Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zamki kao alternativne mjere kontrole.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

Upute za uporabu koje se „odnose na mamce“:

Mamci u vrećicama: Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamce.

Pasta: Mamac u obliku paste treba u zaštitnu kutiju postavljati pomoću dovoljno izduženog aplikatora (lopatice) kako bi se smanjila izloženost ruke pripravku - izbjegavajte posezanje u kantu. Očistiti opremu (pr. lopaticu) papirnatim ručnikom ili mokrom krpom.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

Prije uporabe treba pročitati Upute za uporabu pripravka, pridržavati ih se, kao i sve informacije koje su dostupne uz proizvod ili na mjestu prodaje.

Prije postavljanja mamaca treba izvršiti pregled infestiranog područja i na licu mjesta procijeniti o kojoj se vrsti glodavaca radi, mjesta njihove aktivnosti te pokušati odrediti vjerojatni uzrok i opseg infestacije.

Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (na primjer ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi), osim toga nije potrebno čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to uznemiruje populaciju glodavaca i otežava prihvaćanje mamaca.

Proizvod treba koristiti samo kao dio integriranog sustava za upravljanje štetočinama (IPM), kolje uključuju, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je to moguće, fizičke metode kontrole

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Kutije s mamcima treba postaviti u neposrednu blizinu mjesta na kojima je uočena aktivnost glodavaca (pr. putovi kretanja, legla, mjesta hranjenja, rupa, jazbina itd.).

Gdje je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti za tlo ili drugu površinu.

Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticid i da se ne smiju premještati ili otvarati (informacije koje se trebaju navesti na deklaraciji potražiti u odjeljku 5.3).

Kada se proizvod koristi u javnim prostorima, područja na kojima se provodi deratizacija trebaju biti označeni tijekom trajanja cijelog

postupka, a na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest koja objašnjava rizik od primarnog ili sekundarnog otrovanja antiokoagulansom, kao i upute o postupcima prve pomoći u slučaju otrovanja; navedeno mora biti vidljivo na svim mjestima postavljanja mamaca.

Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.

Kutije s mamcem treba postaviti izvan doseg djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.

Kutije s mamcem treba postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s navedenim.

Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN374). Tijekom uporabe proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

Nakon uporabe proizvoda treba oprati ruke i izravno izloženu kožu.

O učestalosti posjeta tretiranom području odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene, što bi trebalo biti usklađeno s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najbolje prakse.

Ako se sumnja da je količina mamaca nedovoljna za opseg infestacije, treba razmisliti o premještanju kutija s mamcima na dalja mjesta i mogućnost zamjene drugom formulacijom mamca.

Ako se i nakon razdoblja tretmana od 35 dana mamci nastavljaju konzumirati i ne opaža se smanjena aktivnost glodavaca, treba odrediti mogući uzrok tomu. Gdje su isključeni drugi elementi, vjerojatno je da postoje rezistentni glodavci pa treba razmotriti upotrebu neantikoagulantnih rodenticida, ukoliko su dostupni, ili snažnijeg antikoagulantnog rodenticida. Također treba razmotriti upotrebu zamki kao alternativne mjere kontrole.

Nakon provedenog tretmana treba ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcima.

Upute za uporabu koje se „odnose na mamce“:

Mamci u vrećicama: Ne otvarajte vrećice koje sadrže mamce.

Pasta: Mamac u obliku paste treba u zaštitnu kutiju postavljati pomoću dovoljno izduženog aplikatora (lopaticice) kako bi se smanjila izloženost ruke pripremu - izbjegavajte posezanje u kantu. Očistiti opremu (pr. lopaticu) papirnatim ručnikom ili mokrom krpom

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Opća javnost:

Razmotriti preventivne mjere kontrole (npr. začepiti rupe, ukloniti potencijalnu hranu i piće što je više moguće) kako bi se poboljšao unos proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne infestacije.

Ne koristiti proizvod kao trajne mamce za sprečavanje infestacije glodavcima ili praćenje aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili uputi treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja (pr. „koristiti samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja”),
- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (pr. „kutije s mamcem označiti u skladu s preporukama za proizvod”).

Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina.(DDD).

Uginule glodavce treba potražiti i ukloniti barem onoliko često koliko se provjeravaju zaštitne kutije s mamcima. Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Profesionalni korisnici:

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije.

Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dvaput tjedno).

Proizvod se ne smije koristiti više od 35 dana bez procjene stanja infestacije i učinkovitosti tretmana.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu (odnosno naljepnica i/ili uputa) treba biti jasno navedeno sljedeće:

- proizvod nije namijenjen općoj javnosti (pr. „samo za profesionalce”).
- proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja (pr. „koristite samo u zaštitnim kutijama za mamce osiguranim od neovlaštenog otvaranja”),
- korisnici moraju ispravno označiti kutije s mamcem i navesti informacije iz odjeljka 5.3 u sažetku svojstava biocidnog proizvoda (npr. „kutije s mamcem označite u skladu s preporukama za proizvod”).

Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.

Korištenjem ovog proizvoda trebala bi se suzbiti infestacija u roku od 35 dana. Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) jasno preporučuju da u slučaju sumnje na nedostatak djelotvornosti na kraju tretmana (tj. aktivnost glodavaca i dalje postoji), korisnik treba zatražiti savjet od dobavljača proizvoda ili nazvati službu za suzbijanje štetočina.(DDD).

Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

Osposobljeni profesionalni korisnici:

Kada je moguće, prije provođenja postupka treba obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihove okoline) o provođenju postupka deratizacije..

Informacije o proizvodu (tj. Uputa i/ili deklaracija) trebaju sadržavati upozorenje da pripravak mogu nabaviti samo kvalificirani profesionalni korisnici koji posjeduju certifikat koji potvrđuje sukladnost s odgovarajućim zahtjevima izobrazbe (npr. "samo za specijalizirane profesionalce"). Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.

Proizvod se ne smije upotrebljavati više od 35 dana bez procjene brojnosti populacije i učinkovitosti primjene [osim ako je proizvod odobren za trajnu primjenu]. Ne primjenjivati naizmjenično antikoagulate istog načina djelovanja ili slabije učinkovitosti radi upravljanja rezistencijom.

Za naizmjeničnu uporabu razmotriti uporabu ne-antikoagulantnih rodenticida, ako su dostupni, ili snažnijeg antikoagulanta.

Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posuđe koje se upotrebljavalo na pokrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.

Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otropane glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje nusproizvoda.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod sadrži antikoagulans. Ako se proguta, simptomi, koji mogu biti odgođeni, mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima može doći do pojave modrica i prisutnosti krvi u izmetu ili urinu.
Antidot: Vitamin K1, koji smiju primijeniti samo medicinski/veterinarski stručnjaci.
U slučaju dermalne izloženosti: isprati kožu vodom, a zatim oprati vodom i sapunom.
U slučaju kontakta pripravka s očima treba isprati oči tekućinom ili vodom za ispiranje očiju, držati očne kapke otvorene bar 10 minuta.
U slučaju gutanja mamca: pažljivo isprati usta vodom. Nikada ne davati ništa na usta osobi bez svijesti. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati spremnik ili deklaraciju proizvoda.
Ako je pripravak progutao kućni ljubimac treba se obratiti veterinarskom kirurgu.
Kutije s mamcima moraju biti označeni sljedećim informacijama: "ne micati ili otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj ovlaštenja"; "aktivne tvari" i "u slučaju nesreće nazovite broj 112 ili Centar za kontrolu otrovanja 01-23-48-342".

Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu s Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom. Preporučuje se uporaba rukavica.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.
Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.
Držati samo u izvornom spremniku.
Rok uporabe: 24 mjeseca.

6. Ostale informacije

Zbog odgođenog djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana da počnu djelovati. Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su kliješta.
Ovaj proizvod sadrži goroku tvar i boju.