

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Ratimor Brodifacoum Wax Blocks 50

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0022218-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0022218-0000

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	4
2.2. Vrsta(-e) formulacije	4
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	5
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	6
4.1. Opis uporabe	6
4.2. Opis uporabe	7
4.3. Opis uporabe	9
4.4. Opis uporabe	10
4.5. Opis uporabe	12
4.6. Opis uporabe	14
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	16
5.1. Navodila za uporabo	16
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	17
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	18
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	18
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	18
6. DRUGE INFORMACIJE	19

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Ratimor Brodifacoum Wax Blocks 50
--------------	-----------------------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Unichem d.o.o.
	Naslov	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Številka dovoljenja		SI-0022218-0000
Številka proizvoda v R4BP		SI-0022218-0000
Datum dovoljenja		06/08/2013
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/12/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Unichem d.o.o.,
Naslov proizvajalca	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija
Kraj proizvodnih obratov	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Slovenija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Brodifakum
Ime proizvajalca	Activa Srl
Naslov proizvajalca	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Kraj proizvodnih obratov	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna snov	56073-10-0	259-980-5	0,005

2.2. Vrsta(-e) formulacije

RB Gotova vaba

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	<p>H360D: Lahko škoduje nerojenemu otroku.</p> <p>H373: Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}.</p> <p>EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.</p> <p>EUH208: Vsebuje <name of sensitising substance>. Lahko povzroči alergijski odziv.</p>
Previdnostni stavki	<p>P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.</p> <p>P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.</p> <p>P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.</p> <p>P280: Nositi zaščitne rokavice.</p> <p>P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.</p> <p>P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč.</p> <p>P404: Hraniti v zaprti posodi.</p> <p>P405: Hraniti zaklenjeno.</p> <p>P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi..</p>

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Hišne miši – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 20 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi ali iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Minimalna velikost pakiranja 3 kg. Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg. Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zabojniku (posodi) do 25 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg Blok (z ali brez kavljazice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega li več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točko 5.2

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Podgane – poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: črna ali strešna podgana Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjih prostorih
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.

	Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi ali iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Minimalna velikost pakiranja 3 kg. Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg. Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zabojniku (posodi) do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej točko 5.2

4.2.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Hišne miši in/ali podgane – poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: črna ali strešna podgana Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 20 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Minimalna velikost pakiranja 3 kg. Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg. Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zabojniku (posodi) do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg

Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg
 Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg
 Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg
 HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi (npr. dež, sneg itd.). Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljeni vodi.
- Postaje pregledujte [pri miših – najmanj enkrat na dva do tri dni] [pri podganah – vsakih pet do sedem dni] od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta, ali so postaje nedotaknjene, in da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.
- Zamenjajte morebitne vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Proizvoda ne nastavljajte neposredno v rove.

4.3.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.4. Opis uporabe

Tabela 4. Hišne miši in/ali podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – v notranjih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Rjava podgana

	<p>Razvojna faza: drugo: vse</p> <p>Znanstveno ime: Rattus rattus</p> <p>Splošno ime: drugo: črna ali strešna podgana</p> <p>Razvojna faza: drugo: vse</p>
Področje(-a) uporabe	<p>uporaba v zaprtih prostorih</p> <p>V notranjih prostorih</p>
Način(-i) uporabe	<p>Metoda: Uporaba vabe</p> <p>Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Pokrita in zaščitena mesta za nastavljene vabe.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 20 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev.</p> <p>Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi ali iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	<p>Minimalna velikost pakiranja 3 kg.</p> <p>Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg.</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zaboju (posodi) do 25 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg</p> <p>Bloki (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg</p> <p>Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg</p> <p>HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za</p>

zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.4.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Odstranite ostanek proizvoda ob koncu tretiranja.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
- Če se uporablja kot stalno vabo: Priporočljivo je, da območje učinkovanja vabe pregledate najmanj vsake štiri tedne, da se izognete odpornosti populacije.
- Za metodo intervalov "Pulsed baiting": Zamenjajte pojedeno vabo po 3 dneh in nato v največ 7 dnevih intervalih. Pospravite raztreseno vabo in mrtve glodavce.

4.4.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto pregledjte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- Tega produkta na uporabljajte kot trajno vabo.

4.4.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.4.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.4.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.5. Opis uporabe

Tabela 5. Hišne miši in/ali podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – zunaj okrog stavb

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: drugo: Hišna miš Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: vse Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: drugo: črna ali strešna podgana Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	uporaba na prostem

	Zunaj okrog stavb
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki. Pokrita in zaščitena mesta za nastavljene vabe.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu miši nastavite 10 g do 20 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 5 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 2 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Pri napadu podgan nastavite 10 g do 60 g vabe na nastavitveno mesto. Nastavitvena mesta naj bodo postavljena na medsebojni razdalji 10 m, zmanjšajte razdaljo postavitvenih mest na 5 m v primeru prisotnosti velikega števila glodavcev. Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi ali iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Minimalna velikost pakiranja 3 kg. Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg. Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zabojniku (posodi) do 25 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg Blok (z ali brez kavlja/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g (do 40 g na postajo za zatiranje miši in do 60 g na postajo za zatiranje podgan). Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.5.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.
- Zamenjajte morebitne vabe v postajah, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.

- Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
- Za zunanjo uporabo morajo biti mesta z vabami pokrita in postavljena na strateških mestih, da se zmanjša izpostavljenost neciljnim vrstam.
- Za metodo intervalov "Pulsed baiting": Zamenjajte pojedeno vabo po 3 dneh in nato v največ 7 dnevni intervalih. Pospravite raztreseno vabo in mrtve glodavce.

4.5.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto preglejte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.
- Proizvoda ne uporabljajte kot stalno vabo za preprečitev napada glodavcev ali kot monitoring vabo.
- Proizvoda ne uporabljajte neposredno v rovih.

4.5.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj za nastavljanje vab blizu površinskih vod (npr. rek, ribnikov, vodnih kanalov, jezov, namakalnih jarkov) ali sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

4.5.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.5.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

4.6. Opis uporabe

Tabela 6. Podgane – usposobljeni poklicni uporabniki – kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Ni pomembno za rodenticide
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: drugo: Rjava podgana Razvojna faza: drugo: vse
Področje(-a) uporabe	drugo: Drugo Kanalizacija
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena za pritrditev ali uporabo v postajah, vendar vaba ne sme priti v stik z odpadno vodo. Pokrita in zaščitena mesta za nastavljene vabe, vendar vaba ne sme priti v stik z odpadno vodo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri napadu podgan nastavite 10 g do 200 g vabe na jašek. V primeru prisotnosti velikega števila glodavcev nastavite po 200 g vabe v jašek.

	Število in časovni raspored uporabe: Redno preverjajte porabo vabe in nadomestite porabljeno ali raztreseno vabo, dokler se poraba ne ustavi. Postopek ponovite v kolikor obstajajo dokazi o novem napadu (npr. sveže sledi ali iztrebki). V prvih 10-14 dneh pogosto preverjajte nastavitvena mesta.
Skupina(-e) uporabnikov	usposobljeni strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Minimalna velikost pakiranja 3 kg. Maksimalno zunanje pakiranje do 25 kg. Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v polietilenske (PE), polipropilenske (PP), PE/PP ali papir/PE vrečke, ki so pakirane v kartonsko zloženko do 20 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP vreči do 25 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v PE ali PP zabojniku (posodi) do 25 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v HDPE ali PP vedru do 20 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke do 20 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v škatle iz kartona ali lepenke s PE vrečko ali podlogo do 20 kg Blok (z ali brez kavljca/žice) v masah 3.5 g - 200 g pakirani v natron vreči do 25 kg Rodentomatik - postaja za vabe za zatiranje miši (HDPE ali PP), ki je odporna proti poseganju, pred-polnjena ali z možnostjo ponovnega polnjenja, ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg HDPE ali PP postaja za vabe za zatiranje miši (z možnostjo ponovnega polnjenja ali za enkratno uporabo), ki vsebuje enega ali več blokov v masah 3.5 g - 200 g. Postaje so pakirane v kartonsko škatlo ali v zavarjeno plastično embalažo ali v toplotno krčljivo plastično folijo do 20 kg

4.6.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Vabe je treba nastaviti tako, da ne pridejo v stik z vodo in jih voda ne odplakne.
- Upoštevajte morebitna dodatna navodila iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

4.6.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Vabe smete nameščati samo v kanalizacijske sisteme, ki so povezani s čistilnimi napravami.
- Proizvoda ne uporabljajte v intervalih (pulsed baiting).

4.6.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej točko 5.3

4.6.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej točko 5.4

4.6.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej točko 5.5

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Poklicni uporabniki:

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev. Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane).
- Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamažite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
- Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvreči iz postaje za nastavljanje vab.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374). Pri odstranjevanju izdelka nosite primerno zaščitno opremo za dihanje (npr. Zaščitna očala ali filtrirni respirator za enkratno uporabo, vsaj EN149 FFP2 ali enakovredno).
- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite.
- Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
- Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
- Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.
- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

Usposobljeni poklicni uporabniki:

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Razen tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.
- Proizvod nastavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).
- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
- Postaje morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

-
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.
 - Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvreči iz postaje.
 - Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
 - Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
 - Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374). Pri odstranjevanju izdelka nosite primerno zaščitno opremo za dihanje (npr. Zaščitna očala ali filtrirni respirator za enkratno uporabo, vsaj EN149 FFP2 ali enakovredno).
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
 - Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja.
 - Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.
 - Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
 - Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
 - Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.
 - Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Poklicni uporabniki:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve iščite in odstranjujte poginule glodavce dovolj pogosto med obdobjem tretiranja (npr. najmanj dvakrat tedensko).
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.
- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:
 - proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);
 - se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;
 - morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod).
- Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh.
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.
- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.
- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

Usposobljeni poklicni uporabniki:

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev [v skladu z veljavnim kodeksom dobre prakse, če je na voljo].
- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“).
- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino.
- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda [razen v primerih, ko se uporablja kot stalna vaba].
- Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo.
- Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.

-
- Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščitenih mestih za vabo, ne umivajte z vodo.
 - Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant.
- Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.
- V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
- V primeru:
 - izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
 - izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo najmanj 10 minut, medtem, ko veke držite odprte.
 - oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo.
- Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.
- Ne izzivajte bruhanja.
- Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.
- Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.
- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „ime proizvoda in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.
- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki. [...]

Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabnosti: 2 leti

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni po zaužitju vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.
- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.

Celotni P-stavki:

P314 - Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.