



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/20-12/56
URBROJ: 534-07-1/6-20-2
Zagreb, 9. ožujka 2020.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, Lyon, Francuska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, Lyon, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Rodex Whole Wheat Bait**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **19.3.2023.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, Lyon, Francuska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Velike Britanije, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda **Rodex Whole Wheat Bait**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 19.3.2023. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay, Lyon, Francuska
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Rodex Whole Wheat Bait

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/20-12/56; URBROJ: 534-07-1/6-20-2

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0023477-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	Rodex žitni mamac Pro
-----------------	-----------------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Ainay, Lyon, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/1-543-04/20-12/56	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0023477-0000	
Datum odobrenja	9.3.2020.	
Datum isteka odobrenja	19.3.2023.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo Doa Rat Bait Production Center, Mesokeleos street, Palouriotissa, Nicosia Cipar Promedivet SRL, str. Lunga nr. 46/G, 545500 SOVATA Rumunjska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Bromadiolon
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13 Newman Lane, GU34 2QR Alton Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Prazska 54, 280 02 Kolin Češka

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Aktivna tvar	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H360D Može naškoditi nerođenom djetetu. H372 Uzrokuje oštećenje organa (krvi) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti . EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute. P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti. P260 Ne udisati prašinu. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P280 Nositi zaštitne rukavice. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti savjet liječnika. P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj u/na skladu s važećim propisima o opasnom otpadu.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Osposobljeni profesionalni korisnici– u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> Kućni miš Odrasle i mlade jedinke <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor Odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac spreman za primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce, osigurane od neovlaštenog otvaranja - Primjena na prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja
Količine kod primjene i učestalost	Štakori: do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Miševi: do 40 g mamca po mjestu izlaganja. - - Štakori: - Jaka infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Miševi: - Jaka infestacija: do 40 g mamca po mjestu izlaganja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 40 g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara.

Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg): Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg. Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg</p> <p>2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg. Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg. Kartonska kutija 5 kg do 10 kg</p> <p>3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.</p>

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Na kraju tretiranja ukloniti ostatke proizvoda.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kada se kutije sa mamcem postavljaju u blizini sustava za odvodnju, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Mus musculus</i> Kućni miš Odrasle i mlade jedinke <i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor Odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom uokolo zgrada
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac spreman za primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce. - Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja - Izravna primjena mamca u jazbine glodavaca
Količine kod primjene i učestalost	Štakori: do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Miševi: do 40 g mamca po mjestu izlaganja. Štakori: - Jaka infestacija: do 200g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. Miševi: - Jaka infestacija: do 40g mamca po mjestu izlaganja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 40g mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Postavljanje mamca u jazbine glodavaca: 20-200 g mamca po jazbini.

Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg):</p> <p>Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg. Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg</p> <p>2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg. Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg. Kartonska kutija 5 kg do 10 kg</p> <p>3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.</p>

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavljanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
- Mamci se moraju postaviti na način da je izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanjena na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba pokriti ili na drugi način zatvoriti kako bi se smanjio rizik od odbacivanja i

prosipanja mamaca.

- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje..

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže Vidi "Smjernice za uporabu"

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – Osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenim područjima i odlagalištima otpada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor Odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom - otvorena područja Na otvorenom - odlagališta otpada
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac za izravnu primjenu za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce. - Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja. - Izravna primjena mamca u jazbine glodavaca.
Količine kod primjene i učestalost	do 200 g mamca po mjestu izlaganja. Izravna primjena u jazbine: 20-200 g mamca po jazbini. Štakori: - Jaka infestacija: do 200bg mamca po mjestu izlaganja svakih 5 metara. - Blaga infestacija: do 200 g mamca po mjestu izlaganja svakih 10 metara. - Postavljanje mamca u jazbine glodavaca: 20-200 g mamca po jazbini.

Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg): Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg. Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg Kanister of polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg</p> <p>2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg. Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg. Kartonska kutija 5 kg do 10 kg</p> <p>3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima: Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.</p>

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti postavljeni mamac ako ga je oštetila voda ili je onečišćen zemljom.
- Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac. [Nije primjenjivo u slučaju primjene izravno u jazbine].
- Mamci se moraju postaviti na način da je izloženost ne-ciljnih vrsta i djece smanjena na najmanju moguću mjeru. Ulaz u jazbinu treba pokriti ili na drugi način zatvoriti kako bi se smanjio rizik od odbacivanja i prosipanja mamaca.
- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca moraju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima

je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Gdje je to moguće, prije tretiranja obavijestiti stanare i korisnike prostora koji će se tretirati i okolice o akciji suzbijanja glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (u skladu s važećim Kodeksom najbolje prakse).
- Ne koristiti pripravak za pulsno izlaganje.

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4. Opis uporabe

Tablica 4. Uporaba br. 4 – Osposobljeni profesionalni korisnici – kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	<i>Rattus norvegicus</i> Smeđi štakor Odrasle i mlade jedinke
Područje primjene	Kanalizacija
Načini primjene	primjena mamaca - Mamac za izravnu primjenu u kanalizaciji pričvršćivanjem ili postavljanjem u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce koje sprječavaju da mamac dođe u dodir s otpadnim vodama. - Prekrivena i zaštićena mjesta izlaganja
Količine kod primjene i učestalost	do 200 g mamca po kanalizacijskom oknu do 200 g mamca po kanalizacijskom oknu
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1. Rasuti mamac - Unutarnje pakiranje ne smije biti veće od 10 kg. Pakiranja dolaze sa unutarnjim pakiranjima u obliku vreća od PET(E), HDPE ili LDPE (do 10 kg) zaveznih sa žicom (do 20 kg) ili bez žice (do 10 kg): Polipropilenska vreća iznutra obložena polietilenom ili višeslojna papirna vreća ili lamelirana vreća od polietilena/polipropilena 5 kg do 20 kg

Kutije od dvoslojnog valovitog kartona iznutra obložene polietilenom 5 kg do 10 kg
Vreća od polietilena/papira u kartonskoj kutiji 5 kg do 10 kg.
Kanta od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg
Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg
Kanister od polipropilena ili polietilena 5 kg do 10 kg
Vreće od polietilena ili vreće od polipropilena/papira ili vreće od orijentiranog polipropilena ili vreće od polietilena/aluminija ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg
Vreće od polipropilena ili vreće od laminiranog polipropilena ili vreće od PET/polietilena ili vreće od polietilena/papira/aluminija. Isporučeno bez vanjskog pakiranja ili u kartonskoj kutiji iznutra s ili bez polietilenske obloge ili u polietilenskom pakiranju ili u polipropilenskom pakiranju ili u blister pakiranju 5 kg do 10 kg

2. Mamac u vrećicama/pakiranjima za izravnu primjenu

Mamac u perforiranim ili neperforiranim vrećicama od folije od polipropilena/papira, vrećice od folije od PET/polietilena, vrećice od folije polietilena/papira ili vrećice od folije polietilena/aluminija (10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:
Vreća od pletenog polipropilena ili višeslojna papirna vreća. 5 kg do 25 kg
Kanta od polipropilena 5 kg do 20 kg
Vjedro od polipropilena ili polietilena 5 kg do 20 kg.
Vreća od PET/polietilena, polipropilena/polietilena ili papira/polietilena 5 kg do 10 kg
Kanister, s navojnim čepom otpornim na neovlašteno otvaranje. 5 kg.
Kartonska kutija 5 kg do 10 kg

3. Mamac u kadicama ((od PVC-a ili polistirena ili polipropilena ili PET-a ili PET-a/polietilena ili vlaknaste ploče); 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g ili 200 g)) s toplinski zabrtvljenim poklopcem (od PET-a/polipropilena ili PET-a/polietilena ili polipropilena) isporučivo u sljedećim vanjskim pakiranjima:

Kartonska kutija 5 kg do 6,4 kg
Kutija za izlaganje mamca za jednokratnu ili višekratnu primjenu od HDPE ili PP, pakirano po 1, 2 ili 4 kom u kartonsku kutiju ili blister pakiranje ili kartonsku vrećicu ili toplinski zabrtvljenu vrećicu ili u vrećici od višeslojne plastike sa toplinski zabrtvljenom kartonskim vrhom. Pakirano po 4, 8, 16, 24, 32, 48, 60, 72, 96, 100, 120, 144 kom 5 kg do 20 kg.

4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamce treba postaviti na način da ne dođu u dodir s vodom i da ih voda ne može odnijeti.

4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Proizvod ne koristiti u tretmanima s pulsanim postavljanjem mamca.

4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidi "Smjernice za uporabu"

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidi "Smjernice za uporabu"

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
 - Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
 - Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpatke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
 - Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
 - Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
 - Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
 - Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
 - Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
 - Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
 - Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
 - Tijekom rukovanja s pripravkom treba nositi rukavice otporne na kemikalije.
 - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu. Nakon primjene pripravka treba oprati ruke ili izravno izloženu kožu.
 - Učestalost kontrole tretiranog područja treba odrediti nadležni operater, u skladu s provedenom inicijalnom procjenom infestacije. Ta bi učestalost trebala biti u skladu s preporukama iz relevantnog kodeksa najbolje prakse.
 - Jazbine u koje su postavljeni mamci treba posjećivati češće od onih mjesta na kojima se koriste zaštitne kutija za mamce.
 - Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
 - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca
-
- Mamac u vrećicama: Ne otvarati vrećice koje sadrže mamac.
 - Rasuti mamac: Mamac postaviti koristeći pribor za doziranje. Specificirati metode smanjenja stvaranja prašine (npr. brisanje mokrom krpom/ubrusom).

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike (npr. korisnike tretiranog područja i njihovu okolinu) o provođenju deratizacijskih mjera.
- Ne upotrebljavati u područjima gdje postoji sumnja na otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Antikoagulantne rodenticide iste ili slabije jačine ne upotrebljavati naizmjenično tijekom provođenja tretmana, zbog sprječavanja razvoja rezistencije. Za naizmjeničnu uporabu treba koristiti ne-antikoagulantne rodenticide, ako su dostupni, ili jače antikoagulantne rodenticide.
- Kutije za mamce ili pribor korišten za prekrivanje mamaca ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i uključuju krvarenje iz nosa i desni. U težim slučajevima otrovanja, moguća je pojava modrica i prisustvo krvi u stolici i mokraći.
- Antidot: Vitamin K1 koje primjenjuje samo medicinsko/veterinasko osoblje.
- U slučaju:
 - Dodira s kožom: oprati izloženu kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
 - Dodira s očima: držeći prstima otvorene očne kapke, isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, ispirati najmanje 10 minuta.
 - Gutanja: oprezno usta isprati vodom. Osobi bez svijesti nikada ništa davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili etiketu.
- Ako je kućni ljubimac progutao proizvod, potražiti savjet veterinaru.
- Kutije za izlaganje mamaca moraju imati istaknute sljedeće informacije: "ne micati i ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "ime proizvoda i broj odobrenja"; "aktivna tvar(i)" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja [01/2348-342]".
- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Po završetku tretiranja, zbrinuti ostatke mamca i pakiranje u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračnom mjestu. Spremnik držati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla.
Pohraniti na mjestu koje je nepristupačno djeci, pticama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.

- Rok valjanosti: 2 godine.

6. OSTALE INFORMACIJE

- Zbog odgođenog početka djelovanja antikoagulantnih rodenticida, nakon njihova uzimanja, potrebno je od 4 do 10 dana do pojave simptoma otrovanja.
- Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, prilikom njihova odlaganja koristiti rukavice ili alate kao što su klijesta.
- Ovaj proizvod sadrži gorku tvar i boju.