

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

Rodex Pasta Bait

Tipo(s) de produto

PT14: Rodenticidas

Número de autorização: PT/DGS ARMPB-trs40/2019

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0010137-0000

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Micetec Pasta
-----------------------------------	---------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	PelGar International Limited
	Endereço	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon França
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-trs40/2019	
Número da decisão de autorização R4BP	PT-0010137-0000	
Data da autorização	19/11/2012	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	PelGar International Limited
Endereço do fabricante	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Bromadiolona
Nome do fabricante	PelGar International Limited
Endereço do fabricante	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
Localização das instalações de fabrico	Prazska 54 280 02 Kolin Chéquia

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Bromadiolona	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substância ativa	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	<p>H360D: Pode afetar o nascituro.</p> <p>H372: Afeta os órgãos {0:ou indicar todos os órgãos afetados, se forem conhecidos:} após exposição prolongada ou repetida {1:indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição:}.</p>
Recomendações de prudência	<p>P201: Pedir instruções específicas antes da utilização.</p> <p>(P202): Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.</p> <p>P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.</p> <p>P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.</p> <p>P280: Usar luvas de proteção.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Armazenar em local fechado à chave.</p> <p>P501: Eliminar conteúdo em num local de eliminação licenciado ou através de recolha licenciada para eliminação de resíduos perigosos, exceto os recipientes vazios que podem ser descartados como resíduos não perigosos...</p>

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Uso #1 – Ratos domésticos e ratazanas – Utilizadores profissionais com competência demonstrada (equivalente a profissionais treinados) - interior

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: Rato doméstico Estadio de desenvolvimento: outro: Todos Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: outro: Ratazana castanha Estadio de desenvolvimento: outro: Todos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Interior
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Formulações de isco: - Isco pronto a utilizar para uso em estações de isco invioláveis - Pontos de isco cobertos e protegidos
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. Ratos: - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros. Número e calendário da aplicação: Produtos de isco: Ratazanas: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. Ratos: - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em embalagem exterior de cartão - Entre 3kg e 14.4kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em caixas de isco invioláveis pré-carregadas ou recarregáveis em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg.

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 10 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 15 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratazanas, em HDPE ou polipropileno, inviolável ou pré-cheia, contendo 10 ou 12 saquetas de 15 g presas numa barra metálica. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

<p>Tubos de mástique de 0.1, 0.15, 0.2 ou 0.3 kg para aplicação com pistola de calafetagem. Os tubos de mástique são fornecidos unitariamente ou em múltiplos em embalagem exterior de cartão – 0.3 a 3.6 kg</p> <p>Pasta solta em embalagem de polipropileno ou polietileno para aplicação com faca ou espátula – 3 a 5 kg</p> <p>“Salsicha” de 200 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratazanas, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg</p> <p>“Salsicha” de 30 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratos, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg</p>
--

4.1.1. Instruções específicas de utilização

- Remover os restos de produto no final do período de tratamento

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.1.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar qualquer possível observador (por exemplo, usuários da área tratada e seus arredores) sobre a campanha de controlo de roedores.

- Considerar medidas de controlo preventivo (por exemplo, tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinvasão.

- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos em intervalos frequentes durante o tratamento, de acordo com as recomendações do código de boas práticas relevante.

- Não usar este produto como isco permanente para prevenção de infestações de roedores ou para monitorizar a atividade de roedores.

- Não usar este produto em tratamentos de iscagem em pulsos.

4.1.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Quando são colocados pontos de isco junto sistemas de drenagem de água, assegurar que o contacto do isco com a água é evitado.

4.1.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5.4

4.1.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5.4

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2. Uso #2 – Ratos e ratazanas – Utilizadores profissionais com competência demonstrada (equivalente a profissionais treinados) - exterior junto de edifícios

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Rattus norvegicus Nome comum: outro: Ratazana castanha Estadio de desenvolvimento: outro: Todos Nome científico: Mus musculus Nome comum: outro: Rato doméstico Estadio de desenvolvimento: outro: Todos
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior Exterior – junto de edifícios
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Formulações de isco: - Isco pronto a utilizar para uso em estações de isco invioláveis - Pontos de isco cobertos e protegidos - Aplicação direta em tocas de isco pronto a utilizar
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratazanas: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. Ratos: - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros Número e calendário da aplicação: Produtos de isco Ratazanas: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. Ratos: - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros. Aplicação em tocas: 20-200 g de isco por toca.
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação

<p>Capacidade e material da embalagem</p>	<p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em embalagem exterior de cartão - Entre 3kg e 14.4kg.</p> <p>Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em caixas de isco invioláveis pré-carregadas ou recarregáveis em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg.</p> <p>Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 10 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg</p> <p>Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 15 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg</p>
---	--

Estação de isco para ratazanas, em HDPE ou polipropileno, inviolável ou pré-cheia, contendo 10 ou 12 saquetas de 15 g presas numa barra metálica. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Tubos de mástique de 0.1, 0.15, 0.2 ou 0.3 kg para aplicação com pistola de calafetagem. Os tubos de mástique são fornecidos unitariamente ou em múltiplos em embalagem exterior de cartão – 0.3 a 3.6 kg

Pasta solta em embalagem de polipropileno ou polietileno para aplicação com faca ou espátula – 3 a 5 kg

“Salsicha” de 200 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratazanas, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

“Salsicha” de 30 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratos, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

4.2.1. Instruções específicas de utilização

- Proteger o isco das condições atmosféricas. Colocar as estações de isco em zonas não sujeitas a inundação.
- Substituir qualquer isco em pontos de isco em que este tenha sido danificado pela água ou contaminado por sujidade.
- Remover os restos de produto no final do período de tratamento (exceto quando aplicados diretamente em tocas).
- Na utilização em exterior, os pontos de isco devem ser cobertos ou colocados em locais estratégicos de modo a minimizar a exposição de espécies não alvo.
- Os iscos devem ser colocados de modo a minimizar a exposição a espécies não alvo e crianças. Cobrir ou bloquear as entradas em tocas tratadas para reduzir o risco de o isco ser rejeitado ou estragado. Seguir quaisquer instruções adicionais do CRRU UK Code of Best Practice (ou equivalente).

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.2.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar qualquer possível observador (por exemplo, usuários da área tratada e seus arredores) sobre a campanha de controlo de roedores.
- Considerar medidas de controlo preventivo (por exemplo, tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinvasão.
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos em intervalos frequentes durante o tratamento, de acordo com as recomendações do código de boas práticas relevante.
- Não usar este produto como isco permanente para prevenção de infestações de roedores ou para monitorizar a atividade de roedores.
- Não usar este produto em tratamentos de iscagem em pulsos.

4.2.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Quando são colocados pontos de isco junto a águas superficiais (p. ex. rios, lagos, canais de água, diques e sistemas de rega) ou sistemas de drenagem de água, assegurar que o contacto do isco com a água é evitado.

4.2.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5.4

4.2.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5.5

4.3. Descrição de utilizações

Tabela 3. Uso #3 – Ratazanas – Utilizadores profissionais com competência demonstrada (equivalente a profissionais treinados) - esgotos

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Rattus norvegicus</i> Nome comum: outro: Ratazana castanha Estadio de desenvolvimento: outro: Todos
Campo(s) de utilização	outro: Other Esgotos
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco Descrição detalhada: Isco pronto a utilizar em esgotos para fixação ou aplicação em estações de isco que impeçam o isco de contactar com águas residuais Pontos de isco cobertos e protegidos
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. Número e calendário da aplicação:

	<p>Produtos de isco</p> <p>Ratazanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação
Capacidade e material da embalagem	<p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em embalagem exterior de cartão - Entre 3kg e 14.4kg.</p> <p>Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em caixas de isco invioláveis pré-carregadas ou recarregáveis em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg.</p> <p>Estação de isco para ratazanas, em HDPE ou polipropileno, inviolável ou pré-cheia, contendo 10 ou 12 saquetas de 15 g presas numa barra metálica. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg</p> <p>Tubos de mástique de 0.1, 0.15, 0.2 ou 0.3 kg para aplicação com pistola de calafetagem. Os tubos de mástique são fornecidos unitariamente ou em múltiplos em embalagem exterior de cartão – 0.3 a 3.6 kg</p> <p>Pasta solta em embalagem de polipropileno ou polietileno para aplicação com faca ou espátula – 3 a 5 kg</p> <p>“Salsicha” de 200 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratazanas, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg</p>

--	--

4.3.1. Instruções específicas de utilização

- Os iscos devem ser aplicados de modo a que não contactem nem sejam levados por água.

4.3.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.3.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- Não usar este produto em tratamentos de iscagem em pulsos.

4.3.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5.3

4.3.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5.4

4.3.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5.5

4.4. Descrição de utilizações

Tabela 4. Uso #4 – Ratos domésticos e ratazanas – Utilizadores profissionais - interior - NÃO RELEVANTE NO REINO UNIDO

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: outro: Rato doméstico

	<p>Estádio de desenvolvimento: outro: Adultos e jovens</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus</p> <p>Nome comum: outro: Ratazana castanha</p> <p>Estádio de desenvolvimento: outro: Adultos e jovens</p>
Campo(s) de utilização	<p>utilização em interiores</p> <p>Interior</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco</p> <p>Descrição detalhada: - Isco pronto a utilizar para uso em estações de isco invioláveis</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros.</p> <p>Número e calendário da aplicação:</p> <p>Ratazanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. <p>Ratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.</p>

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em embalagem exterior de cartão - Entre 3kg e 14.4kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em caixas de isco invioláveis pré-carregadas ou recarregáveis em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg.

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 10 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 15 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratazanas, em HDPE ou polipropileno, inviolável ou pré-cheia, contendo 10 ou 12 saquetas de 15 g presas numa barra metálica. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Tubos de mástique de 0.1, 0.15, 0.2 ou 0.3 kg para aplicação com pistola de calafetagem. Os tubos de mástique são fornecidos unitariamente ou em múltiplos em embalagem exterior de cartão – 0.3 a 3.6 kg

Pasta solta em embalagem de polipropileno ou polietileno para aplicação com faca ou espátula – 3 a 5 kg

“Salsicha” de 200 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratazanas, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

“Salsicha” de 30 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratos, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

4.4.1. Instruções específicas de utilização

- Para ratos: As estações de isco devem ser observadas pelo menos a cada 2 a 3 dias no início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remover roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco sempre que necessário.

- Para ratazanas: As estações de isco devem ser observadas apenas passados 5 a 7 dias depois do início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remover roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco sempre que necessário.

- [Quando disponível] Seguir quaisquer instruções do código de boas práticas relevante.

4.4.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.4.3. Medidas de mitigação do risco específicas

Ver Instruções de Utilização

4.4.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Quando são colocados pontos de isco junto sistemas de drenagem de água, assegurar que o contacto do isco com a água é evitado.

4.4.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver Instruções de Utilização

4.4.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver Instruções de Utilização

4.5. Descrição de utilizações

Tabela 5. Uso #5 – Ratos e ratazanas – Utilizadores profissionais - exterior junto de edifícios - NÃO RELEVANTE NO REINO UNIDO

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não relevante para rodenticidas
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: <i>Mus musculus</i> Nome comum: outro: Rato doméstico

	<p>Estádio de desenvolvimento: outro: Adultos e jovens</p> <p>Nome científico: Rattus norvegicus</p> <p>Nome comum: outro: Ratazana castanha</p> <p>Estádio de desenvolvimento: outro: Adultos e jovens</p>
Campo(s) de utilização	<p>utilização no exterior</p> <p>Exterior – junto de edifícios</p>
Método(s) de aplicação	<p>Método: Aplicação de isco</p> <p>Descrição detalhada: - Isco pronto a utilizar para uso em estações de isco invioláveis</p>
Frequência de aplicação e dosagem	<p>Taxa de aplicação: - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros.</p> <p>Número e calendário da aplicação:</p> <p>Ratazanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestações elevadas – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 5 metros. - Infestações ligeiras – até 200g de isco por ponto de isco, a cada 10 metros. <p>Ratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infestações elevadas – até 40g de isco por ponto de isco, a cada 2 metros. - Infestações ligeiras – até 40g isco por ponto de isco, a cada 5 metros.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	<p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em embalagem revestida de polietileno com baixa de cartão exterior. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em balde, contentor ou jerrican de polietileno ou polipropileno. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.</p> <p>Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em papel/polietileno/alumínio ou polipropileno ou</p>

polipropileno laminado ou bolsas PET/polietileno, com ou sem embalagem exterior em cartão. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratos, saquetas de papel edível de 10 g ou 15 g ou 20 g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Para controlo de ratazanas, apenas as saquetas de papel edível de 20g em caixa revestida de polietileno. - Entre 3kg e 20kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em embalagem exterior de cartão - Entre 3kg e 14.4kg.

Bandeja plástica (PVC, PS, PET/PE, PP or PE) de isco com 25, 30, 50, 75, 100, 150 ou 200g com tampa termosselada em caixas de isco invioláveis pré-carregadas ou recarregáveis em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg.

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 10 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratos, em HDPE ou polipropileno, inviolável pré-cheia ou recarregável, contendo 1 ou 2 saquetas de 15 g. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Estação de isco para ratazanas, em HDPE ou polipropileno, inviolável ou pré-cheia, contendo 10 ou 12 saquetas de 15 g presas numa barra metálica. Estações de isco embaladas em múltiplos em embalagem exterior de cartão ou blister ou manga de cartão ou saco termosselado ou plástico termosselado com revestimento exterior de cartão - 3 a 20 kg

Tubos de mástique de 0.1, 0.15, 0.2 ou 0.3 kg para aplicação com pistola de calafetagem. Os tubos de mástique são fornecidos unitariamente ou em múltiplos em embalagem exterior de cartão – 0.3 a 3.6 kg

Pasta solta em embalagem de polipropileno ou polietileno para aplicação com faca ou espátula – 3 a 5 kg

“Salsicha” de 200 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratazanas, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

“Salsicha” de 30 g em película de polietileno numa embalagem exterior de colagénio ou polietileno para uso em caixas de isco para ratos, em embalagem exterior de cartão de fibra – 3 a 10kg

4.5.1. Instruções específicas de utilização

- Proteger o isco das condições atmosféricas (por exemplo, chuva, neve, etc.). Colocar as estações de isco em zonas não sujeitas a inundação.

- Para ratos: As estações de isco devem ser observadas pelo menos a cada 2 a 3 dias no início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remover roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco sempre que necessário.

- Para ratazanas: As estações de isco devem ser observadas apenas passados 5 a 7 dias depois do início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remover roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco sempre que necessário.

- Substituir qualquer isco numa estação de isco em que este tenha sido danificado pela água ou contaminado por sujidade.

- [Quando disponível] Seguir quaisquer instruções do código de boas práticas relevante.

4.5.2. Medidas de mitigação do risco específicas

4.5.3. Medidas de mitigação do risco específicas

- Não aplicar este produto diretamente em tocas.

4.5.4. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Quando são colocadas estações de isco junto a águas superficiais (p. ex. rios, lagos, canais de água, diques e sistemas de rega) ou sistemas de drenagem de água, assegurar que o contacto do isco com a água é evitado.

4.5.5. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver Instruções de Utilização

4.5.6. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Utilizadores profissionais treinados

- Antes de usar o produto ler e seguir a informação do produto, bem como qualquer informação adicional que acompanhe o produto ou que seja fornecida no ponto de venda.
- Antes do tratamento, fazer uma pré-avaliação da área infestada para identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade, bem como a causa provável e a extensão da infestação.
- Remover o alimento que seja facilmente atingível pelos roedores (por exemplo, grãos derramados ou resíduos alimentares). Além disto, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois isso perturba a população de roedores e dificulta a aceitação do isco.
- O produto só deve ser usado como parte de um programa integrado de controlo de pragas (IPM) que inclua, entre outras, medidas de higiene e, sempre que possível, métodos de controlo físicos.
- O produto deve ser colocado nas imediações de locais onde a atividade de roedores foi previamente identificada (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, locais de aglomeração de animais, buracos, tocas etc.).
- Sempre que possível, as estações de isco devem ser presas ao solo ou a outras estruturas.
- As estações de isco deve estar claramente rotuladas, indicando que contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas (ver secção.5.3 para informação a apresentar na rotulagem do produto).
- O isco deve ficar preso de modo a que não possa ser arrastado para fora da estação de isco
- Colocar o produto fora do alcance das crianças, aves, animais de companhia, espécies pecuárias e outras espécies não alvo.
- Colocar o produto afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que com eles contactem.
- Usar luvas protetoras resistentes a químicos durante o manuseamento do produto (material das luvas a especificar pelo detentor da autorização na informação que acompanha o produto).
- Não comer, não beber e não fumar durante a utilização do produto. Lavar as mãos e as zonas da pele expostas depois de utilizar o produto.
- A frequência das visitas e observação das áreas tratadas deve ser do critério do operador, tendo em consideração a avaliação realizada no início do tratamento. Esta frequência deve ser consistente com as recomendações do CRRU UK Code of Best Practice (ou equivalente).
- Os locais onde é usado isco em tocas devem ser observados com maior frequência do que aqueles em que são usadas caixas de isco seguras.
- Se a captação de isco for baixa tendo em consideração a dimensão aparente da infestação, considerar a alteração dos pontos de isco para outros locais e a possibilidade de alterar para outra formulação de isco.
- Se passado um período de tratamento de 35 dias, o isco continuar a ser consumido e não for visível um declínio da atividade dos roedores, deve ser determinada uma causa provável para a situação. Depois de excluir outras possibilidades, pode tratar-se de resistência por parte dos roedores, sendo assim necessário considerar a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se disponível, ou de um rodenticida coagulante mais potente. Considerar também a utilização de armadilhas como medida alternativa de controlo.
- Pasta:
Colocar a pasta com um aplicador suficientemente longo (espátula) que reduza a exposição das mãos – evitar atingir o balde.

Utilizadores profissionais

- Antes de usar o produto ler e seguir a informação do produto, bem como qualquer informação adicional que acompanhe o produto ou que seja fornecida no ponto de venda.
- Antes do tratamento, fazer uma pré-avaliação da área infestada para identificar as espécies de roedores e os seus locais de atividade, bem como a causa provável e a extensão da infestação.
- Remover o alimento que seja facilmente atingível pelos roedores (por exemplo, grãos derramados ou resíduos alimentares). Além disto, não limpar a área infestada imediatamente antes do tratamento, pois isso perturba a população de roedores e dificulta a aceitação do isco.
- O produto só deve ser usado como parte de um programa integrado de controlo de pragas (IPM) que inclua, entre outras, medidas de higiene e, sempre que possível, métodos de controlo físicos.

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

-
- Considerar medidas de controlo preventivo (por exemplo, tapar furos, remover possíveis alimentos e bebidas) para melhorar a ingestão do produto e reduzir a probabilidade de reinvasão.
 - As estações de isco devem ser colocadas nas imediações de locais onde a atividade de roedores foi previamente identificada (por exemplo, trilhos, locais de nidificação, locais de aglomeração de animais, buracos, tocas etc.).
 - Sempre que possível, as estações de isco devem ser presas ao solo ou a outras estruturas.
 - As estações de isco devem estar claramente rotuladas, indicando que contêm rodenticidas e que não devem ser movidas ou abertas (ver secção.7.3 para informação a apresentar na rotulagem do produto).
 - [Se as políticas ou legislação nacional exigirem] Quando o produto é usado em áreas publicas, as áreas tratadas devem ser identificadas durante o período de tratamento e incluída informação junto do isco especificando o risco de envenenamento primário e secundário por um anticoagulante e identificando as primeiras medidas a adotar em caso de envenenamento
 - O isco deve ficar preso de modo a que não possa ser arrastado para fora da estação de isco
 - Colocar o produto fora do alcance das crianças, aves, animais de companhia, espécies pecuárias e outras espécies não alvo.
 - Colocar o produto afastado de alimentos, bebidas e alimentos para animais, bem como de utensílios ou superfícies que com eles contactem.
 - Usar luvas protetoras resistentes a químicos durante o manuseamento do produto (material das luvas a especificar pelo detentor da autorização na informação que acompanha o produto).
 - Não comer, não beber e não fumar durante a utilização do produto. Lavar as mãos e as zonas da pele expostas depois de utilizar o produto.
 - Se a captura de isco for baixa tendo em consideração a dimensão aparente da infestação, considerar a alteração dos pontos de isco para outros locais e a possibilidade de alterar para outra formulação de isco.
 - Se passado um período de tratamento de 35 dias, o isco continuar a ser consumido e não for visível um declínio da atividade dos roedores, deve ser determinada uma causa provável para a situação. Depois de excluir outras possibilidades, pode tratar-se de resistência por parte dos roedores, sendo assim necessário considerar a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se disponível, ou de um rodenticida coagulante mais potente. Considerar também a utilização de armadilhas como medida alternativa de controlo.
 - Remover os restos de isco no final do tratamento.
 - Para saquetas não esvaziáveis – Não abrir as saquetas que contêm o isco.
 - Usar uma espátula para limpeza / eliminação do isco após utilização.

5.2. Medidas de redução do risco

Utilizadores profissionais treinados

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar qualquer possível observador sobre a campanha de controlo de roedores
- Não usar em áreas em que se suspeite de resistência ao ingrediente ativo.
- O produto não deve ser usado durante mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não fazer rotação de diferentes anticoagulantes com potência comparável ou mais fraca com objetivo de controlo da resistência. Para rotação, considerar a utilização de um rodenticida não anticoagulante, se disponível, ou de um anticoagulante mais potente.
- Entre aplicações, não lavar com água as estações de isco ou utensílios usados para cobrir ou proteger os pontos de isco.
- Eliminar os roedores mortos de acordo com as exigências locais

Apenas Reino Unido: No Reino Unido os roedores mortos podem ser eliminados por um produtor de resíduos numa incineradora ou aterro autorizado a aceitar esse tipo de resíduo, ou recolhidos por um transportador de resíduos registado e transportados para um local autorizado adequado. Para informação adicional contactar a Environment Agency (<http://www.environment-agency.gov.uk>) ou SEPA (<http://www.sepa.org.uk>).

Apenas Reino Unido: Para ser usado apenas por utilizadores usuários profissionais detentores de certificação que demonstre conformidade com as exigências do regime de aplicação de rodenticidas do Reino Unido.

Apenas Reino Unido: Leia o rótulo antes de utilizar o produto. A utilização deste produto de uma forma inconsistente com a referida no rótulo pode ser considerada um delito. Tenha em consideração do CRRU UK Code of Best Practice (ou equivalente) para orientação.

Apenas Reino Unido: Quando este produto é fornecido a um utilizador para controlo de roedores, deve sê-lo apenas a um utilizador profissional com certificação que demonstre conformidade com os requisitos do regime de aplicação de rodenticidas do Reino Unido.

Utilizadores profissionais

- Sempre que possível, antes do tratamento, informar qualquer possível observador sobre a campanha de controlo de roedores
- Para reduzir o risco de envenenamento secundário, procurar e remover roedores mortos em intervalos frequentes durante o tratamento (por exemplo, pelo menos duas vezes por semana)
- O produto não deve ser usado durante mais de 35 dias sem ser realizada uma avaliação do estado da infestação e da eficácia do tratamento.
- Não usar isco com substâncias ativas anticoagulantes como isco permanente para prevenção de infestações de roedores ou para monitorizar a atividade de roedores
- A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto informativo) deve referir claramente que o produto não deve ser disponibilizado ao público em geral (por exemplo “apenas para uso profissional”)
- A utilização deste produto deve eliminar os roedores em 35 dias. A informação do produto (ou seja, o rótulo e/ou o folheto informativo) deve referir claramente que em caso de suspeita de eficácia no final do tratamento (por exemplo, se ainda for observada atividade de roedores), o utilizador deve aconselhar-se junto do fornecedor do produto ou contactar um serviço de controlo de pragas
- Entre aplicações, não lavar as estações de isco com água
- Eliminar os roedores mortos de acordo com a legislação local

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Este produto contém uma substância anticoagulante. Se for ingerido, os sintomas, que podem ser tardios, podem incluir hemorragia nasal ou gengival. Nos casos graves podem formar-se hematomas e estar presente sangue nas fezes e urina.

- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por médicos/médicos veterinários.

- Em caso de:

Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.

Exposição ocular, lavar os olhos com líquido de limpeza ocular ou com água, manter as pálpebras abertas durante pelo menos 10 minutos.

Exposição oral, lavar a boca cuidadosamente com água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar de imediato cuidados médicos e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.

- Apenas Reino Unido: Os profissionais médicos no Reino Unido devem contactar o National Poisons Information Service (www.npis.org) para orientação adicional.

- Contactar um médico veterinário em caso de ingestão por um animal de companhia.

- Apenas Reino Unido: As estações de isco devem ser rotuladas com a seguinte informação “não mover nem abrir”, “contém um rodenticida”, “nome do produto ou número de autorização”, “ingredientes ativos” e “em caso de acidente, contactar um centro anti-venenos”.

- Perigoso para espécies selvagens

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

- No final do tratamento, eliminar os restos de isco e as embalagens de acordo com a legislação local.

- Recomenda-se a utilização de luvas.

Apenas Reino Unido: Para informação sobre eliminação do Reino Unido contactar a Environment Agency (<http://www.environment-agency.gov.uk>) ou SEPA (<http://www.sepa.org.uk>).

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

- Armazenar num local seco, fresco e bem ventilado. Manter as embalagens fechadas e protegidas da luz solar direta.
- Armazenar em locais que não permitam o acesso de crianças, aves, animais de companhia e espécies pecuárias.
- Prazo de validade: 2 anos

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Devido ao seu modo de ação prolongado, os raticidas anticoagulantes demoram 4 a 10 dias a ser eficazes depois de ingerido o isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar em roedores mortos sem ter as mãos protegidas, usar luvas ou dispositivos como pinças para os manusear.
- Este produto contém um agente amargante e um corante.