

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Biopren 4 GR Fly Larvicide granule

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK20-014

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0016049-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	6
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

LARVENOL 4 GR

LarvO 4Gr

GranOl 4Gr

MethO 4Gr

LE 4GR

LARVOKILL

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno LODI S.A.S. Adresa Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francúzsko
Číslo autorizácie	SK20-014
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0016049-0000
Dátum autorizácie	08/07/2020
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31/01/2030

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Bábolna Bio Ltd
Adresa výrobcu	Szállás utca 6 1107 Budapešť Maďarsko
Miesto výrobných priestorov	Köves J. u 1 2943 Bábolna Maďarsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ych) látky(látok)

Účinná látka	1386 - S-metoprén
Meno/Názov výrobcu	Bábolna Bio Ltd
Adresa výrobcu	Szállás u. 6 1107 Budapešť Maďarsko
Miesto výrobných priestorov	Szállás u. 6 1107 Budapešť Maďarsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
S-metoprén	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Účinná látka	65733-16-6		0,421

2.2. Typ úpravy

GR - Granuly

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Obsahuje polyetylénglykol 15-hydroxystearát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnite obsah v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Larvy múch - široká verejnosť a profesionálne použitie

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Musca domestica Bežný názov: Mucha domáca Vývojové štadium: larvy Vedecký názov: Stomoxys calcitrans Bežný názov: Bodavka stajňová Vývojové štadium: larvy Vedecký názov: Eristalis tenax Bežný názov: Pestrica trúdovitá Vývojové štadium: larvy
Oblasti použitia	Vnútorné Vonkajšie Použitie v interiéri: V hospodárstvach s chovom ošípaných a hovädzieho dobytka a hydinárnach na hnoj nachádzajúci sa v uzavretom priestore, v maštaliach a iných budovách na chov zvierat. Použitie v prípade kozieho hnoja nie je povolené v chovných priestoroch pre kozy a v ovčincoch. Použitie vonku: v nepriepustných, izolovaných zariadeniach na skladovanie hnoja.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozsypanie Detailný opis: Prípravok rozsypte na povrch trusu ručne pomocou odmerného pohára alebo vhodného nástroja, napr. pomocou ručného rozmetáča granúl, podľa nižšie uvedeného dávkovania:
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 30 g/m ² Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: V prípade hospodárstva s chovom ošípaných a hovädzieho dobytka: V prípade chovu na roštovej podlahe: Výrobok aplikujte na 3. deň po zavedení nových hospodárskych zvierat. Granulát aplikujte na celej ploche jamy na hnoj. Výrobok je potrebné aplikovať vždy po odstránení hnoja. V prípade chovu na hlinovej podlahe: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podlažiek a ošetrovanie zopakujte po vzniku každej novej 8-10 cm vrstvy. V prípade hydinární: V prípade kletkového chovu: granuly rozsypte na trus zhromaždený pod kletkami (na každú 10 cm vrstvu).

V prípade chovu na hľbokej podstielke: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podstielky a ošetroenie zopakujte po vzniku každej ďalšej 10 cm vrstvy.
 V prípade veľmi suchého povrchu (napr. podstielka kurenec) sa môže stať, že účinok výrobku sa vyvinie pomalšie. Pridaním 100-200 ml vody na m² povrchu, sa podporí účinok hubenia lariev aj v prípade veľmi suchých podmienok prostredia.
 V prípade maštaľného hnoja, skladovaného vo vonkajšom prostredí:
 Výrobok sa smie aplikovať len vtedy, ak je hnoj skladovaný v nepriepustnej, izolovanej jame, a spôsob uskladnenia zodpovedá aj ďalším požiadavkám bezpečného uskladnenia hnoja. Pri ošetroení hnoja skladovaného vonku aplikujte v dávke 30 g/m². Aplikáciu larvicídneho výrobku na hnoj treba ukončiť aspoň dva mesiace pred jeho aplikáciou/zapracovaním do ornej pôdy.
 Výrobok dokáže počas 12 týždňov po aplikácii obmedziť množstvo novo vyvinutého hmyzu, ak dodržíte vyššie uvedený návod na použitie. Prípravok smie byť aplikovaný maximálne šestkrát za rok.

Kategória(ie) používateľov

Vyškolený profesionál
 Profesionálne
 Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

Profesionálne:
 Papierové vrece s LDPE vložkou v 10, 15, 20, 25 kg balení
 PP alebo HDPE vrece/vrecko v 10, 15, 20, 25 kg balení
 Kartónová krabica s LDPE vložkou v 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g balení
 PP alebo HDPE vedro v 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25 kg balení
 PP alebo HDPE krabica alebo fľaška v 100, 200, 250, 500, 1000 g balení
 Široká verejnosť:
 Kartónová krabica s LDPE vložkou v 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g balení
 PP alebo HDPE vedro v 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 kg balení
 PP alebo HDPE krabica alebo fľaška v 100, 200, 250, 500, 1000 g balení

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Vždy si prečítajte etiketu alebo sprievodný leták pred použitím a dodržiavajte uvedené pokyny.

Nepoužívajte výrobok nepretržite.

Pri aplikácii výrobku zohľadňujte vývojový cyklus a charakteristiku druhov cieľového hmyzu. Predovšetkým dávajte pozor, aby ste sa zamerali na najvhodnejšiu vývojovú fázu škodcu, a dbajte na vhodné časovanie aplikácie na mieste použitia výrobku.

Aplikujte integrované spôsoby ničenia škodcov, ako napr. kombináciu chemického a manuálneho spôsobu ochrany proti škodcom a uplatnenie iných hygienických opatrení, pri zohľadnení miestnych špecifík (klimatické pomery, cieľové organizmy, podmienky použitia, a pod.).

Striedajte tento výrobok s výrobkami obsahujúcimi účinné látky s odlišným mechanizmom účinku (na odstránenie rezistentných jedincov z populácie).

Dôležité je, aby ste do 3 dní po zavedení nových hospodárskych zvierat rozsypali granuly na povrch trusu, potom vždy po vzniku ďalšej 10 cm vrstvy hnoja aplikujte výrobok znova. Granuly rozsýpajte rovnomerne na povrch zostatkov trusu, a to zakaždým po odstránení hnoja. Výrobok rozsypejte na povrch trusu pomocou odmerného pohára, alebo vhodného nástroja, napr. pomocou ručného rozmetáča granúl, podľa nižšie uvedených pokynov:

V prípade hospodárstva s chovom ošípaných a hovädzieho dobytka:

V prípade chovu na roštovej podlahe: Výrobok aplikujte na 3. deň po zavedení nových hospodárskych zvierat. Granuly aplikujte na celej ploche jamy na hnoj. Výrobok je potrebné aplikovať vždy po odstránení hnoja.

V prípade chovu na hrbokej podstielke: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podstielky a ošetrenie zopakujte po vzniku každej novej 8-10 cm vrstvy.

V prípade hydinární:

V prípade kletkového chovu: granuly rozsypejte na trus zhromaždený pod kletkami (na každú 10 cm vrstvu).

V prípade chovu na hrbokej podstielke: výrobok aplikujte v prípade každej novej vrstvy podstielky a ošetrenie zopakujte po vzniku každej ďalšej 10 cm vrstvy.

V prípade veľmi suchého povrchu (napr. podstielka kurenec) sa môže stať, že účinok výrobku sa vyvinie svoj pomalšie. Pridaním 100-200 ml vody na m² povrchu, sa podporí účinok hubenia lariev aj v prípade veľmi suchých podmienok prostredia.

Použitie v prípade kozieho hnoja nie je povolené v chovných priestoroch pre kozy a v ovčincach.

V prípade maštaľného hnoja, skladovaného vo vonkajšom prostredí:

Výrobok sa smie aplikovať len vtedy, ak je hnoj skladovaný v nepriepustnej, izolovanej jame, a spôsob uskladnenia zodpovedá aj ďalším požiadavkám bezpečného uskladnenia hnoja. Pri ošetrení hnoja skladovaného vonku výrobok aplikujte v dávke 30 g/m².

Aplikáciu larvicídneho výrobku na hnoj treba ukončiť aspoň dva mesiace pred jeho aplikáciou/zapracovaním do ornej pôdy.

Výrobok dokáže počas 12 týždňov po aplikácii obmedziť množstvo novo vyvinutých múch, ak dodržíte vyššie uvedený návod na použitie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pri aplikácii dodržujte príslušné predpisy, aby ste zabránili poškodzovaniu životného prostredia, alebo ohrozeniu zdravia.
Zabráňte kontaktu zvierat s výrobkom. Ak by to nebolo možné uskutočniť, premiestnite zvieratá počas doby aplikácie výrobku.
Ošetrite hnoj zhromaždený pod roštovou podlahou, kovovými mrežami, systémom s hlbokou podstielkou, alebo pod klietkami.
Granuly nesypte do priamej blízkosti krmiva a zavlažovaných plôch, alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť ku konzumácii výrobku zvieratami. V prípade, že by mohlo dôjsť ku kontaminácii krmiva alebo pitnej vody, pred ošetrením plochy vyprázdnite kŕmidlá, kŕmne a napájacie zariadenia.

Udržujte mimo dosahu detí a domáčich zvierat.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá!

Uschovajte oddelene od potravín, krmív, osív a umelých hnojív!

Nepoužívajte výrobok v takých chovných priestoroch, v ktorých nemožno zabrániť styku s čistiarňou odpadových vôd alebo možnosti priameho vniknutia do povrchových vôd.

Riešenie problému rezistencia

Pre zabránenie vzniku rezistence odporúčame, aby ste v rámci programu ničenia škodcov používali aj insekticídy s iným mechanizmom účinku. V prípade LARVENOL 4GR odporúčame po niekoľkých aplikáciach larvicídneho výrobku používať adulticidný výrobok, lepovú pascu a lapače hmyzu s UV svetlom. Lepové pasce sa môžu používať aj na účely pozorovania.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Predpokladané priame, alebo nepriame škodlivé účinky:

V prípade opakovaného vystavenia sa môžu vyskytnúť alergické reakcie.

Opatrenia prvej pomoci:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 15 minút ich opatrne vypláchnujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu treba okamžite odstrániť/vyzliect'. Opláchnite pokožku veľkým množstvom/prúdom vody.

V prípade expozície alebo podozrenia z nej požiadajte o radu lekára/lekársku starostlivosť.

5.4. Návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu

Prázdne obaly a zvyšky výrobku musia byť zneškodené ako nebezpečný odpad!

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo sálavých tepelných zdrojov v pôvodnom uzavretom obale pri teplote do 35°C.

Nepoužívaný výrobok skladuje na dobre vetranom mieste chránenom od priameho slnečného žiarenia.

Skladovateľnosť: 3 roky.

6. Ďalšie informácie

-