



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**

**Nr. RO/2022/0324/MRS/ IE/BPA70533**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă* eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **UK**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **IE/BPA70533**

**II. Data emiterii autorizatiei: 26.04.2022**

**III. Data expirării autorizatiei: 25.04.2023**

**IV.**

**DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: VERTOX OKTABLOK**

**Alta denumire comerciala:** Vertox Cub Parafinat Pro; Prokum Cub Parafinat Pro  
METATOX PROFESSIONAL bloc rodenticid parafinic

**V.**

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,**

**Adresa:** 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:**

**PELGAR INTERNATIONAL LIMITED,**

**Adresa :** 18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon, Franța

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:**

**1. PELGAR INTERNATIONAL LIMITED**

**Adresa:** Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie

**2. Promedivet SRL, 545500 SOVATA, str. Lunga, nr. 46/G, jud. Mures, Romania**


**Adresa:** 545500 SOVATA, str. Lunga, nr. 46/G, jud. Mures, Romania

**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PELGAR INTERNATIONAL LIMITED**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22Adresa: Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Marea Britanie  
Loc de productie : **PelGar International Limited**, Prazska 54, 280 02, Kolin, Republica Ceha**VI.****TIPUL DE PRODUS** : TP 14-Rodenticide**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI**: profesioniști, profesioniști instruiți.**VIII.****TIPUL PREPARATULUI**: Momeala gata de utilizare**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă**

Denumirea comună	<i>Brodifacoum</i>
Denumirea IUPAC	<i>3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]tetralin-1-yl]-2-hydroxy-chromen-4-one</i>
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,005%

**2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica****X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Simboluri si pictograme	 <b>GHS08</b> <b>ATENȚIE!</b>
Fraze de pericol (H)	<b>H360D</b> Poate dauna fatului. <b>H373</b> Poate provoca leziuni ale organelor (SÂNGE) prin expunerea prelungita sau repetata. <b>EUH208</b> Conține 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Poate provoca o reacție alergică. <b>EUH401</b> Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare
Fraze de prudenta (P)	<b>P201</b> procurați instrucțiuni special înainte de utilizare. <b>P220</b> A se păstra departe de îmbrăcăminte și materiale combustibile <b>P273</b> Evitați dispersarea în mediu. <b>P280</b> Purtați mănuși de protecție. <b>P308+P313</b> ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. <b>P314</b> Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



	<b>P405</b> A se depozita sub cheie. <b>P501</b> Aruncați conținutul/ recipientul în conformitate cu reglementările naționale
--	--

**XI. AMBALAREA****Utilizare # 1 – Profesional - in interior si in exterior (in jurul cladirilor)**

- Blocuri libere sau înfășurate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz amator și blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare: Găleată sau cuvă de PE sau PP

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptușite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.

- Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 12 kg.

- 2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Pachete cu mai multe cutii:

- 10g - 250
- 15g - 125
- 20g - 96, 120, 144
- 30g - 96, 120, 144
- 40g - 72, 96, 120
- 60g - 48, 60, 72, 96
- 80g - 32, 48, 60, 72, 96

- 1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Pachete cu mai multe cutii:

- 10g - 250
- 20g - 96, 120, 144
- 30g - 96, 120, 144

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

**Pachete cu mai multe cutii:**

- 20g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- Blocuri de 50g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

**Pachete cu mai multe cutii:**

- 50g – 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 1-20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de stație de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibilă de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC. Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă în cutie de carton.

**Unități multiple în pachet:**

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96
- Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton

**Unități multiple în pachet:**

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

**Utilizare # 2 – Profesioniști instruiți- interior și exterior (în jurul clădirilor) și în sistemele de canalizare**

- Blocuri libere sau înfășurate în PP sau PE de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g pentru uz amator și blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g pentru utilizare profesională în următoarele ambalaje exterioare:- Găleată sau cuvă de PE sau PP

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

- Blocuri libere de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g, 60g, 100g sau 200g în saci necăptușite sau într-o pungă de PP sau PE legat cu sârmă într-o cutie de carton cu perete dublu.

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 20 kg.

- Blocuri de 5g, 10g, 20g, 28g, 50g sau 60g.

Cutie de carton "uni-trays" (tăvi mulate din styrene cu blocuri pop-out)

Mărime de ambalaj minim 3 kg.

Mărime de ambalaj maxim 12 kg.

- 2,3 sau 4 blocuri de 5g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

Pachete cu mai multe cutii:

- 10g - 250
- 15g - 125
- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96

- 1 sau 2 blocuri de 10g sau 1 bloc de 20g, ambalate în stații de momeală de șoareci de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,3,4,5 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

Pachete cu mai multe cutii:

- 10g - 250
- 20g – 96, 120, 144
- 30g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 50g - 48, 60, 72, 96



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 1, 2 sau 3 blocuri de 20g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință rezistentă la manipulări de PET, HIPS, PVC, PE, HDPE sau PP, toate ambalate cu multipli de 1,2,4 sau 6 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură. Blocuri adiționale pot fi incluse în ambalaje exterioare ca rezerve.

**Pachete cu mai multe cutii:**

- 20g – 96, 120, 144
- 40g – 72, 96, 120
- 60g – 48, 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 120g - 32, 48, 60, 72, 96
- 240g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- Blocuri de 50g, ambalate în stații de momeală de șobolani de unică sau de mai multă folosință de HDPE sau de PP, toate ambalate cu multipli de 1,2 sau 4 în ambalaje exterioare de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau în pungă lipită cu căldură sau exterior din plastic cu un capac din carton lipit cu căldură.

**Pachete cu mai multe cutii:**

- 50g – 60, 72, 96
- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 1 -20 blocuri de 20g într-o pungă de PE sau în ambalaj "clamshell/blister" într-un exterior de stație de momeală de rozătoare rezistentă la manipulări folosibilă de mai multe ori din PE, PP, PET, HIPS, PVC.

**Unități multiple în pachet:**

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96
- Ambalaj de rezerve - ambalaj "blister", pungă (hârtie/PE, AL/PE, hârtie/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, ambalaj "blister" PVC) în cutie de carton

**Unități multiple în pachet:**

- 80g – 32, 48, 60, 72, 96
- 100g - 32, 48, 60, 72, 96
- 200g – 16, 32, 48, 60, 72, 96
- 400g – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96



## XII. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

### Utilizare # 1 – Profesionali - in interior si in exterior (in jurul cladirilor)

Rata de aplicare: Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri. Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 2 metri.

Diluție (%): N/A

Numărul și momentul aplicării:

- Șoareci

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

- Șobolani

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Program standard de momeală (maxim 35 de zile - vezi Instrucțiuni de utilizare).

### Instrucțiuni de utilizare PROFESIONISTI

A se citiți și urma informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.

Se va efectua un sondaj pre-momeală a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și amploarea infestării.

A se îndepărta alimentele care sunt ușor de obținut pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificil de realizat.

Produsul trebuie utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Se vor lua în considerare măsuri preventive de control (de exemplu, se vor astupa găurile, se vor îndepărta potențialele alimente și băuturi pe cât posibil) pentru a îmbunătăți consumul de produse și a reduce probabilitatea reinvăziei.

Stațiile de momeală trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată anterior activitate rozătoarelor (de exemplu, căi de călătorie, locuri de cuibărit, locuri de hrănire, găuri, vizuini etc.).

Acolo unde este posibil, posturile de momeală trebuie să fie fixate de sol sau de alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie clar etichetate pentru a arăta că conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise

[Dacă politica sau legislația națională impune acest lucru] Când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și un anunț care să explice riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, precum și să indice primul măsurile de luat în caz de otrăvire trebuie să fie puse la dispoziție alături de momeli.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Momeala trebuie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.  
A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu sunt vizate.

A se amplasa produsul departe de alimente, băuturi și furaje, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Se vor purta mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul fazei de manipulare a produsului

În timpul utilizării produsului, nu se va mânca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, trebuie luată în considerare înlocuirea stațiilor de momeală în locuri ulterioare și posibilitatea de a trece la o altă formulare de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa nicio scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza probabilă. Acolo unde au fost excluse alte elemente, este probabil să existe rozătoare rezistente, așa că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luați în considerare, de asemenea, utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control.

Se va scoate momeala ramasa sau statiile de momeala la sfarsitul perioadei de tratament.

**Utilizare # 2 – Profesioniști instruiți - interior și exterior (în jurul clădirilor) și în sistemele de canalizare**

Rata de aplicare:

Șobolani: 10 până la 60 g de momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri. Șoareci: 5 până la 20 g de momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 2 metri.

Diluție (%): N/A

Numărul și momentul aplicării:

- *Șoareci*

Infestare mare – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 2 metri

Infestare redusă – 5 până la 20 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

- *Șobolani*

Infestare mare – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 5 metri

Infestare redusă – 10 până la 60 g momeală în stațiile de momeală la fiecare 10 metri

Program standard de momeală (maxim 35 de zile - vezi Instrucțiunile de utilizare)..

Momeala pulsate

**Instrucțiuni de utilizare PROFESIONISTI INSTRUITI**

Se vor citi și urma informațiile despre produs, precum și orice informații care însoțesc produsul sau furnizate la punctul de vânzare înainte de a-l utiliza.





**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**  
**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Se va efectua un sondaj pre-momeală a zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și a determina cauza probabilă și amploarea infestării. Se vor îndepărta alimentele care sunt ușor de obținut pentru rozătoare (de exemplu, cereale vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează doar populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificil de realizat.

Produsul trebuie utilizat numai ca parte a unui sistem integrat de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.

Produsul trebuie plasat în imediata apropiere a locurilor în care a fost explorată anterior activitatea rozătoarelor (de exemplu, căi de călătorie, locuri de cuibărit, locuri de hrănire, găuri, vizuini etc.).

Acolo unde este posibil, posturile de momeală trebuie să fie fixate de sol sau de alte structuri.

Stațiile de momeală trebuie să fie clar etichetate pentru a arăta că conțin rodenticide și că nu trebuie mutate sau deschise.

[Dacă politica sau legislația națională impune acest lucru] Când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament și o notificare care să explice riscul de intoxicație primară sau secundară cu anticoagulant, precum și să indice primul măsurile de luat în caz de otrăvire trebuie să fie puse la dispoziție alături de momeli.

Momeala trebuie asigurată astfel încât să nu poată fi târâtă departe de stația de momeală.

A nu se lăsa stațiile de momeală la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă și a altor animale care nu sunt vizate.

A se amplasa produsul departe de alimente, băuturi și furaje, precum și de ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea.

Se vor purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice în timpul fazei de manipulare a produsului.

În timpul utilizării produsului, nu se va mânca, bea sau fuma. Se vor spăla mâinile și zonele expuse ale pielii după utilizarea produsului.

Frecvența vizitelor în zona tratată trebuie să fie la discreția operatorului, în lumina sondajului efectuat la începutul tratamentului. Frecvența respectivă ar trebui să fie în concordanță cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant.

Dacă absorbția de momeală este scăzută în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în locuri ulterioare și posibilitatea de a trece la o altă formulă de momeală.

Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se continuă să se consume momeli și nu se poate observa nicio scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza probabilă. Acolo unde au fost excluse alte elemente, este probabil să existe rozătoare rezistente, așa că se va lua în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este disponibil, sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Se va lua în considerare, de asemenea, utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:** A se pastra intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Se va păstra recipientul recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui. Depozitare în locuri interzise accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.  
**DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni**

**ALTE INFORMATII:**

Poate provoca leziuni ale organelor (Sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.  
Periculos pentru animalele sălbatice

**EVALUAREA RISCURILOR**

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea de nas și de gingii. În cazuri severe, pot apăra vânătăi și sânge în excremente sau urină.

- Antidot: Vitamina K1 administrat doar de personal medical/veterinar.
- În caz de:
- Expunerea dermală, se va spăla pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.
- Expunerea ochilor, se vor clăti ochii cu apă, se vor ține ochii deschiși cel puțin 10 minute.
- Expunere orală, se va clăti gura cu atenție cu apă. Nu se va administra nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu se induce vomă. Dacă este înghițit, se va solicita imediat sfatul medicului și I se va arăta ambalajul sau eticheta produsului.

Dacă este ingerat de un animal de companie se va contacta un medic veterinar.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă

