

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: SPRAY REPULSIF IR 100

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: FR-2022-0019

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0028405-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	8
5.2. Mesures de gestion des risques	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	10
6. Autres informations	10

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

SPRAY REPULSIF IR 100
LOTION REPULSIVE MOUSTIQUE TIQUE – FAMILLE
LOTION REPULSIVE MOUSTIQUE TIQUE CORPORELLE
LOTION REPULSIVE MOUSTIQUE TIQUE CORPORELLE – FAMILLE
LOTION REPULSIVE MOUSTIQUE TIQUE – PROTECTION CORPORELLE
LOTION REPULSIVE MOUSTIQUE TIQUE – PROTECTION CORPORELLE - FAMILLE
LOTION REPULSIVE – PROTECTION CONTRE MOUSTIQUES ET TIQUES
LOTION PROTECTRICE CONTRE MOUSTIQUES ET TIQUES
LOTION REPULSIVE - PROTECTRICE CONTRE MOUSTIQUES ET TIQUES
LOTION CORPORELLE – PROTECTION CONTRE LES MOUSTIQUES ET TIQUES
LOTION CORPORELLE REPULSIVE – PROTECTION CONTRE MOUSTIQUES ET TIQUES

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Terrium
	Adresse	246 rue du 8 mai 1945 42210 Motrond-Les-Bains France
Numéro de l'autorisation	FR-2022-0019	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0028405-0000	
Date de l'autorisation	25/03/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	04/11/2029	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE

Adresse du fabricant

1041, chemin de la Digue du Rhone 07300 TOURNON SUR RHONE France

Emplacement des sites de fabrication

1041, chemin de la Digue du Rhone 07300 TOURNON SUR RHONE France

Nom du fabricant

SAS SPRING

Adresse du fabricant

ZI du Bois de Leuze - 4 rue Blaise Pascal 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU France

Emplacement des sites de fabrication

ZI du Bois de Leuze - 4 rue Blaise Pascal 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate

Nom du fabricant

Merck S.L.U.

Adresse du fabricant

Calle Maria de Molina 40 28006 MADRID Espagne

Emplacement des sites de fabrication

Poligono Merck 08100 MOLLET DEL VALLÉS, BARCELONE Espagne

Substance active

1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate

Nom du fabricant

Merck KGaA

Adresse du fabricant

Frankfurter Straße 250 64293 DARMSTADT Allemagne

Emplacement des sites de fabrication

Poligono Merck 08100 MOLLET DEL VALLÉS, BARCELONE Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropiona te		Substance active	52304-36-6	257-835-0	10

2.2. Type de formulation

EW – Emulsion, huile dans l'eau

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.
Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Application sur la peau humaine pour repousser les moustiques – Non professionnels

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit prêt à l'emploi utilisé pour protéger les humains contre les moustiques, uniquement dans les zones tempérées.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae Culex
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae Genre Aedes
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae Genre Anopheles
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Autre

Application sur la peau

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Application manuelle

Description détaillée:

-

Taux et fréquences d'applicationTaux d'application: 1,16 µl/cm²

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

Durée de protection : 8 heures en condition tempérée

Dose : 1,16 µl/cm²

Soit :

- Adultes et enfants de plus de 12 ans : 10,58 ml par application (maximum 2/jour). Appliquer avec parcimonie pour couvrir uniformément les parties exposées du visage, mains, bras, jambes et pieds. Ne pas appliquer sur le corps entier.

- Enfants (6-12 ans) : 5,87 ml par application* (maximum 2/jour)

- Enfants (2-6 ans) : 4,33 ml par application* (maximum 2/jour)

- Jeunes enfants (1-2 ans) : 3,06 ml par application* (maximum 2/jour)

- Nourrissons (0-1 ans) : 2,61 ml par application* (maximum 1/jour)

*Le produit peut être appliqué sur les parties exposées limité au visage, bras, jambes et pieds. Ne pas appliquer sur le corps entier.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

- Tube (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ou LDPE/PA) : 25- 250 mL

- Tube (multicouche aluminium + (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ou LDPE/PA) : 25-250 mL

- Bouteille (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) : 25-250 mL

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Application sur la peau humaine pour repousser les tiques – Non professionnels

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Produit prêt à l'emploi utilisé pour protéger les humains contre les moustiques, uniquement dans les zones tempérées.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Ixodes scapularis Nom commun: Tiques Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Ixodes ricinus Nom commun: Tiques Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Autre Application sur la peau
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application manuelle Description détaillée: -
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 1,01 µl/cm ² Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Durée de protection : 7 heures en condition tempérée Dose :1,01 µl/cm ² Soit : <ul style="list-style-type: none">• Adultes et enfants de plus de 12 ans : 9,20 ml par application (maximum 3/jour). Appliquer avec parcimonie pour couvrir uniformément les parties exposées du visage, mains, bras, jambes et pieds. Ne pas appliquer sur le corps entier.• Enfants (6-12 ans) : 5,10 ml par application* (maximum 2/jour)• Enfants (2-6 ans) : 3,77 ml par application* (maximum 2/jour)• Jeunes enfants (1-2 ans) : 2,66 ml par application* (maximum 2/jour)• Nourrissons (0-1 ans) : 2,27 ml par application* (maximum 2/jour)

*Le produit peut être appliqué sur les parties exposées limité au visage, bras, jambes et pieds. Ne pas appliquer sur le corps entier.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

- Tube (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ou LDPE/PA) : 25- 250 mL

- Tube (multicouche aluminium + (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ou LDPE/PA) : 25-250 mL

- Bouteille (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE ; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA ; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA) : 25-250 mL

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.
- Respecter les doses d'application et les conditions d'emploi du produit.
- La durée de protection est donnée à titre indicatif. Des facteurs environnementaux (température, vent...) peuvent modifier la durée de protection.
- Ne pas utiliser avec d'autres produits répulsifs.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- Retraiter en cas de contact avec l'eau sans dépasser le nombre maximum d'applications recommandé.
- En cas d'application d'une protection solaire, attendre au moins 20 min après l'application de la protection solaire pour appliquer le produit.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Tenir hors de portée des enfants.
- Appliquer UNIQUEMENT sur les parties non recouvertes du corps, limitées au visage, aux bras, aux jambes et aux pieds. Ne pas appliquer sur tout le corps.
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage.
- Ne pas appliquer sur le contour des yeux.
- Ne pas appliquer sur des coupures, des plaies, une peau fraîchement rasée ou irritée. Ne pas appliquer sous les vêtements.
- Lorsque le produit biocide est appliqué sur des enfants de moins de 12 ans, il doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les mains d'enfants.
- Appliquer à l'extérieur ou dans une zone bien ventilée
- Se laver les mains et la peau exposée avant de manger et après utilisation.
- Ne pas appliquer directement sur des surfaces sur lesquelles de la nourriture ou des aliments pour animaux sont conservés, préparés ou consommés.
- Envisager l'utilisation d'autres mesures de protection en combinaison avec un produit répulsif biocides.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 10 min.
- En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 10 mn.
- En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la bouche : rincer abondamment avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de réaction cutanée, de rougeurs ou de douleurs persistantes après l'application du produit, contacter le centre antipoison ou consulter un médecin.
- En cas d'inhalation de fortes concentrations: mettre au repos en position demi-assise ; en cas d'apparition de symptômes, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112. Ne pas faire boire ni vomir.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.

- Eliminer tous les déchets de produit et contenants dans des circuits de collectes appropriés.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 18 mois

- Conserver le produit bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.

- Ne pas conserver le produit à température supérieure à 40°C.

6. Autres informations

-