



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/21-12/44

URBROJ: 534-03-3-2/3-22-3

Zagreb, 19. kolovoza 2022.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovackog društva **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija**, u predmetu obnove odobrenja za biocidni proizvod, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovackom društvu **Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija** (u dalnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **IMIDASECT ANTS**.

II. Obnova odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **30.3.2027.**

Obratljivo

Trgovacko društvo Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za obnovom odobrenja za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda IMIDASECT ANTS. Proveden je postupak ocjenjivanja i procjene rizika sukladno članku 31. Uredbe (EU) br. 528/2012. Obnova odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 30.3.2027. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države Njemačke. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.



Dostaviti:

1. Sharda Europe B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija
2. Arhiva



Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

IMIDASECT ANTS

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih
člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/21-12/44

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0017414-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	IMIDASECT ANTS
-----------------	----------------

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv Sharda Europe B.V.B.A. Adresa Heedstraat 58, 1730-Asse, Belgija
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/21-12/44
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0017414-0000
Datum odobrenja	19.8.2022.
Datum isteka odobrenja	30.3.2027.

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3, 48410 Orozco (Vizcaya) Španjolska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Imidakloprid
Naziv proizvođača	Sharda Cropchem Limited
Adresa proizvođača	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD., 393 East Heping Road Shijiazhuang Kina

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidakloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2. Vrsta formulacije

GD - Gel za izravnu primjenu

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H411 Otrvno za vodení okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Neprofesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Monomorium pharaonis</i> Uobičajeno ime: Faraonski mrav Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Linepithema humile</i> Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Primjena u vanjskim prostorima oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: Primjena gel mamca iz šprice, ampule ili kapaljke (pipete) Detaljan opis: - Metoda: Primjena klopki s mamcima Detaljan opis: -
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0,2g/m ² ; U unutarnjim prostorima: 0,2g/m ² ; U vanjskim prostorima: 0,2g na ulazu u gnijezdo ili 0,2 g po metru kretanja mrava ili 0,2 g/m opseg zgrade; Otvorena primjena u unutarnjim prostorima: na 1 m ² nanesite najviše jednu kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g). Otvorena primjena u vanjskim prostorima: Nanesite 1 kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g) izravno na ulaz u gnijezdo ili 1 kap po metru kretanja mrava. Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.

	<p>Stopa primjene: Unutarnji prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m². Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m², klopka s 1 g mamca na 5 m², klopka s 1.2 g mamca na 6 m², klopka s 1.4 g mamca na 7m²; Vanjski prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m opsega zgrade. Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m, klopka s 1 g mamca na 5 m, klopka s 1.2 g mamca na 6 m, klopka s 1.4 g mamca na 7 m.</p> <p>Razrjeđivanje (%): -</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p>Proizvod se može primijeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih klopki s mamcima ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.</p>
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>3 g, 5 g, 10 g, 15 g Plastična šprica (HDPE i transparentni polipropilen)</p> <p>5mL ampula (HDPE)</p> <p>4mL, 10mL kapaljka (pipeta) (HDPE)</p> <p>Klopke (HDPE i transparentni polipropilen) s 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g mamca</p>

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nema

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite spremnik ili etiketu proizvoda.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Nema

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – Profesionalna upotreba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Monomorium pharaonis</i> Uobičajeno ime: Faraonski mrav Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: <i>Linepithema humile</i> Uobičajeno ime: Argentinski mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru. Primjena u vanjskim prostorima oko zgrada.
Načini primjene	Metoda: Primjena gel mamca iz patrone, ampule ili kapaljke (pipete) Detaljan opis: - Metoda: Primjena klopki s mamcima Detaljan opis: -
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 0,2g/m ² ; U unutarnjim prostorima: 0,2g/m ² ; U vanjskim prostorima: 0,2g na ulazu u glijezdo ili 0,2 g po metru kretanja mrava ili 0,2 g/m opsega zgrade; Otvorena primjena u unutarnjim prostorima: na 1 m ² nanesite najviše jednu kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g). Otvorena primjena u vanjskim prostorima: Nanesite 1 kap gela promjera 1 cm (približno 0,2 g) izravno na ulaz u glijezdo ili 1 kap po metru kretanja mrava. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primjeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih mamaca ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.
	Stopa primjene: Unutarnji prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m ² . Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m ² , klopka s 1 g mamca na 5 m ² , klopka s 1.2 g mamca na 6 m ² , klopka s 1.4 g mamca na 7m ² ; Vanjski prostori-klopke s mamcima: 0,2 g/m opsega zgrade. Klopka s 0.75 g mamca na 3.8 m, klopka s 1 g mamca na 5 m, klopka s 1.2 g mamca na 6 m, klopka s 1.4 g mamca na 7 m. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Proizvod se može primjeniti neprekidno tijekom 2 mjeseca bez zamjene otvorenih klopki s mamcima ili nepotrošenih mamaca. Maksimalno 12 primjena tijekom godine.

Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	30 g, 35 g, 50 g, 75 g, 100 g patrona, Plastika (HDPE i transparentni polipropilen) 5mL ampula (HDPE) 4mL, 10mL kapaljka (pipeta) (HDPE) Klopke (HDPE i transparentni polipropilen) s 0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g mamca

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Nema

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nema

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Nema

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Nema

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Nema

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

- 1) Prije primjene ukloniti sve izvore hrane za mrave (otpad, ostatke hrane...) sa zaraženog područja kako bi se potaknuo unos gela.
- 2) Kada su mravi prisutni u unutarnjim prostorima, primijeniti kapi gela u blizini kretanja mrava, na mjestima ulaska i u njihovim gnijezdima.
- 3) Kada su mravi prisutni u vanjskim prostorima, primijeniti kapi gela u blizini kretanja mrava ili u njihovim gnijezdima.
- 4) Na mjestima gdje je uočena samo sporadična pojava mrava, preporučuje se primjena klopki s mamcima.
- 5) Proizvod treba nanijeti samo na ograničeno područje i to na površine koje se ne čiste redovito, npr. iza ili ispod hladnjaka, ispod kuhijskog sudopera, ispod pećnice ili grijala za vodu.
- 6) Proizvod primijeniti samo na područjima koja se ne mogu potopiti ili smočiti, odnosno zaštićena od kiša, poplava i vode nakon pranja.
- 7) Jednom tjedno provjeriti klopke s mamcima.
- 8) Tijekom pregleda provjeriti tretirano područje i ako je potrebno zamijeniti klopku s mamcem ili primjeniti novu dozu gela.
- 9) Proizvod ne primjenjivati na površinama koje upijaju.
- 10) Primijeniti proizvod dalje od izravnog sunčevog svjetla ili izvora topline (npr. ne primjeniti ispod radijatora).
- 11) Izbjegavati kontinuiranu upotrebu proizvoda.
- 12) Primjetno smanjenje broja mrava očekuje se unutar 4 tjedna. Djelotvornost je dokazana samo protiv odraslih jedinki, ne protiv svih jedinki u gnijezdu.
- 13) Ako je zaraza i dalje prisutna unatoč primjeni proizvoda prema uputama za uporabu, obratiti se profesionalnoj službi za dezinfekciju.
- 14) Obavijestiti nositelja odobrenja ako je primjena neučinkovita.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- 15) Na vanjskim površinama primjenjivati samo na asfaltiranim/popločanim površinama (ne primjenjivati na nezaštićeno tlo).
- 16) Ukloniti klopke s mamcima kada infestacija prestane.
- 17) Koristiti biocidni proizvod u preporučenim dozama i vremenskim razmacima.
- 18) Ne koristiti neonikotinoide za naknadni postupak suzbijanja gdje je došlo do otpornosti organizama i smanjenja učinkovitosti.
- 19) Pratiti problematične populacije štetnih organizama radi otkrivanja prvih promjena osjetljivosti.
- 20) U svrhu izbjegavanja pojave otpornosti na bilo koju aktivnu tvar, naizmjenično koristiti proizvode s različitim načinima djelovanja i izbjegavati čestu ponovnu uporabu iste aktivne tvari.
- 21) Primjena biocidnih pripravaka može se kombinirati s drugim sanitarnim mjerama.
- 22) Proizvode uvijek koristiti u skladu s preporukama na etiketi.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- 1) Ne koristiti proizvod izravno ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića, niti na površinama ili priboru koji bi mogli biti u izravnom dodiru s hranom, hranom za životinje, pićima i životinjama.
- 2) Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- 1) NAKON DODIRA S KOŽOM: Operite izloženu kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite Centar za kontrolu otrovanja ili liječnika.
- 2) NAKON DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 3) NAKON GUTANJA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
- 4) NAKON UDISANJA: Ne očekuje se inhalacijska izloženost.
- 5) Ovaj biocidni proizvod sadrži imidakloprid koji je opasan za pčele.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- 1) Odložiti sadržaj / spremnik na siguran način u skladu s nacionalnim propisima.
- 2) EWC: 200119 - Europski kodeks otpada: pesticidi (samo STL)
- 3) EWC: 150110 - Europski kodeks otpada: ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je zagađena opasnim tvarima (samo STL)
- 4) Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod na tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) niti u odvodne kanale.
- 5) Odložite neiskorišteni proizvod, njegovu ambalažu i sav ostali otpad u skladu s lokalnim propisima.
- 6) Ne čistiti klopku s mamcima prije odlaganja.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

- 1) Ne skladištiti u blizini hrane, pića i stočne hrane.
- 2) Proizvod ne izlagati sunčevom svjetlu.
- 3) Rok upotrebe proizvoda: 24 mjeseca

6. OSTALE INFORMACIJE

Proizvod sadrži gorku tvar.