

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: RENTOKIL RAPID PRO

Tipo(s) do produto: TP 14 - Rodenticidas

Número da autorização: PT/DGS trs104/2019

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** PT-0020295-0000

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	2
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	2
2.2. Tipo de formulação	2
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	2
4. Utilização(ões) autorizada(s)	3
5. Orientações gerais para a utilização	5
5.1. Instruções de utilização	6
5.2. Medidas de redução do risco	6
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	6
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	6
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	6
6. Outras informações	6

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

RENTOKIL RAPID PRO

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Rentokil Initial Limited
	Endereço	Hazel House Millennium Park - Naas Irlanda
Número da autorização	PT/DGS trs104/2019	
Número de referência do ativo R4BP 3	PT-0020295-0000	
Data da autorização	18/02/2019	
Data de caducidade da autorização	06/10/2026	

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

Nome do fabricante	Rentokil Initial 1927 plc
Endereço do fabricante	Power Centre, Unit A1 and A2, Link 10, Napier Way RH10 9RA Crawley West Sussex Reino Unido
Localização das instalações de fabrico	Rentokil Initial Supplies Webber Road Knowsley Industrial Park L33 7SR Kirkby Merseyside Reino Unido

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	3 - Alfacloralose
Nome do fabricante	DESIM
Endereço do fabricante	Les 4M, 111 Chemin du Petit Bois 69130 Écully França
Localização das instalações de fabrico	Excel Estate, S.V. Road Goregaon (West) 400062 Mumbai Índia
Substância ativa	3 - Alfacloralose
Nome do fabricante	LODI SAS
Endereço do fabricante	Parc D Activites Des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray França
Localização das instalações de fabrico	LODI Group, site HIKAL Ltd., T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad district 410208 Maharashtra Índia

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Alfacloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Substância ativa	15879-93-3	240-016-7	3,996

2.2. Tipo de formulação

RB - Isco (pronto a usar)

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

Evitar a libertação para o ambiente.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o conteúdo em conformidade com a regulamentação vigente.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Para utilizadores profissionais. Uso em interiores. Para o controlo de ratos.

Tipo de produto	TP 14 - Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Não aplicável (TP 14 - Rodenticidas)
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Adultos Insetos, mamíferos (por exemplo roedores) Nome científico: Mus musculus Nome comum: House mouse Estadio de desenvolvimento: Juvenis por exemplo. roedores
Campos de utilização	Interior Uso exclusivo em interiores.
Método(s) de aplicação	Em estações de isco - Aplicação em estações de isco invioláveis (TRBB)
Frequência de aplicação e dosagem	Aplicar até 8g (2 x 4g) por ponto de isco através da utilização de uma pistola de calafetagem - 0.0 - O número de pontos de isco irá depender da área a tratar, do contexto geográfico e da severidade da infestação. Distância entre as caixas de isco: 2-3m. (Alta Infestação: 2m, Baixa infestação: 3m). Como guia, colocar os pontos de isco a cada 2-3 metros. Verificar regularmente os pontos de isco. Substituir os iscos consumidos. Substituir os iscos até deixarem de ser consumidos. Os iscos devem ser colocados por um período de 7-10 dias. Se o controlo não for atingido, o local deverá ser reavaliado Se se verificar atividade para além deste período, a sua causa deverá ser determinada

Categoria(s) de utilizadores	Profissional treinado Profissional
Capacidade e material da embalagem	400g - tubo de polietileno de alta densidade 300g - tubo de polietileno de alta densidade

4.1.1 Instruções específicas de utilização

<p>Leia o rótulo antes da utilização e siga as instruções fornecidas. O produto não deve ser colocado de forma indiscriminada.</p> <p>Um estudo aprofundado da área infestada é essencial, particularmente em locais isolados e protegidos, para determinar a extensão da infestação.</p> <p>Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.</p> <p>Lavar as mãos e a pele exposta após utilização do produto e antes de comer, beber ou fumar.</p> <p>Colocar as caixas de isco em locais de atividade de ratos, em percursos ou perto de refúgios. O produto deve ser colocado em caixas de isco fora do alcance das crianças, pássaros e animais não-alvo.</p> <p>As caixas de isto devem estar claramente marcadas para mostrar que contêm rodenticidas e que não devem ser perturbadas.</p> <p>Remova todas as caixas de isco no final do tratamento.</p> <p>No final do tratamento adotar medidas de controlo, tais como: tapar os buracos, eliminar fontes de alimento, etc, para evitar reinfestação. A eficiência óptima é conseguida a baixas temperaturas, de preferência a 16°C ou a temperaturas inferiores. O produto é eficaz após 24 horas até 48 horas. Os corpos dos roedores mortos, os vestígios de isco não consumido ou outros fragmentos de isco encontrados afastados das caixas de isco devem ser recolhidos durante todas as operações de controlo, para minimizar o risco de consumo e envenenamento por parte de crianças, animais de companhia e outros animais não-alvo.</p> <p>Eliminar os corpos dos roedores mortos, os vestígios de isco não consumido ou outros fragmentos de isco de acordo com a regulamentação vigente.</p>

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Não libertar o produto para o ambiente ou esgotos.

Para maximizar o consumo de isco, assegure-se que todas as fontes de alimento foram removidas.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais e de utensílios em contacto com os alimentos
Não limpar o interior das caixas de isco entre as aplicações.

Os roedores podem transportar agentes patogénicos (por exemplo, leptospirose). Usar luvas de proteção adequadas ao remover os roedores mortos.

Informações mínimas a constar nas caixas de isco: Nome e número de telefone da empresa responsável pela colocação do produto no Mercado, nome comercial do produto e quantidade máxima utilizada (na caixa de isco), nome e concentração da substância activa e o seguinte texto: 'Em caso de acidente ou de indisposição, consultar um médico ou o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Tel.: 808 250 143.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Se ingerido em quantidades elevadas, este produto pode causar náuseas, vômitos, depressão, dores de cabeça e fraqueza podendo levar à perda de consciência. Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Para mais informações ou para reportar um incidente de envenenamento, contacte o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - Tel.: 808 250 143, mantenha o rótulo para sua referência

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Remover todos os iscos após o tratamento e eliminá-los de acordo com a regulamentação vigente. Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação vigente.

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Conservar no recipiente de origem, bem fechado, em local fresco e seco.
Manter fora do alcance das crianças, pássaros e animais não-alvo.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais
O produto é considerado estável por 12 meses a partir da data de fabrico.

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

Ver usos autorizados.

5.2. Medidas de redução do risco

Ver usos autorizados.

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver usos autorizados.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver usos autorizados.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver usos autorizados.

6. Outras informações

Este produto pode representar um perigo para a fauna.

