



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)**

**Išduotas 2022 m. liepos 4 d., galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3<sup>o</sup> 1<sup>a</sup>, ES-08036, Barselona, Ispanija.

**Biocidinio produkto tipas**

18 produktų tipas. Insekticidai.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

MAGNUM GEL, EC GEL ROACHES, ROACHES GEL, X GEL ROACHES, ROACHES BAIT

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

MYLVA S.A., Via Augusta, 48 08006 Barselona, Ispanija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Imidaklopridas, CAS 138261-41-3, EB Nr. 428-040-8.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

18VAP103045.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. ES/NA-APP-2017-18-00449 abipusis pripažinimas.

**Vilniaus departamento direktorė  
A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
(10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198) priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

MAGNUM GEL, EC GEL ROACHES, ROACHES GEL, X GEL ROACHES,  
ROACHES BAIT  
18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai  
(kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)

R4BP objekto numeris:  
LT-0019165-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	EC GEL ROACHES MAGNUM GEL ROACHES GEL ROACHES BAIT X GEL ROACHES
----------------------	--

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Laboratorios Econovar S.L.
	Adresas	Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036, Barcelona, Ispanija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0019165-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-07-04	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-12-31	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	MYLVA, S.A.
Gamintojo adresas	Via Augusta, 48 08006 Barcelona (España) Telefono: +34 934 153 226 Fax: +34 934 156 344, 08006 BARCELONA Ispanija
Gamybos vieta	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395- Barcelona (España), 08395 BARCELONA Ispanija

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Imidaklopridas
Gamintojo pavadinimas	ADAMA Agriculture España S.A.
Gamintojo adresas	Calle Mendez Alvaro, 20-5, 28045 Madrid Ispanija
Gamybos vieta	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park, 84100 Beer Sheva Izraelis Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou Kinija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Imidaklopridas	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-	Veiklioji medžiaga	138261-41-3	428-040-8	2,15

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	nitroimidazolid in-2-imine				

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo kategorijos	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono ir 2-oktil- 2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. turinį išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus..

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Naudojimo būdas 1 – Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais - neprofesionalus naudojimas buityje.**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).  Išsamus aprašymas:

	Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 lašai/m<sup>2</sup>). Juodasis tarakonas (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>) Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16g/m<sup>2</sup> – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g).</p> <p>Naminis prūsokas (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 lašai/m<sup>2</sup>).</p> <p>Juodasis tarakonas (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16g/m<sup>2</sup> – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis (LDPE) švirkštas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių. Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas.

Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių.

Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Vengti patekimo į akis ir and odos.

Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.

Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.

Netepti ant paviršių ar indų, kurie gali liestis su pašarais ir maistu.

Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

4.2. **Naudojimo aprašymas**

**Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Naudojimo būdas 2 Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais – profesionalus naudojimas**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto /kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas). Išsamus aprašymas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto /kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminių prūsokas (Blattella germanica): 0,12-0,16 g/m <sup>2</sup> (3-4 lašai/m <sup>2</sup> ). Juodasis tarakonas (Blatta orientalis): 0,16-0,24 g/m <sup>2</sup> (4-6 lašai/m <sup>2</sup> ) Amerikinis tarakonas (Periplaneta Americana): 0,16 g/m <sup>2</sup> – 0,24 g/m <sup>2</sup> (4-6 lašai/m <sup>2</sup> ) Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas:

	<p>Dozavimas: priklauso nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g).</p> <p>Naminis prūsokas (<i>Blattella germanica</i>): 0,12-0,16 g/m<sup>2</sup> (3-4 lašai/m<sup>2</sup>).</p> <p>Juodasis tarakonas (<i>Blatta orientalis</i>): 0,16-0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16 g/m<sup>2</sup> – 0,24 g/m<sup>2</sup> (4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikinis (LDPE) švirškstas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas.

Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių.

Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.

Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.

Netepti ant paviršių ar indų, kurie gali liestis su pašarais ir maistu.

Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

#### 4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

#### 4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo*

sąlygomis

Žr. skirsnį 5.5.

#### 4.3. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Naudojimo būdas 3 – Patalpose, plyšiuose ir skylėse, gelis tepamas lašeliais – kvalifikuotas profesionalus naudojimas**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Blattella germanica</i> Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: <i>Blatta orientalis</i> Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: <i>Periplaneta americana</i> Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje, plyšiuose ir skylėse.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).  Išsamus aprašymas: Gelio tepimas lašeliais ant paviršių švirkšto/kasetės pagalba (atviras masalo naudojimo būdas).
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Dozavimas: priklausomai nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g). Naminis prūsokas ( <i>Blattella germanica</i> ): 0,12-0,16 g/m <sup>2</sup> (3-4 lašai/m <sup>2</sup> ). Juodasis tarakonas ( <i>Blatta orientalis</i> ): 0,16-0,24 g/m <sup>2</sup> (4-6 lašai/m <sup>2</sup> ) Amerikinis tarakonas ( <i>Periplaneta Americana</i> ): 0,16 g/m <sup>2</sup> – 0,24 g/m <sup>2</sup> (4-6 lašai/m <sup>2</sup> )  Skiedimas (%): 0  Taikymo skaičiaus ir laikas: Dozavimas: priklausomai nuo paplitimo ir tarakonų rūšies (1 lašas = 0,04 g).  Naminis prūsokas ( <i>Blattella germanica</i> ): 0,12-0,16 g/m <sup>2</sup> (3-4 lašai/m <sup>2</sup> ).  Juodasis tarakonas ( <i>Blatta orientalis</i> ): 0,16-0,24 g/m <sup>2</sup> (4-6 lašai/m <sup>2</sup> )



	<p>Amerikinis tarakonas (<i>Periplaneta Americana</i>): 0,16 g/m<sup>2</sup> – 0,24 g/m<sup>2</sup>(4-6 lašai/m<sup>2</sup>)</p> <p>Naudojimo dažnis: naudoti 1 kartą per 4 savaites. Pakartotinai naudoti tik vieną kartą, jei paplitimas išlieka. Vienu kartu namui nenaudoti daugiau kaip 12 lašų.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Plastikinis (LDPE) švirškėtas, kuriame produkto yra 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g, 9 g ar 10 g.</p> <p>Plastikinė (LDPE) kasetė, kurioje produkto yra 15 g, 20 g, 30 g, 35 g, 40 g ar 50 g.</p>

#### 4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Biocidiniu produktu tepti tik plyšius ir skylės už baldų ir prietaisų. Produkto negalima naudoti ant paviršių.

Nemaišyti su kitomis cheminėmis medžiagomis, netepti vietose, kuriose neseniai buvo naudojamas kitas insekticidas.

Nenaudoti ant medinių ir porėtų paviršių.

Vengti sąlyčio su apdorotais paviršiais.

Gelio netepti ten, kur jis gali būti paveikiamas saulės spindulių ar šilumos. (pvz. radiatorių).

#### 4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudojimo metu dėvėti tinkamas pirštines

Vengti patekimo į akimis ir ant odos.

Produkto negalima naudoti vaikams lengvai prieinamose vietose.

Produktą naudoti tik vietose neprieinamose gyvūnams.

Netepti ant paviršių, ant kurių gaminami, patiekiami, vartojami arba saugomi pašarai ir maistu.

Produktą maisto pramonėje galima naudoti tik nesant maisto produktų, išskyrus sandėliavimo patalpas, kuriose laikomi produktai yra tinkamai supakuoti.

Būtina imtasi tinkamų priemonių, kad užtikrinti, jog ant maisto, įrangos ir virtuvės reikmenų, naudojamų prieš tai šiuo produktu apdorotose patalpose, nebūtų veikliosios medžiagos likučių.

Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamose vietose, atokiai nuo vandens.

Taikyti integruotus kenkėjų kontrolės metodus, kai derinamas cheminių medžiagų, fizinės kontrolės būdų ir kitų visuomenės sveikatos priemonių naudojimas, atsižvelgiant į specifines vietines sąlygas (klimatą, kontroliuojamus organizmus, naudojimo sąlygas ir kt.).

Patikrinti produkto veiksmingumą vietoje: jei reikia, ištirti sumažėjusio veiksmingumo priežastis ir įsitikinti, ar nėra atsparumo, arba nustatyti galimą atsparumą.

Nenaudoti ten, kur įtariamas arba nustatytas atsparumas produktui.

Jei biocidinis produktas neveiksmingas, informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

#### 4.4. **Naudojimo aprašymas**

##### **Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Naudojimo būdas 4 – Patalpose - Padėkliukų su masalu naudojimas – neprofesionalus naudojimas buityje.**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas Išsamus aprašymas: Padėkliukų su masalu naudojimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m <sup>2</sup> ). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m <sup>2</sup> ). Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.  Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra:  2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m <sup>2</sup> ).  - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m <sup>2</sup> ).

	<p>Naudojimo dažnis: po 4 savaitių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

#### 4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių. Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.
2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinę lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.
3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

#### 4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

#### 4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

#### 4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

### 4.5. **Naudojimo aprašymas**

#### **Lentelė 5. Naudojimas # 5 – Naudojimo būdas 5 – Patalpose - Padėkliukų su masalu naudojimas – profesionalus naudojimas.**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana</p>

	Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas  Išsamus aprašymas: Padėkliukų su masalu naudojimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m <sup>2</sup> ). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m <sup>2</sup> ). Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičius ir laikas: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.  Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra:  - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m <sup>2</sup> ).  - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m <sup>2</sup> ).  Naudojimo dažnis: po 4 savaičių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.  Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

#### 4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių.

Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.

2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinę lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.

3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo, padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

#### 4.6. **Naudojimo aprašymas**

##### **Lentelė 6. Naudojimas # 6 – Naudojimo būdas 6 – Patalpose- Padėkliukų su masalu naudojimas – kvalifikuotas profesionalus naudojimas**

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: German cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Blatta orientalis Bendrinis pavadinimas: Oriental cockroach Vystymo stadija: suaugusieji  Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: American Cockroach Vystymo stadija: suaugusieji
Naudojimo sritis	vidaus Patalpose
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Padėkliukų su masalu naudojimas

	<p>Išsamus aprašymas:</p> <p>Padėkliukų su masalu naudojimas</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu. Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m<sup>2</sup>). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m<sup>2</sup>).</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičius ir laikas: Taikoma norma: 0.2-0.4 g/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo paplitimo, paskirstyta ant kelių padėkliukų su masalu.</p> <p>Pavyzdžiui, naudojant padėkliukų su 2,5 g masalo dozė yra: - 2 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant nedideliame paplitime (5 g/22 m<sup>2</sup>). - 4 padėkliukai su masalu vienam kambariui, esant dideliame paplitime (10 g/22 m<sup>2</sup>).</p> <p>Naudojimo dažnis: po 4 savaičių padėkliukus su masalu reikia pakeisti naujais, jei paplitimas išlieka.</p> <p>Naudojimo periodiškumas: naudojimą galima pakartoti praėjus 3 mėnesiams po ankstesnio kenkėjų sunaikinimo</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Kvalifikuoti profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Plastikiniai padėkliukai, kuriuose gelinio masalo yra po 1 g, 1,2 g, 1,5 g, 2 g arba 2,5 g.

#### 4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Gelį statyti tamsiose ir drėgnose vietose: po kriaukle, už unitazo, šalia vamzdžių.

Padėkliukai su geliniu masalu.

1. Padėkliuko atidarymas: plastikinės dėžutės galą nukirpti pagal kirpimo liniją.
2. Padėkliuko paruošimas: nuspausti kapsulę ir laikyti, kol gelis užpildys centrinį lovelį. Paruošus padėkliuką, kapsulės nenuimti.
3. Paruoštą padėkliuką padėti rekomenduojamoje vietoje.

#### 4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Padėkliukų su masalu neatidaryti ir neardyti.

Niekada nekišti pirštų į padėkliuko angas.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

Taikyti integruotus kenkėjų kontrolės metodus, kai derinamas cheminių medžiagų, fizinės kontrolės būdų ir kitų visuomenės sveikatos priemonių naudojimas, atsižvelgiant į specifines vietines sąlygas (klimatą, kontroliuojamus organizmus, naudojimo sąlygas ir kt.).

Patikrinti produkto veiksmingumą vietoje: jei reikia, iširti sumažėjusio veiksmingumo priežastis ir įsitikinti, ar nėra atsparumo, arba nustatyti galimą atsparumą.

Nenaudoti ten, kur įtariamas arba nustatytas atsparumas produktui.

Jei biocidinis produktas neveiksmingas, informuoti autorizacijos liudijimo turėtoją.

#### 4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. skirsnį 5.3.

#### 4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. skirsnį 5.4.

#### 4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. skirsnį 5.5.

## 5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Prieš naudojimą visada perskaityti etiketę ar informacinį lapelį, laikytis visų pateiktų instrukcijų.

Prieš naudojimą reikia įvertinti paplitimo apimtis ir vietas.

Naudoti tik patalpose.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Šį produktą naudoti pakaitomis su produktais, kurių veikliosios medžiagos skiriasi, kad išvengti atsparumo atsiradimo.

Masalo negalima dėti vietose, kur jis galėtų užteršti maistą, pašarus ar geriamąjį vandenį.

Produktą naudoti pakartotinai, tik kol esant kenkėjų paplitimui.

Produktą naudoti rekomenduojamais kiekiais ir intervalais.

Siekiant veiksmingo produkto naudojimo, patariama laikytis geros higienos praktikos: pašalinti ir užkirsti patekimą prie maisto šaltinių. Masalas turi būti pagrindinis prieinamas tarakonų maisto šaltinis.

Siekiant efektyvumo, tikrinti masalą kartą per savaitę ir pakeisti / papildyti, jei jis sugadintas ar užterštas.

Masalą naudoti saugiai, kad nekiltų pavojus, kad ji gali suvartoti kiti gyvūnai arba vaikai.

Nemesti produkto ant žemės, į vandens telkinius, praustuves ar kanalizaciją.

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. (P273).

Naudoti tik uždaroje sunkiai prieinamoje vietoje, atokiai nuo vandens.

Po naudojimo padėkliukus su masalu susirinkti ir pašalinti.

Nesunaudotą produktą, jo pakuotę ir kitas visas kitas atliekas (t.y. negyvus vabzdžius) šalinti pagal vietinius reikalavimus.

### 5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

- Patekus į akis, skalauti ne trumpiau kaip 15 minučių dideliu kiekiu vandens. NEPAMIRŠTI išimti kontaktinius lęšius.
- Patekus ant odos, plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, netrinti.
- Jeigu būtina, nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą ir, esant galimybei, parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Nepalikti nukentėjusiojo asmens be priežiūros.

Gydymo patarimai gydytojams ir slaugos personalui

- Simptominis ir palaikomasis gydymas

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

Priemonės, skirtos apsaugoti aplinką:

Atsargumo priemonės: Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir gruntinius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemas ir kt., naudoti tinkamas barjerines priemones ir uždaromas drenažo sistemas.

Pasitarkite su atsakingomis tarnybomis dėl nuotėkio į vandens telkinius, drenažo sistemas ar kanalizaciją.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipyliusią medžiagą absorbuoti inertinėmis medžiagomis (smėliu, kaoliniu ...), surinkti į talpyklas, tinkamai paženklinti ir tvarkyti kaip pavojingas atliekas.

### 5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus (P501).

### 5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikant originalioje talpykloje ir įprastomis sąlygomis, tinka naudoti 4 metus.

Laikyti originalioje talpykloje.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

Produktą rekomenduojama laikyti 5 - 45 °C temperatūroje.

## 6. **KITA INFORMACIJA**

Apibrėžimai:

Kvalifikuoti profesionalūs vartotojai: juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija).



Profesionalūs vartotojai: vartotojai, naudojantys biocidinius produktus darbo vietoje.

Tokie naudotojai turi žinių ir įgūdžių, kaip naudoti chemines medžiagas, ir prireikus gali tinkamai pasinaudoti (AAP) asmens apsaugos priemonėmis.

Neprofesionalūs vartotojai: vartotojai, kurie nėra profesionalai, ir kurie naudoja produktą savo reikmėms (buityje).

Produkto sudėtyje yra kartumo turinčios medžiagos, atgrasančios žmones ir gyvūnus.

Pareiškėjas turi užtikrinti, kad plačioji visuomenė suvoktų skirtumus tarp rūšių bei paplitimo apimčių ir galėtų dozuoti produktą.

Tik kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Vartotojai turi informuoti, jei produktas neveiksmingas, ir nedelsiant pranešti autorizacijos liudijimo turėtojui apie bet kokius nerimą keliančius požymius, kurie galėtų rodyti kenkėjų atsparumą atsiradimą.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: Imidaklopridas, CAS Nr.138261-41-3, EB 428-040-8, 2,150 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki:

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: Laboratorios Econovar S.L., Calle Muntaner 179 3º 1ª, ES-08036 Barselona, Ispanija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-345(A-18VAP103045/B-22-198)