

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Kenolox 10

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Číslo autorizácie: SK23-024

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0030854-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	3
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	26
5.1. Pokyny na používanie	26
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	27
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	27
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	27
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	28
6. Ďalšie informácie	28

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Kenolox 10
Ultra DES
Spezial FOD
Kenoxylac
Kenoxilac
MiQro Derolox
AIR DES 100
HG desinfectie reiniger
HG nettoyant de désinfection
HG Desinfektionsreiniger

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	CID LINES NV
	Adresa	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko
Číslo autorizácie	SK23-024	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0030854-0000	
Dátum autorizácie	20/12/2023	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31/05/2032	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	CID LINES NV
Adresa výrobcu	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgicko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	1322 - kyselina (+)-L-mliečna
Meno/Názov výrobcu	Purac Biochem bv
Adresa výrobcu	Arksesdijk 46 4206 Gorinchem Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Arksesdijk 46 4206 Gorinchem Holandsko

Účinná látka	1315 - peroxid vodíka
Meno/Názov výrobcu	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa výrobcu	Tijsmanstunnel Wes 2040 Antverpy Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Tijsmanstunnel West 2040 Antverpy Belgicko

Účinná látka	1322 - kyselina (+)-L-mliečna
Meno/Názov výrobcu	Jungbunzlauer S.A.
Adresa výrobcu	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Francúzsko

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
kyselina (+)-L-mliečna		Účinná látka	79-33-4	201-196-2	1
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
Noste ochranné rukavice.
Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.
Kontaminovaný odev vyzlečte. A pred ďalším použitím vyperte.
Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použitie 1: Dezinfekcia tvrdých povrchov rozprašovaním pre profesionálne použitie (PT 04)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútrotné Potravínársky a krmivársky priemysel. Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase) alebo automatické rozprašovanie v uzavretom systéme (pre nože). Detailný opis: Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu, alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase. Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase. Automatické rozprašovanie v uzavretom systéme (pre nože).
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 40 ml/m ² pre rozprašovanie (alebo 20 postrekov pákovým rozprašovačom/m ²) Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Rozprašovanie: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút. Frekvencia: raz za deň.
Kategória(ie) používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Používateľ musí byť zaškolený v správnom používaní predpísaných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu, alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu povrchov a materiálov v kuchyniach, jedálňach a potravinárskom alebo krmivárskom priemysle tam, kde sa pripravujú potraviny, napr. na dezinfekciu podláh, stien, kuchynských pracovných dosiek, strojov na spracovanie potravín, dosiek na rezanie a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotkových obrazoviek, držiadiel, vypínačov) rozprašovaním.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Aplikujte neriedený výrobok s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať.

Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času.

Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržiavajte nezúčastnené osoby / širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchov vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa rozprašovaním pákovým rozprašovačom na dezinfekciu malých povrchov a materiálov v kuchyniach, jedálňach a potravinárskom alebo krmivárskom priemysle tam, kde sa pripravujú potraviny, napr. na dezinfekciu kuchynských pracovných dosiek, strojov na spracovanie potravín, dosiek na rezanie a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotkových obrazoviek, držiadiel, vypínačov).

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Aplikujte neriedený výrobok pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si

pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po dobe kontaktu.

Udržiavajte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

Automatické rozprašovanie v uzavretých systémoch (pre nože):

Pred aplikáciou výrobku je potrebné nože dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Aplikujte neriedený výrobok automatickým rozprašovaním v uzavretých systémoch. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy

musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie a plnenie, nízkotlakové rozprašovanie, rozprašovanie ručným pákovým rozprašovačom, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistenie vybavenia, údržbu a opravu:

Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).

Textílie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:

Pre aplikáciu nízkotlakovým, hrubým postrekom veľkých povrchov v potravinárskom a krmivárskom priemysle:

V čistých priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 40 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prílbou/kapucňou/maskou (TH3/TM3) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V inštitucionálnych kuchyniach a jedálňach, priemyselných kuchyniach, priemyselných výrobných priestoroch a čistých priestoroch so zvýšeným vetraním (20/h alebo viac):

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Na aplikáciu nízkotlakovým, hrubým postrekom malých povrchov v potravinárskom a krmivárskom priemysle (napr. povrchu veľkosti 1 m² alebo spracovateľského stroja): nie je potrebná ochrana dýchacích ciest. Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Na aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na veľkých povrchoch (povrchoch veľkosti 10 m²) v potravinárskom a krmivárskom priemysle:

V inštitucionálnych kuchyniach a jedálňach:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Na aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na malých povrchoch v potravinárskom a krmivárskom priemysle (napr. na povrchu veľkosti 1 m² alebo spracovateľskom stroji) sa odporúča používanie profesionálneho tvárového štítu.

Na aplikáciu počas dezinfekcie nožov automatickým postrekom v potravinárskom a krmivárskom priemysle (používateľ neprichádza do kontaktu s biocídnym výrobkom) nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Na utieranie dezinfikovaných povrchov dosucha v potravinárskom a krmivárskom priemysle sú potrebné rovnaké prostriedky na ochranu dýchacích ciest ako počas aplikačnej fázy.

Pre čistenie zariadení, údržbu a opravu nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Opatrenia na zmiernenie rizika pre nezúčastnené osoby a profesionálnych pracovníkov bez ochranných prostriedkov:

Ošetrovanie malých povrchov: Širokej verejnosti nie je dovolené dotýkať sa predmetov, ktoré boli dezinfikované, alebo ich používať, až kým nevyschnú.

Ošetrovanie veľkých povrchov: Nie je dovolený žiadny prístup širokej verejnosti počas ošetrovania, až kým povrchy nie sú suché a ošetrovaný priestor nie je dostatočne vyvetraný.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Použitie 2: Dezinfekcia tvrdých povrchov ponorením pre profesionálne použitie (PT 04)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje</p> <p>Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Potravinársky a krmivársky priemysel. Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: otvorený systém: ponorenie Detailný opis:</p> <p>Ponorenie a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu, alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase.</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: ponorenie v kúpeli Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Ponorenie: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút. Aplikačná dávka pre ponáranie: ponorený v kúpeli. Frekvencia: raz za deň.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	

Veľkosti balenia a obalový materiál

Profesionálne

500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l.
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg.
HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Ponorenie a ponechanie predmetov, aby vyschli na vzduchu, alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase: Kenolox 10 sa používa ponáraním na dezinfekciu materiálov v kuchyniach a potravinárskom a krmivárskom priemysle, napr. nožov ponorením.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Ponorte predmety do kúpeľa Kenolox 10 (+20 °C). Ošetrované predmety je potrebné ponechať mokré počas vhodného kontaktného času (pozrite časť dávkovanie a časový rozvrh). Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrované predmety vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržujte neúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

Použitý roztok sa zneškodňuje vyliatím do kanalizácie.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie a plnenie, ponáranie/namáčanie, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistení zariadení, údržbe alebo oprave:

Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).

Textílie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:

Pre aplikáciu ponorením/namáčaním v potravinárskom a krmivárskom priemysle: nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Na utieranie dezinfikovaných povrchov dosucha v potravinárskom a krmivárskom priemysle sú potrebné rovnaké prostriedky na ochranu dýchacích ciest ako počas aplikačnej fázy.

Pre čistenie zariadení, údržbu a opravu nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Opatrenia na zmiernenie rizika pre neúčastnené osoby a profesionálnych pracovníkov bez ochranných prostriedkov: nevyžadujú sa.

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Použitie 3: Dezinfekcia tvrdých povrchov zahmlievaním pre profesionálne použitie (PT 04)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútročné Potravínársky a krmivársky priemysel. Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: zahmlievanie Detailný opis: zahmlievanie.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 30 ml/m ³ Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Zahmlievanie: V miestnostiach s veľkosťou 30 až 150 m ³ , baktérie, kvasinky a vírusy: 30 ml/m ³ , kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku). V miestnostiach s veľkosťou 30 až 2000 m ³ , baktérie a kvasinky: 30 ml/m ³ , kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku). Frekvencia: raz za deň.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Zahmlievacie:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu priestorov kuchýň a priestorov v celom potravinárskom a krmivárskom priemysle zahmlievaním.

Kenolox 10 je určený na použitie zahmlievaním za studena. Povrchy, zariadenia a materiály v miestnosti, ktorá sa má dezinfikovať, je potrebné najprv dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou.

Pred dezinfekciou sa musia vykonať nasledujúce činnosti:

- odstráňte prebytočnú vodu;
- odstráňte alebo ochráňte citlivé elektronické zariadenia a iné predmety, ktoré sú citlivé na vlhkosť;
- otvorte zásuvky a dvierka skriniek;
- vypnite ventiláciu a uzavrite okná a vetracie otvory;
- uzavrite toaletné misy (len pre aplikáciu výrobkov PT 2).

Opláchnutie nie je potrebné.

Detailné pokyny ohľadom postupov zahmlievaním pozrite vo všeobecných pokynoch pre použitie.

Mikrobiologická validácia: pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

Opätovný vstup do miestnosti:

Miestnosť je možné opäť uvoľniť pre používanie, len ak nameraná koncentrácia peroxidu vodíka 1,25 mg/m³ (0,86 ppm).

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie, plnenie, čistenie zariadení, údržbu a opravu:

Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).

Ochrana dýchacích ciest:

Počas aplikácie zahmlievaním v potravinárskom a krmivárskom priemysle (používateľ neprichádza do kontaktu s biocídnym výrobkom) nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Počas dezinfekcie nesmú byť v miestnosti prítomní ľudia, zvieratá, rastliny, lieky alebo potraviny. Nie je dovolený žiadny prístup širokej verejnosti počas ošetrovania, až kým povrchy nie sú suché a ošetrovaný priestor nie je dostatočne vyvetraný.

Po zahmlievaní a uplynutí kontaktného času musí byť miestnosť vyvetraná, najlepšie mechanickým vetraním. Čas vetrania sa musí stanoviť meraním pomocou vhodného meracieho zariadenia. Opätovný vstup je povolený, keď koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu poklesne pod 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

Profesionálny používateľ môže vstúpiť do miestnosti len v núdzových situáciách alebo na reaktiváciu vetrania, keď úroveň peroxidu vodíka poklesne pod 36 ppm (50 mg/m³), po zvážení použitia prostriedkov na ochranu dýchacích ciest s APF 40 proti výparom (typ prostriedkov na ochranu dýchacích ciest špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Pred opätovným vstupom použite kalibrovaný snímač na potvrdenie, že koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu je ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.4 Opis použitia

Použitie 4 - Použitie 4: Dezinfekcia tvrdých povrchov výrobkom pripraveným na použitie pre neprofesionálne použitie (PT 04)

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne V súkromných domoch/kuchyniach. Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase). Detailný opis: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 40 ml/m ² (alebo 20 postrekov pákovým rozprašovačom/m ²) Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia: raz za deň. S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.
Kategória(ie) používateľ'ov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l. Pákový rozprašovač. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.
Dodržiavajte návod na použitie.

Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:
Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu malých povrchov v kuchyniach a domácnostiach, napr. kuchynských pracovných dosiek, dosiek na krájanie a nožov rozprašovaním.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou.

Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.
Aplikujte neriedený výrobok pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Ponechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite ošetrené povrchy/materiál dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržiavajte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.
Výrobok sa musí rozprašovať smerom nadol.
Po dezinfekcii zabezpečte adekvátne vetranie (otvorené okná a dvere).
Ošetrené povrchy musia byť neprístupné pre dočkatá, deti, domáce zvieratá a nečieľové zvieratá, až kým tieto povrchy nebudú suché.

4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.
Uchovávajte mimo dosahu detí a nečieľových zvierat/domácich zvierat.

4.5 Opis použitia

Použitie 5 - Použitie 5: Dezinfekcia tvrdých povrchov v zdravotníckych priestoroch pákovým rozprašovačom pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútročné V ZDRAVOTNÍCTVE (medicínske a nemedicínske priestory, ako sú čisté priestory, laboratóriá a biotechnologické, farmaceutické a kozmetické výrobné zariadenia). Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase). Detailný opis: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 40 ml/m ² pre rozprašovanie (alebo 20 postrekov pákovým rozprašovačom/m ²) Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Rozprašovaním: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchov vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:
Kenolox 10 sa používa rozprašovaním pákovým rozprašovačom na dezinfekciu malých priestorov a materiálov v zdravotníctve/nemocniciach, napr. nábytku, kúpeľní, sedadiel toaliet a splachovania toaliet, povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotkových obrazoviek, držiadiel, vypínačov, vozíkov, nemocničných postelí, diaľkových ovládačov).
Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.
Aplikujte neriedený výrobok pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrované povrchy musia ostať mokré počas doby kontaktu. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrované povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase.
Udržiavajte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie a plnenie, rozprašovanie ručným pákovým rozprašovačom, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistenie zariadení, údržbu a opravu:

Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.
Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).
Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).
Textílie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:

Pre aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na malých povrchoch v zdravotníctve (napr. povrch veľkosti 0,5 - 2 m²) sa odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.
Na utieranie dezinfikovaných povrchov dosucha v zdravotníctve sú potrebné rovnaké prostriedky na ochranu dýchacích ciest ako počas aplikačnej fázy.

Pre čistenie zariadení, údržbu a opravu nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.
Opatrenia na zmiernenie rizika pre nezúčastnené osoby a profesionálnych pracovníkov bez ochranných prostriedkov: nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.
Ošetrovanie malých povrchov: Širokej verejnosti nie je dovolené dotýkať sa predmetov, ktoré boli dezinfikované, alebo ich používať, až kým nevyschnú.

4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.6 Opis použitia

Použitie 6 - Použitie 6: Dezinfekcia tvrdých povrchov v zdravotníckych priestoroch zahmlievaním pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

V ZDRAVOTNÍCTVE (medicínske a nemedicínske priestory, ako sú čisté priestory, laboratória a biotechnologické, farmaceutické a kozmetické výrobné zariadenia).
Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov s predchádzajúcim vyčistením.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: zahmlievanie
Detailný opis:
zahmlievanie.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 30 ml/m³
Riedenie (%): -
Počet a časový rozvrh aplikácie:
S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote.
Zahmlievanie:
V miestnostiach s veľkosťou 30 až 150 m³, baktérie, kvasinky a vírusy: 30 ml/m³, kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku).
V miestnostiach s veľkosťou 30 až 2000 m³, baktérie a kvasinky: 30 ml/m³, kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku).

Kategória(ie) používateľ'ov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l.
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg.
HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.6.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Zahmlievanie:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu miestností v zdravotníctve zahmlievaním.

Kenolox 10 je určený na použitie zahmlievaním za studena. Povrchy, zariadenia a materiály v miestnosti, ktorá sa má dezinfikovať, je potrebné najprv dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou.

Pred dezinfekciou sa musia vykonať nasledujúce činnosti:

- odstráňte prebytočnú vodu;
- odstráňte alebo ochráňte citlivé elektronické zariadenia a iné predmety, ktoré sú citlivé na vlhkosť;
- otvorte zásuvky a dvierka skriniek;
- vypnite ventiláciu a uzavrite okná a vetracie otvory;
- uzavrite toaletné misy (len pre aplikáciu výrobkov PT 2).

Opláchnutie nie je potrebné.

Detailné pokyny ohľadom postupov zahmlievaním pozrite vo všeobecných pokynoch pre použitie.

Mikrobiologická validácia: pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

Opätovný vstup do miestnosti:

Miestnosť je možné opäť uvoľniť pre používanie, len ak nameraná koncentrácia peroxidu vodíka 1,25 mg/m³ (0,86 ppm).

4.6.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie, plnenie, čistenie zariadení, údržbu a opravu:

Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).

Ochrana dýchacích ciest:

Počas dezinfekcie nesmú byť v miestnosti prítomní ľudia, zvieratá, rastliny, lieky alebo potraviny. Nie je dovolený žiadny prístup širokej verejnosti počas ošetrovania, až kým povrchy nie sú suché a ošetrovaný priestor nie je dostatočne vyvetraný.

Po zahmlievaní a uplynutí kontaktného času musí byť miestnosť vyvetraná, najlepšie mechanickým vetraním. Čas vetrania sa musí stanoviť meraním pomocou vhodného meracieho zariadenia. Opätovný vstup je povolený, keď koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu poklesne pod 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

Profesionálny používateľ môže vstúpiť do miestnosti len v núdzových situáciách alebo na reaktiváciu vetrania, keď úroveň peroxidu vodíka poklesne pod 36 ppm (50 mg/m³), po zväžení použitia prostriedkov na ochranu dýchacích ciest s APF 40 proti výparom (typ prostriedkov na ochranu dýchacích ciest špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Pred opätovným vstupom použite kalibrovaný snímač na potvrdenie, že koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu je ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

4.6.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.6.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.6.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.7 Opis použitia

Použitie 7 - Použitie 7: Dezinfekcia veľkých povrchov v zdravotníckych priestoroch rozprašovaním pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútročné V ZDRAVOTNÍCTVE (medicínske a nemedicínske priestory, ako sú čisté priestory, laboratóriá a biotechnologické, farmaceutické a kozmetické výrobné zariadenia). Dezinfekcia tvrdých/neporéznych povrchov s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase). Detailný opis: Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu, alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase. Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase (veľkosť povrchu 8 - 10 m ²).
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 40 ml/m ² pre rozprašovanie Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Rozprašovanie: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.
Kategória(ie) používateľov	Vyškolенý profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.7.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom alebo rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchov vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu povrchov v zdravotníctve/nemocniciach, napr. stien, podláh, kúpeľní, sedadiel toaliet, splachovaní toaliet a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotykových obrazoviek, držiadiel, vypínačov, vozíkov, nemocničných postelí, diaľkových ovládačov) rozprašovaním.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Aplikujte neriedený výrobok s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom alebo pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržujte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

4.7.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Používateľ musí byť zaškolený v správnom používaní predpísaných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

Pre miešanie a plnenie, nízkotlakové rozprašovanie, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistenie zariadení, údržbu a opravu: Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).

Textílie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:

Pre aplikáciu nízkotlakovým hrubým rozprašovaním na veľkých povrchoch v zdravotníctve:

V laboratóriách, na operačných sálach, lekárskech ordináciách, na jednotkách intenzívnej starostlivosti:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 40 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH3/TM3) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V sanitárnych priestoroch, nemocničných priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 40 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Zabezpečte, aby intenzita vetrania počas a po dezinfekcii bola minimálne 3 výmeny vzduchu za hodinu.

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V čistých priestoroch so zvýšeným vetraním (20/h alebo viac):

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Zabezpečte, aby intenzita vetrania počas a po dezinfekcii bola minimálne 3 výmeny vzduchu za hodinu

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Vo veľkých verejných priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 10 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Pre aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na veľkých povrchoch (veľkosť povrchu 8-10 m²) v zdravotníctve:

V čistých priestoroch, sanitárnych priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V čistých priestoroch so zvýšeným vetraním (20/h alebo viac), laboratóriách a lekárskech ordináciách:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 10 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra, písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

4.7.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.7.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.7.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.8 Opis použitia

Použitie 8 - Použitie 8: Dezinfekcia tvrdých povrchov v iných než zdravotníckych priestoroch pákovým rozprašovačom pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	-
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: baktérie Bežný názov: baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: kvasinky Bežný názov: kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorne V iných než zdravotníckych priestoroch (laboratóriách, čistých priestoroch a biotechnologických, farmaceutických a kozmetických výrobných zariadeniach). Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase). Detailný opis: Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: 40 ml/m ² pre rozprašovanie (alebo 20 postrekov pákovým rozprašovačom/m ²) Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Rozprašovanie: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.
Kategória(ie) používateľ'ov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.8.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchov vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu malých povrchov v domácnostiach a verejných priestoroch, napr. kúpeľní, sedadiel toaliet, splachovaní toaliet, a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotkových obrazoviek, držadiel, vypínačov, diaľkových ovládačov) rozprašovaním.
Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.
Aplikujte neriedený výrobok pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržiavajte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

4.8.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie a plnenie, rozprašovanie ručným pákovým rozprašovačom, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistenie zariadení, údržbu a opravu:
Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné.
Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).
Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).
Textílie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:
Na aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na malých povrchoch v iných než zdravotníckych priestoroch (napr. povrch veľkosti 0,5 - 2 m²) sa odporúča používanie profesionálneho tvárového štítu.
Pre čistenie zariadení, údržbu a opravu nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.
Opatrenia na zmiernenie rizika pre nezúčastnené osoby a profesionálnych pracovníkov bez ochranných prostriedkov: nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.
Ošetrovanie malých povrchov: Širokej verejnosti nie je dovolené dotýkať sa predmetov, ktoré boli dezinfikované, alebo ich používať, až kým nevyschnú.

4.8.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.8.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.8.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.9 Opis použitia

Použitie 9 - Použitie 9: Dezinfekcia tvrdých povrchov v iných než zdravotníckych priestoroch zahmlievaním pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicidy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

V iných než zdravotníckych priestoroch (laboratóriách, čistých priestoroch a biotechnologických, farmaceutických a kozmetických výrobných zariadeniach).
Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: zahmlievanie
Detailný opis:
zahmlievanie.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 30 ml/m³
Riedenie (%): -
Počet a časový rozvrh aplikácie:
S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote.
Zahmlievanie:
V miestnostiach s veľkosťou 30 až 150 m³, baktérie, kvasinky a vírusy: 30 ml/m³, kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku).
V miestnostiach s veľkosťou 30 až 2000 m³, baktérie a kvasinky: 30 ml/m³, kontaktný čas 3 hodiny (po difúzii výrobku).

Kategória(ie) používateľ'ov

Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l.
1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg.
HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.9.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Kenolox 10 je určený na použitie zahmlievaním za studena. Povrchy, zariadenia a materiály v miestnosti, ktorá sa má dezinfikovať, je potrebné najprv dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou.

Pred dezinfekciou sa musia vykonať nasledujúce činnosti:

- odstráňte prebytočnú vodu;
- odstráňte alebo ochráňte citlivé elektronické zariadenia a iné predmety, ktoré sú citlivé na vlhkosť;
- otvorte zásuvky a dvierka skriniek;
- vypnite ventiláciu a uzavrite okná a vetracie otvory;
- uzavrite toaletné misy (len pre aplikáciu výrobkov PT 2).

Opláchnutie nie je potrebné.

Detailné pokyny ohľadom postupov zahmlievaním pozrite vo všeobecných pokynoch pre použitie.

Mikrobiologická validácia: pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

Opätovný vstup do miestnosti:

Miestnosť je možné uvoľniť pre používanie, len ak nameraná koncentrácia peroxidu vodíka 1,25 mg/m³ (0,86 ppm).

4.9.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pre miešanie, plnenie, čistenie zariadení, údržbu a opravu:
Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).
Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943).
Pre aplikáciu počas aplikačnej fázy zahmlievaním v iných než zdravotníckych priestoroch (používateľ neprichádza do kontaktu s biocídnym výrobkom) nie je potrebná ochrana dýchacích ciest.

Zahmlievanie:

Počas dezinfekcie nesmú byť v miestnosti prítomní ľudia, zvieratá, rastliny, lieky alebo potraviny. Nie je dovolený žiadny prístup širokej verejnosti počas ošetrovania, až kým povrchy nie sú suché a ošetrovaný priestor nie je dostatočne vyvetraný.
Po zahmlievaní a uplynutí kontaktného času musí byť miestnosť vyvetraná, najlepšie mechanickým vetraním. Čas vetrania sa musí stanoviť meraním pomocou vhodného meracieho zariadenia. Opätovný vstup je povolený, keď koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu poklesne pod 0,9 ppm (1,25 mg/m³).
Profesionálny používateľ môže vstúpiť do miestnosti len v núdzových situáciách alebo na reaktiváciu vetrania, keď úroveň peroxidu vodíka poklesne pod 36 ppm (50 mg/m³), po zväžení použitia prostriedkov na ochranu dýchacích ciest s APF 40 proti výparom (typ prostriedkov na ochranu dýchacích ciest špecifikuje držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).
Pred opätovným vstupom použite kalibrovaný snímač na potvrdenie, že koncentrácia H₂O₂ vo vzduchu je ≤ 0,9 ppm (1,25 mg/m³).

4.9.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.9.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.9.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.10 Opis použitia

Použitie 10 - Použitie 10: Dezinfekcia veľkých povrchov v iných než zdravotníckych priestoroch rozprašovaním pre profesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

	<p>Vedecký názov: vírusy Bežný názov: vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>V iných než zdravotníckych priestoroch (laboratóriách, čistých priestoroch a biotechnologických, farmaceutických a kozmetických výrobných zariadeniach). Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase). Detailný opis: Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu, alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase. Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase (veľkosť povrchu 8 - 10 m²).</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 40 ml/m² pre rozprašovanie Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote. Rozprašovaním: Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty. Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Vyškolенý profesionál</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>500 ml, 750 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 220 l, 600 l, 1000 l, 1100 l. 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg. HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).</p>

4.10.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.

Používateľ musí byť zaškolený v správnom používaní predpísaných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

Rozprašovanie s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom alebo rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu povrchov v domácnostiach a verejných priestoroch, napr. stien, podláh, kúpeľní, sedadiel toaliet, splachovaní toaliet, skriniek, šatní a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotykových obrazoviek, držiadiel, vypínačov, diaľkových ovládačov) rozprašovaním.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Aplikujte neriedený výrobok s (nízkotlakovým) chrbtovým rozprašovačom alebo pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržiavajte nezúčastnené osoby / širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

Očakáva sa, že používateľ pripraví presné množstvo potrebné na dezinfekciu. Zneškodnenie zostávajúceho roztoku, ak nejaký je, sa vykonáva vyliatím do kanalizácie. Po aplikácii vyčistite použité vybavenie.

4.10.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Používateľ musí byť zaškolený v správnom používaní predpísaných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

Pre miešanie a plnenie, nízkotlakové rozprašovanie, utieranie dosucha po dezinfekcii, čistenie zariadení, údržbu a opravu: Používanie ochrany očí počas manipulácie s výrobkom je povinné. Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Musí sa nosiť ochranná kombinéza (aspoň typu 6, EN 13034, 13962, 14605 alebo 943). Textilie použité na utretie dezinfikovaných povrchov dosucha je potrebné uchovávať v uzavretej nádobe.

Ochrana dýchacích ciest:

Pre aplikáciu nízkotlakovým hrubým rozprašovaním na veľkých povrchoch v iných priestoroch než v zdravotníctve:

V laboratóriách:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 40 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH3/TM3) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V sanitárnych priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 40 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH3/TM3) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Zabezpečte, aby intenzita vetrania počas a po dezinfekcii bola minimálne 3 výmeny vzduchu za hodinu. Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V čistých priestoroch so zvýšeným vetraním (20/h alebo viac):

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Vo veľkých verejných priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 10 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

Pre aplikáciu ručným pákovým rozprašovačom na veľkých povrchoch (povrchoch veľkosti 8 - 10 m²) v iných priestoroch než v zdravotníctve:

V čistých priestoroch, sanitárnych priestoroch:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 20 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH2/TM2) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

V čistých priestoroch so zvýšeným vetraním (20/h alebo viac) a laboratóriách:

Použitie respiračných ochranných prostriedkov s ochranným faktorom 10 je povinné. Vyžaduje sa aspoň filtračný respirátor s núteným obehom vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo celotvárová maska s plynovým filtrom (typ filtra (písmeno kódu, farba), ktorý uvedie držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku). Odporúča sa používanie profesionálneho tvárového štítu.

4.10.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.10.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.10.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.11 Opis použitia

Použitie 11 - Použitie 11: Dezinfekcia tvrdých povrchov v iných než zdravotníckych priestoroch pre neprofesionálne použitie (PT 02)

Typ výrobku

Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

-

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: baktérie
Bežný názov: baktérie
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: kvasinky
Bežný názov: kvasinky
Vývojové štádium: žiadne údaje

Vedecký názov: vírusy
Bežný názov: vírusy
Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia

Vnútorne

V iných priestoroch než v zdravotníctve. Dezinfekcia na tvrdých/neporéznych povrchoch s predchádzajúcim vyčistením.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: Rozprašovanie (s prípadným utretím dosucha utierkou po kontaktnom čase).
Detailný opis:
Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchu/predmetu vyschnúť na vzduchu alebo utretie povrchu/predmetu dosucha utierkou po kontaktnom čase.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: 40 ml/m² (alebo 20 postrekov pákovým rozprašovačom/m²)
Riedenie (%): -
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Frekvencia: raz za deň.
S neriedeným výrobkom pri izbovej teplote.
Pre účinok proti baktériám a kvasinkám: kontaktný čas 2 minúty.
Pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom: kontaktný čas 5 minút.

Kategória(ie) používateľov

Široká verejnosť (neprofesionálne)

Veľkosti balenia a obalový materiál

500 ml, 750 ml, 1 l.
Pákový rozprašovač.
HDPE (Polyetylén s vysokou hustotou).

4.11.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny pre použitie.
Dodržiavajte návod na použitie.

Rozprašovanie pákovým rozprašovačom a ponechanie povrchov vyschnúť na vzduchu alebo utretie dosucha utierkou po kontaktnom čase:

Kenolox 10 sa používa na dezinfekciu malých povrchov v domácnostiach a verejných priestoroch, napr. malých povrchov v kúpeľniach (napr. kohútikov, umývadiel), sedadiel toaliet, splachovaní toaliet a povrchov prichádzajúcich do kontaktu s rukami (napr. dotykových obrazoviek, držiadiel, vypínačov, diaľkových ovládačov) rozprašovaním.

Pred aplikáciou výrobku je potrebné povrchy a materiály, ktoré sa majú dezinfikovať, dôkladne vyčistiť a opláchnuť čistou vodou. Prebytočnú vodu je potrebné odstrániť.

Aplikujte neriedený výrobok pákovým rozprašovačom na povrch alebo predmet, ktorý sa má dezinfikovať. Vhodný kontaktný čas si pozrite v časti dávkovanie a časový rozvrh. Ošetrené povrchy musia ostať mokré počas kontaktného času. Nie je potrebné záverečné opláchnutie. Nechajte ošetrené povrchy/materiál vyschnúť na vzduchu alebo utrite dosucha utierkou po kontaktnom čase. Udržiavajte nezúčastnené osoby/širokú verejnosť mimo dosahu povrchov, keď povrchy schnú. Ak to nie je možné, utrite povrchy utierkou po kontaktnom čase.

4.11.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Po manipulácii si starostlivo umyte ruky.

Výrobok sa musí rozprašovať smerom nadol.

Po dezinfekcii zabezpečte adekvátne vetranie (otvorené okná a dvere).

Ošetrené povrchy musia byť neprístupné pre dojčatá, deti, domáce zvieratá a neciel'ové zvieratá, až kým tieto povrchy nebudú suché.

4.11.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

4.11.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

4.11.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite si všeobecné pokyny pre použitie.

Uchovávajte mimo dosahu detí a neciel'ových zvierat/domácich zvierat.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Prečítajte si pokyny na používanie špecifické pre dané použitie.

Všetky povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, sa musia pred samotnou dezinfekciou vyčistiť. Na etiketu výrobku bude pridané nasledujúce bezpečnostné upozornenie: „Dôkladne vyčistite, opláchnite a nechajte odietť čistiace kvapaliny z povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať.“

Dezinfekčný cyklus :

Výrobok je určený na používanie v neriedenom stave.

Kontaktný čas závisí od uvažovaného použitia. Prečítajte si opis aplikačnej metódy súvisiacej s každým použitím.

Záverečné opláchnutie (pitnou vodou): nevyžaduje sa.

Dezinfekčné postupy rozprašovaním: povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, musia byť dostatočne vlhké, aby zostali vlhké pre dosiahnutie optimálnej dezinfekcie aj počas požadovaného kontaktného času. Potom by mal používateľ dať pozor na to, aby boli povrchy úplne navlhčené dezinfekčným roztokom. Po príslušnom kontaktnom čase je potrebné povrch/predmet utrieť dosucha utierkou.

Dezinfekčné postupy ponáraním : Kúpeľ nie je určený na opätovné použitie. Použite kúpeľ len raz, po použití ho ihneď vyprázdňte a tesne pred každým použitím ho vymeňte za čerstvý roztok.

Dezinfekčné postupy zahmlieváním :

Počas dezinfekcie nesmú byť v miestnosti žiadni ľudia, zvieratá a potraviny.

Výrobok KENOLOX 10 je kvapalnú dezinfekčný prostriedok pripravený na použitie, ktorý sa aplikuje zahmlieváním pre dezinfekciu vzduchom povrchov (v miestnostiach s veľkosťou od 30 do 150 m³ pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom a v miestnostiach s veľkosťou od 30 do 2000 m³ pre účinok proti baktériám a kvasinkám) a používa sa len profesionálnymi používateľmi. Vždy skontrolujte kompatibilitu s materiálmi, ktoré sa majú dezinfikovať.

Dezinfekcia sa musí vykonať v uzavretých priestoroch.

Dezinfekcia vzduchom by sa mala vykonať až po dôkladnom vyčistení a opláchnutí. Povrchy, ktoré sa majú dezinfikovať, by mali pred dezinfekciou vyschnúť.

Venujte prosím pozornosť otvoreniu dverí skriniek.

Skontrolujte teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu v miestnosti (má byť od 51 do 87,3 %), aby ste dosiahli optimálnu úroveň účinnosti výrobku.

Miestnosť, v ktorej sa robí zahmlievanie, je počas zahmlievania dobre utesnená, žiadny používateľ nie je prítomný:

Pred začatím dezinfekčného cyklu zahmlieváním je ošetrovaná miestnosť utesnená. Všetky bezpečnostné úlohy spojené s vykonaním dekontaminácie sa zverujú používateľovi, ktorý absolvoval potrebné zaškolenie. Prvým z krokov je vypnutie vzduchotechnických jednotiek a zatvorenie prívodu a vratného toku vzduchu, aby sa výrobok nerozšíril do ostatných miestností. Dvere smerom von z priestoru sa potom uzamknú a ak spoje nie sú dostatočne tesné, utesnia sa lepiacou páskou. Prednostne zvolte oranžovú pásku alebo pásku jasnej farby na upútanie pozornosti na oznam „Zákaz vstupu, prebieha dezinfekcia miestnosti“ . Používajte len v priestoroch neprístupných pre širokú verejnosť a spoločenské zvieratá.

Výrobok KENOLOX 10 bol vyvinutý na použitie napríklad s atomizéromi NEBULO-NEBUROTOR. Počet zariadení (alebo trysiek) sa musí prispôsobiť objemu, ktorý má byť ošetrovaný.

Peniaci výrobok: nepretrpávajte počas miešania a plnenia, aby sa zabránilo peneniu.

Je však možné aj použitie iných atomizérov. Musia byť navrhnuté tak, aby zabezpečovali tvorbu hmly schopnej zotrvať vo vzduchu a tieto zariadenia spĺňajú nasledujúce charakteristiky:

- veľkosť častíc: 10 µm;

- prietok: 0,3 – 15 l/h;

- aplikačná dávka: 30 ml/m³;

- veľkosť miestnosti od 30 do 150 m³ (pre účinok proti baktériám, kvasinkám a vírusom) a od 30 do 2000 m³ (pre účinok proti baktériám a kvasinkám).

Používateľ musí vždy vykonať mikrobiologickú validáciu dezinfekcie v priestoroch, ktoré sa majú dezinfikovať (alebo vo vhodnej „štandardnej miestnosti“, ak je to vhodné) so zariadeniami, ktoré sa majú použiť a vypracovať protokol pre dezinfekciu týchto miestností, ktorý sa môže použiť neskôr. Každé zariadenie alebo konkrétna inštalácia sa pri nastavovaní systematicky validuje.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

PO VDYCHNUTÍ: Ak sa objavia príznaky volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Vyzlečte všetok kontaminovaný odev a pred opätovným použitím ho vyperte. Umyte pokožku vodou. Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 5 minút. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Podajte niečo na pitie, ak je postihnutá osoba schopná prehĺtať. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Obal a obsah musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad pod plnou zodpovednosťou vlastníka tohto odpadu. Nevyhadzujte odpad do kanalizácie a vodných tokov. Zneškodňujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi legislatívnymi predpismi.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Ak sa nádoba nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú.
Neskladujte pri teplotách nad 40 °C.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Čas použiteľnosti výrobku je 2 roky.

6. Ďalšie informácie

Len pre profesionálne použitie:

P280 - Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare/ochranu tváre.

Len pre neprofesionálne použitie:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.