

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Bromadiolone trutka zbożowa

Grupa produktowa

PT14: Rodentycydy

Numer zezwolenia: PL/2013/0093/A/MR

Numer zasobu w R4BP: PL-0002354-0000

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Ratimor Bromadiolone trutka zbożowa Bromadiolone trutka zbożowa Extrat bromadiolon ziarno Bioxi bromadiolon ziarno Focus bromadiolon ziarno
----------------	---

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Unichem d.o.o.
	Adres	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Słowenia
Numer zezwolenia		PL/2013/0093/A/MR
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0002354-0000
Data udzielenia zezwolenia		03/12/2012
Data ważności zezwolenia		31/12/2025

1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	Unichem d.o.o.
Adres producenta	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Słowenia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Słowenia

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Bromadiolon
Nazwa producenta	Activa S.r.l
Adres producenta	Via Feltre 32, 20132 Milan, Włochy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Tezza S.r.l, Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio, Włochy

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	substancja czynna	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: przynęta gotowa do użycia: ziarno

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	<p>H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.</p> <p>H360D: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.</p> <p>H372: Powoduje uszkodzenie narządów krew w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia -.</p> <p>EUH208: Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.</p>
Zwroty wskazujące środki ostrożności	<p>P201: Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.</p> <p>P202: Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.</p> <p>P260: Nie wdychać pyłu.</p> <p>P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.</p> <p>P270: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.</p> <p>P280: Stosować rękawice ochronne.</p> <p>P308+P313: W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>P308+P313: W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady.</p> <p>P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć za zasięgnąć porady.</p> <p>P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć zgłosić.</p> <p>P405: Przechowywać pod zamknięciem.</p> <p>P501: zawartość usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.</p> <p>P501: pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.</p>

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. Zwalczanie myszy wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Mysz domowa Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m. Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg 1. Przynęta luzem pakowana w następujące opakowania zbiorcze: <ul style="list-style-type: none">• torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, płyta pilśniowa, papier) o masie do 10 kg;• torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w torbie (Natron) o masie do 10 kg;• torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w wiaderku z pokrywką (PP/HDPE) o masie do 10 kg;• torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, tektura falista) o masie do 10 kg;• pudło (PE, PP) o masie do 10 kg;• torba (Natron) o masie do 10 kg;• wiadro (PP, PE) z pokrywką o masie do 10 kg;• pudełko (karton, tektura falista, papier) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE) o masie do 10 kg;• worek (PE, PP) o masie do 10 kg.

2. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25, g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg;
 - zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg;
 - zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z pokrywką o masie do 25 kg;
 - pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
 - torba (Natron) o masie do 25 kg;
 - wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
 - pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg;
 - fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg.
3. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 30 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg;
 - pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
 - pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg;
 - torba (Natron) o masie do 25 kg;
 - worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg;
 - wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
 - tuba (PP, PE) o masie do 20 kg;
 - fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
 - torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg;
 - puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg;
 - pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg;
 - pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg;

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 2-3 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.1.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu wodą.

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2. Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg 1. Przynęta luzem pakowana w następujące opakowania zbiorcze:

- torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, płyta pilśniowa, papier) o masie do 10 kg;
- torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w torbie (Natron) o masie do 10 kg;
- torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w wiaderku z pokrywką (PP/HDPE) o masie do 10 kg;
- torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, tektura falista) o masie do 10 kg;
- pudło (PE, PP) o masie do 10 kg;
- torba (Natron) o masie do 10 kg;
- wiadro (PP, PE) z pokrywką o masie do 10 kg;
- pudełko (karton, tektura falista, papier) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE) o masie do 10 kg;
- worek (PE, PP) o masie do 10 kg;
- wsad (HDPE) do stacji deratyzacyjnej na szczury zawierający 200 g przynęty, pakowany w pudełko (tektura, płyta pilśniowa) o masie do 10 kg.

2. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 35 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:

- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg;
- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg;
- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z pokrywką o masie do 25 kg;
- pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
- torba (Natron) o masie do 25 kg;
- wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne na szczury (HDPE, PP), zawierające do 13 saszetek (15 g) lub 20 saszetek (10 g), pakowane w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg.

3. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100g, 200 g pakowane w opakowanie zbiorcze:

- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg;
- pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
- pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg;
- torba (Natron) o masie do 25 kg;
- worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg;
- wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
- tuba (PP, PE) o masie do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton, termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
- torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg;
- puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg;

- pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg.

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (przynajmniej co 5-7 dni na początku okresu zwalczania gryzoni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.2.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu wodą.

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3. Zwalczanie myszy i/lub szczurów wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Mysz domowa Etap rozwoju: inne: - Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	inne: Inne wokół budynków

Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych</p> <p>Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: Zwalczanie myszy: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m. Zwalczanie szczurów: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: -</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg</p> <p>1. Przynęta luzem pakowana w następujące opakowania zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, płyta pilśniowa, papier) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w torbie (Natron) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w wiaderku z pokrywką (PP/HDPE) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, tektura falista) o masie do 10 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 10 kg; • torba (Natron) o masie do 10 kg; • wiadro (PP, PE) z pokrywką o masie do 10 kg; • pudełko (karton, tektura falista, papier) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE) o masie do 10 kg; • worek (PE, PP) o masie do 10 kg; • wsad (HDPE) do stacji deratyzacyjnej na szczury zawierający 200 g przynęty, pakowany w pudełko (tektura, płyta pilśniowa) o masie do 10 kg. <p>2. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 35 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z pokrywką o masie do 25 kg;

- pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
- torba (Natron) o masie do 25 kg;
- wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne na szczury (HDPE, PP), zawierające do 13 saszetek (15 g) lub 20 saszetek (10 g), pakowane w pudło (karton, termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg.

3. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100g, 200 g pakowane w opakowanie zbiorcze:

- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg;
- pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
- pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg;
- torba (Natron) o masie do 25 kg;
- worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg;
- wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
- tuba (PP, PE) o masie do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
- torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg;
- puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg.

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania myszy przynajmniej co 2–3 dni, szczurów przynajmniej co 5–7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać przynętę zjedzoną przez gryzonia.
- Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.

4.3.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4. Zwalczanie myszy i/lub szczurów wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Mus musculus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Mysz domowa Etap rozwoju: inne: - Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia: • do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, • do stosowania w punktach wykładania przynęty (w przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć).
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Zwalczanie myszy: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/

	<p>jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 2 m. Zwalczanie szczurów: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 10 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m.</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: -</p>
<p>Kategoria(-e) użytkowników</p>	<p>przeszkoleni użytkownicy zawodowi</p>
<p>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</p>	<p>Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg</p> <p>1. Przynęta luzem pakowana w następujące opakowania zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, płyta pilśniowa, papier) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w torbie (Natron) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w wiaderku z pokrywką (PP/HDPE) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, tektura falista) o masie do 10 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 10 kg; • torba (Natron) o masie do 10 kg; • wiadro (PP, PE) z pokrywką o masie do 10 kg; • pudełko (karton, tektura falista, papier) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE) o masie do 10 kg; • worek (PE, PP) o masie do 10 kg; • wsad (HDPE) do stacji deratyzacyjnej na szczury zawierający 200 g przynęty, pakowany w pudełko (tektura, płyta pilśniowa) o masie do 10 kg. <p>2. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 35 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z pokrywką o masie do 25 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 25 kg; • torba (Natron) o masie do 25 kg; • wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg; • pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg; • fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;

- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne na szczury (HDPE, PP), zawierające do 13 saszetek (15 g) lub 20 saszetek (10 g), pakowane w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg.

3. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100g, 200 g pakowane w opakowanie zbiorcze:

- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg;
- pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
- pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg;
- torba (Natron) o masie do 25 kg;
- worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg;
- wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
- tuba (PP, PE) o masie do 20 kg;
- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
- torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg;
- puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg;
- pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg.

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Po zakończeniu zabiegu deratyzacji pozostałości produktu.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
- Nie należy stosować produktu metodą pulsacyjną lub w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).

4.4.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- Podczas umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu systemów odprowadzania wody należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.5. Opis zastosowań

Tabela 5. Zwalczanie myszy i/lub szczurów wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego w tym zakresie:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Mus musculus Nazwa zwyczajowa: inne: Mysz domowa Etap rozwoju: inne: - Nazwa naukowa: Rattus norvegicus Nazwa zwyczajowa: inne: Szczur wędrowny Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie na zewnątrz inne: Inne Wokół budynków
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia: • do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych, • do stosowania w punktach wykładania przynęty (w przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć),.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Zwalczanie myszy: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): 40 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy

	<p>stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 2 m. Zwalczanie szczurów: Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 10 m. Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych): Do 200 g przynęty na stację deratyzacyjną/w punkcie wykładania przynęty. Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna/jeden punkt z przynętą, minimalna odległość pomiędzy stacjami/punktami z przynętą powinna wynosić 5 m.</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: -</p>
<p>Kategoria(-e) użytkowników</p>	<p>przeszkoleni użytkownicy zawodowi</p>
<p>Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe</p>	<p>Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg</p> <p>1. Przynęta luzem pakowana w następujące opakowania zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, płyta pilśniowa, papier) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w torbie (Natron) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w wiaderku z pokrywką (PP/HDPE) o masie do 10 kg; • torba (PE, PP, PE/PP, papier/PE) w pudełku (karton, tektura falista) o masie do 10 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 10 kg; • torba (Natron) o masie do 10 kg; • wiadro (PP, PE) z pokrywką o masie do 10 kg; • pudełko (karton, tektura falista, papier) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE) o masie do 10 kg; • worek (PE, PP) o masie do 10 kg; • wsad (HDPE) do stacji deratyzacyjnej na szczury zawierający 200 g przynęty, pakowany w pudełko (tektura, płyta pilśniowa) o masie do 10 kg. <p>2. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 35 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z pokrywką o masie do 25 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 25 kg; • torba (Natron) o masie do 25 kg; • wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg; • pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg; • fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;

- fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne na szczury (HDPE, PP), zawierające do 13 saszetek (15 g) lub 20 saszetek (10 g), pakowane w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg.
3. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100g, 200 g pakowane w opakowanie zbiorcze:
- zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg;
 - pudło (PE, PP) o masie do 25 kg;
 - pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg;
 - torba (Natron) o masie do 25 kg;
 - worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg;
 - wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg;
 - tuba (PP, PE) o masie do 20 kg;
 - fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg;
 - torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg;
 - puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg;
 - pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg;
 - pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg.

4.5.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem, itp.).
- Stacje deratyzacyjne rozmieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.
- Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną.
- Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć pozostałości produktu.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.5.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
- W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).
- Nie należy stosować produktu metodą pulsacyjną lub w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
- Nie należy stosować produktu bezpośrednio do nor gryzoni.

4.5.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

- W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą.

4.5.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.5.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.6. Opis zastosowań

Tabela 6. Zwalczanie szcurków w kanałach ściekowych przez użytkownika profesjonalnego przeszkolonego, w tym zakresie:

Grupa produktowa	PT14: Rodentycydy
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: <i>Rattus norvegicus</i> Nazwa zwyczajowa: inne: Szcur wędrowny Etap rozwoju: inne: -
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie na zewnątrz Kanały ściekowe
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: W karmnikach deratyzacyjnych Szczegółowy opis: Przynęta gotowa do użycia do stosowania w stacjach deratyzacyjnych lub w punktach wykładania przynęty (w przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć).Przynętę należy zamocować lub umieścić w taki sposób, aby uniemożliwić jej przypadkowe przemieszczenie, zalanie lub kontakt ze ściekami.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: Do 200 g przynęty na każdą studzienkę kanalizacyjną. Liczba i harmonogram aplikacji: -

Kategoria(-e) użytkowników	przeszkoleni użytkownicy zawodowi
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Minimalna wielkość opakowania zbiorczego – 1 kg</p> <p>1. Saszetki (papier) o masie 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 35 g, 40 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton, płyta pilśniowa) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w torbę (Natron) o masie do 25 kg; • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w wiadro (PP/HDPE) z nakrętką o masie do 25 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 25 kg; • torba (Natron) o masie do 25 kg; • wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg; • pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE, PP) o pojemności do 20 kg; • fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg; • fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne na szczury (HDPE, PP), zawierające do 13 saszetek (15 g) lub 20 saszetek (20 g), pakowane w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg. <p>2. Saszetki (PP/papier, PET/PE, PE/papier, PE/Al) o masie 10 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100g, 200 g pakowane w opakowanie zbiorcze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zewnętrzna saszetka (papier/PE, PE, PP, PE/PP) zapakowana w pudło (karton lub płyta pilśniowa) o masie do 20 kg; • pudło (PE, PP) o masie do 25 kg; • pojemnik (HDPE) o masie do 25 kg; • torba (Natron) o masie do 25 kg; • worek (PP, papier wielowarstwowy) o masie do 25 kg; • wiadro (PE, PP) z pokrywką o masie do 20 kg; • tuba (PP, PE) o masie do 20 kg; • fabrycznie napełnione stacje deratyzacyjne (HDPE, PP), pakowana w pudło (karton; termozgrzewalny pojemnik, termozgrzewalna folia) o masie do 20 kg; • torebka (PET/PE, PP/PE, papier/PE) o pojemności do 10 kg; • puszka (PE, PP, PET, HDPE) z nakrętką o pojemności do 10 kg; • pudło (karton, płyta pilśniowa) o pojemności do 20 kg; • pudło (karton, płyta pilśniowa) z wewnętrzną torbą lub wyściółką (PE PP) o pojemności do 20 kg.

4.6.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

- Przynętę należy umieścić w taki sposób, aby nie miała kontaktu z wodą i nie była wymywana przez wodę.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

4.6.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Przynęty można stosować tylko w systemach kanalizacyjnych, które są połączone z oczyszczalnią ścieków.
- Nie należy stosować produktu metodą pulsacyjną.
- Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).

4.6.3. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

4.6.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

4.6.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

Użytkownik profesjonalny:

- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.
 - Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występuje gryzoni, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.
 - Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
 - Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
 - Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
 - W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
 - Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.)
 - Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
 - Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować (patrz sekcja 5.3 - informacje, które należy zamieszczać na etykietach).
 - Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
 - Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.
 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne (wykonane z posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).
 - Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 - Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
 - Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu.
 - Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na bromadiolon należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
 - Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znaną poza stacjami.
 - Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
 - W celu zmniejszenia pylenia produktu, wykladać przynętę za pomocą miarki. Należy podać metody ograniczające pylenie produktu (np. wycieranie na mokro).
- Przeszkolony użytkownik profesjonalny:
- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

-
- Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.
 - Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno lub pozostałości żywności).
 - Przed zastosowaniem produktu nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
 - Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
 - Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.)
 - Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
 - Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować (patrz sekcja 5.3 - informacje, które należy zamieszczać na etykietach).
 - Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
 - Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe.
 - Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających kontakt z produktem.
 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne wykonane z (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału).
 - Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 - Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
 - Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc, w których wyłożono przynętę zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM). Jednocześnie częstotliwość inspekcji należy do decyzji użytkownika, na podstawie oceny terenu objętego zabiegiem deratyzacji przeprowadzonej przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni.
 - Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsca lub zmianę postaci użytkowej produktu.
-
- Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na bromadiolon należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
 - Przynęty nie należy wyjmować z saszetek.
 - W celu zmniejszenia pylenia produktu, wyklądać przynętę za pomocą miarki. Należy podać metody ograniczające pylenie produktu (np. wycieranie na mokro).

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Użytkownik profesjonalny:

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
- Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba).

-
- Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
 - Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji gryzoni lub wykrycia ich aktywności).
 - Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że:
 - o produkt nie powinien być udostępniany użytkownikom powszechnym (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnych”),
 - o dozwolone jest stosowanie produktu wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych (np. „stosować wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych”),
 - o stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować, poprzez umieszczenie informacji, o których mowa w sekcji 5.3 charakterystyki produktu biobójczego (np. „stacje należy oznakować zgodnie z zaleceniami dla produktu”).
 - Zastosowanie tego produktu powinno zwalczyć gryzonia w ciągu 35 dni.
 - Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, żeby w przypadku podejrzenia braku skuteczności produktu pod koniec okresu zwalczania gryzoni (np. odnotowania dalszej aktywności gryzoni) użytkownik skonsultował się z dostawcą/sprzedawcą lub skontaktował się ze specjalistyczną firmą zajmującą się deratyzacją.
 - W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych.
 - Padłe gryzonia usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

Przeszkolony użytkownik profesjonalny:

- O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji (zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM)).
- Etykieta i (lub) ulotka powinna zawierać wyraźne zalecenia, że produkt powinien być udostępniany wyłącznie użytkownikom profesjonalnym przeszkolonym w zakresie wymienionym w sekcjach 4.4-6 (np. „jedynie dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych w zakresie zwalczania myszy i szczurów wewnątrz budynków”).
- Nie stosować produktu jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na bromadiolon.
- Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia lub mieszania z innymi produktami zawierającymi antykoagulanty o podobnej lub większej zdolności do wytworzenia oporności. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wspólnego użycia lub mieszania z innymi produktami gryzoniobójczymi należy rozważyć zastosowanie rodentycydu, który nie zawiera substancji czynnej z grupy antykoagulantów lub zawiera antykoagulant o mniejszej zdolności do wytworzenia oporności.
- W trakcie zabiegu nie należy myć wodą stacji deratyzacyjnych ani innych materiałów mających kontakt z przynętą.
- Padłe gryzonia usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane:

Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.

Antidotum: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny.

Pierwsza pomoc:

W przypadku:

- kontaktu ze skórą: splukać skórę wodą, a następnie umyć wodą z mydłem.
- kontaktu z oczami: przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 10 minut.
- kontaktu z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje:

„Nie przenosić ani nie otwierać”; „Zawiera substancję gryzoniobójczą”; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia”; „Substancja(-e) czynna(-e)” i „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruc (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruc produktami biobójczymi)”.

Środki ochrony środowiska:

- W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).
- Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu (w tym przynętę znaną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. (Taka sama informacja powinna znajdować się w treści oznakowania opakowania).
- Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala od światła słonecznego.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Kategoria zagrożenia

Repr. 1B

STOT RE 1

Skin sens. 1

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

GHS08 Niebezpieczeństwo

GHS07 – substancje drażniące;

Uwaga: Zawiera benzizotiazol-3(2H)-on oraz 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on.

- Ze względu na mechanizm działania substancji należących do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktów gryzoniobójczych je zawierających można zaobserwować po upływie 4-10 dni po spożyciu przynęty.
- Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.
- Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia oraz barwnik.