

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: GMP 34

Type(s) de produit: TP03 - Hygiène vétérinaire

TP03 - Hygiène vétérinaire

TP03 - Hygiène vétérinaire

Numéro de l'autorisation: 164/19/L-M00-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0012465-0006

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	2
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	8
5.2. Mesures de gestion des risques	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	8
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	9
6. Autres informations	9

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Dipal RTU

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	DeLaval NV
	Adresse	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgique
Numéro de l'autorisation	164/19/L-M00-000 1-3	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0012465-0006	
Date de l'autorisation	02/08/2019	
Date d'expiration de l'autorisation	01/08/2029	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	DeLaval NV
Adresse du fabricant	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1319 - Iode
Nom du fabricant	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Adresse du fabricant	Supplier EU: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Chili

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Iode		Substance active	7553-56-2	231-442-4	0,15
Éthoxylate d'alcool			68439-46-3		1,25
Iodure de sodium			7681-82-5	231-679-3	0,065

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger	
Conseils de prudence	Tenir hors de portée des enfants.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Désinfection des trayons, produits de trempage prêts à l'emploi appliqués manuellement

Type de produit	TP03 - Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Désinfectant des trayons
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Le produit est destiné à la désinfection des trayons après la traite. Le produit est appliqué directement après la traite sur les trayons des animaux en lactation.
Méthode(s) d'application	Désinfection des trayons des mamelles après la traite avec des produits prêts à l'emploi. - Le produit est appliqué après la traite sur les trayons par trempage manuel à l'aide d'un gobelet de trempage.
Taux et fréquences d'application	environ 5ml par vache; environ 2,5 ml par brebis ou chèvre - 0% - Appliquer après la traite, 2 fois par jour. Les produits peuvent être utilisés toute l'année pendant la période de lactation.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidon Plastique: PEHD 5L Bidon Plastique: PEHD 10L Bidon Plastique: PEHD 20L Bidon Plastique: PEHD 60L Fût Plastique: PEHD 200L GRV Plastique: PEHD 1000L

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit est un produit prêt à l'emploi et s'utilise non dilué. Le produit doit être porté à une température supérieure à 20°C avant utilisation.

Mode d'emploi :

Il est recommandé de porter des gants lors de la traite et de l'application pour protéger la peau et pour assurer une condition de traite hygiénique.
Pour une application manuelle : utiliser un gobelet de trempage propre.
Veiller à ce que les trayons soient propres avant utilisation. Appliquer la solution prête à l'emploi du produit sur chaque trayon immédiatement après la traite:
TREMPAGE: tremper chaque trayon dans le produit. Assurez-vous que le trayon est recouvert au moins au trois quarts et remplissez le gobelet de trempage si nécessaire.
Laisser les trayons sécher après l'application pendant au moins 5 minutes et garder les animaux debout pendant cette période.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Aucune mesure spécifique de gestion des risques n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.2.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.3.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.4.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Désinfection des trayons, produits de pulvérisation prêts à l'emploi appliqués manuellement

Type de produit

TP03 - Hygiène vétérinaire

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Désinfectant des trayons

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Bactéries
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Levures
Stade de développement: Pas de donnée

Nom scientifique: Pas de donnée
Nom commun: Virus
Stade de développement: Pas de donnée

Domaine d'utilisation

Intérieur

Le produit est destiné à la désinfection des trayons après la traite. Le produit est appliqué directement après la traite sur les trayons des animaux en lactation.

Méthode(s) d'application

Désinfection des trayons des mamelles après la traite avec des produits prêts à l'emploi. -
Le produit est appliqué après la traite sur les trayons par pulvérisation manuelle à l'aide d'un pulvérisateur.

Taux et fréquences d'application

environ 5ml par vache; environ 2,5 ml par brebis ou chèvre - 0% -
Appliquer après la traite, 2 fois par jour. Les produits peuvent être utilisés toute l'année pendant la période de lactation.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bidon	Plastique: PEHD	5L
Bidon	Plastique: PEHD	10L
Bidon	Plastique: PEHD	20L
Bidon	Plastique: PEHD	60L
Fût	Plastique: PEHD	200L
GRV	Plastique: PEHD	1000L

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit est un produit prêt à l'emploi et s'utilise non dilué. Le produit doit être porté à une température supérieure à 20°C avant utilisation.

Mode d'emploi :

Pour une application manuelle : utiliser un applicateur propre.

Veiller à ce que les trayons soient propres avant utilisation. Appliquer la solution prête à l'emploi du produit sur chaque trayon immédiatement après la traite:

1) PULVERISATEUR MANUEL: pulvériser tous les trayons pendant 1 seconde avec le produit. Assurez-vous que le trayon est recouvert au moins au trois quarts et remplissez le récipient de pulvérisation si nécessaire.

2) PULVERISATEUR AUTOMATIQUE: pulvériser tous les trayons pendant 1 seconde avec le produit.

Laisser les trayons sécher après l'application pendant au moins 5 minutes et garder les animaux debout pendant cette période.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Utiliser des gants résistants aux produits chimiques (matériau des gants à préciser par le titulaire de l'autorisation dans l'Information Produits) pendant la désinfection des trayons après la traite par pulvérisation manuelle.
Se reporter aux instructions générales dans la section 5.2.

--

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.3.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.4.

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - DÉSINFECTION DES TRAYONS, Produits de trempage ou de pulvérisation prêts à l'emploi appliqués automatiquement

Type de produit	TP03 - Hygiène vétérinaire
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Désinfectant des trayons
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée Nom scientifique: Pas de donnée Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée
Domaine d'utilisation	Intérieur Le produit est destiné à la désinfection des trayons après la traite. Le produit est appliqué directement après la traite sur les trayons des animaux en lactation.
Méthode(s) d'application	Désinfection des trayons des mamelles après la traite avec des produits prêts à l'emploi. - Le produit est appliqué automatiquement sur les trayons après la traite par des machines à traire utilisant un dispositif de trempage ou de pulvérisation intégré.
	environ 5ml par vache; environ 2,5 ml par brebis ou chèvre - 0% -

Taux et fréquences d'application

Appliquer après la traite, 3 fois par jour. Les produits peuvent être utilisés toute l'année pendant la période de lactation.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Dimensions et matériaux d'emballage

Bidon	Plastique: PEHD	5L
Bidon	Plastique: PEHD	10L
Bidon	Plastique: PEHD	20L
Bidon	Plastique: PEHD	60L
Fût	Plastique: PEHD	200L
GRV	Plastique: PEHD	1000L

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Le produit est un produit prêt à l'emploi et s'utilise non dilué. Le produit doit être porté à une température supérieure à 20°C avant utilisation.

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Aucune mesure spécifique de gestion des risques n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.2.

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.3.

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Aucune instruction spécifique d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions générales dans la section 5.4.

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Aucune instruction générale d'utilisation n'est indiquée. Se reporter aux instructions spécifiques d'utilisation.

5.2. Mesures de gestion des risques

S'il est nécessaire d'effectuer une désinfection avant et après la traite, l'utilisation d'un autre produit ne contenant pas d'iode doit être envisagée pour la désinfection avant la traite.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

EFFETS DIRECTS/INDIRECTS

D'après notre expérience et les informations qui nous sont accessibles, le produit n'a aucun effet nocif lorsqu'il est utilisé et manipulé de la façon indiquée.

PREMIERS SECOURS:

Contact avec les yeux : rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Contact avec la peau : Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures.

Ingestion: Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent et/ou si de grandes quantités ont été ingérées.

Inhalation: Amener la victime à l'air libre.

MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT:

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage: Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

À la fin du traitement, éliminer le produit inutilisé et l'emballage conformément aux exigences locales. Le produit utilisé peut être déversé dans le réseau d'assainissement municipal ou dans le tas de fumier, selon les exigences locales. Éviter le rejet dans une station d'épuration individuelle.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé et en position verticale. Protéger le produit de la lumière directe, des températures supérieures à 30°C et du gel.

Durée de vie: 1 an

6. Autres informations