

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Biopren 4 GR Fly Larvicide granule

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2020/0293/MRP/ UNGARIA/2020/14928N

Numărul curent R4BP 3: RO-0026500-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	5
5.1. Instrucțiuni de utilizare	5
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	6
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	6
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	6
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	7
6. Alte informații	7

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

GHOSTEX Granuli

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Adresa	via Desman, 43 35010 Borgoricco Italia
Numărul curent	RO/2020/0293/MRP/ UNGARIA/2020/14928N	
Numărul curent R4BP 3	RO-0026500-0000	
Data autorizației	22/12/2020	
Data de expirare a autorizației	31/01/2030	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Babolna Bio Ltd
Adresa producătorului	Szállás utca 6 1107 Budapest Ungaria
Adresa locurilor de producție	Köves J. u 1 2943 Bábolna Ungaria

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1386 - S-metopren
Numele producătorului	Babolna Bio Ltd
Adresa producătorului	Szállás u. 6 1107 Budapest Ungaria
Adresa locurilor de producție	Szállás u 6 1107 Budapest Ungaria

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Substanța activă	65733-16-6		0,421

2.2. Tipul preparatului

GR - Granule

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	<p>Conține polyetylénglykol 15-hydroxystearát. Poate provoca o reacție alergică.</p> <p>Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.</p>
Fraze de precauție	<p>Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.</p> <p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>Evitați dispersarea în mediu.</p> <p>Aruncați conținutul la conform reglementărilor în vigoare.</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Larve de muște - Profesional si Neprofesional

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	insekticid
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Musca domestica denumirea comună: House fly etapă de dezvoltare: Larvele Insecte</p> <p>denumirea științifică: Stomoxys calcitrans denumirea comună: Stable flies etapă de dezvoltare: Larvele Insecte</p> <p>denumirea științifică: Eristalis tenax denumirea comună: Pestfenka trubcová etapă de dezvoltare: Larvele Insecte</p>
Domeniul de utilizare	<p>de interior</p> <p>în aer liber</p> <p>În interior: pe bălegar în spațiu închis aflat în ferme de porci, bovine și păsări, precum și în grajduri și alte clădiri pentru creșterea animalelor. Utilizarea în bălegar de capră nu este permisă în țarcuri de caprine și ovine.</p> <p>În aer liber: într-un rezervor pentru stocarea bălegarului, etanș și izolat.</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: imprastiere Descriere detaliata:</p> <p>Produsul trebuie împrăștiat manual pe suprafața bălegarului cu ajutorul unei cupe de măsurare sau a unui instrument adecvat, de ex. cu împrăștiator de granule manual în conformitate cu următoarea schemă de dozare:</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: 30 g/m² Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: În cazul fermelor de porci și bovine:</p> <p>- Sisteme cu podea solidă: se aplică în a 3-a zi după introducerea unui nou efectiv de animale. Împrăștiati granulele pe toată suprafața gropii de bălegar. Tratamentul trebuie repetat după fiecare îndepărtare a bălegarului.</p> <p>- Sisteme cu așternut adânc: Aplicați produsul pe fiecare nou strat de așternut și</p>

repețați tratamentul pe fiecare strat nou format de 8-10 cm.

În cazul fermei de păsări:

- Creșterea în baterii: Împrăștiați granulele pe bălegarul acumulat sub cuști (la fiecare strat de 10 cm).

- Creștere în așternut adânc: Aplicați produsul pe fiecare nou strat de așternut și repețați la fiecare strat de 10 cm.

În cazul unui sol foarte uscat (de ex. așternut pui) produsul poate avea un efect mai lent. Adăugați 100-200 ml apă / m² la sol, aceasta ajută la uciderea larvelor chiar și în medii foarte uscate.

În cazul bălegarului depozitat în aer liber:

tratamentul poate fi aplicat numai dacă bălegarul este depozitat într-o groapă izolată, și care îndeplinește și celelalte cerințe pentru depozitarea în condiții de siguranță a bălegarului. La tratarea bălegarului depozitat în aer liber, aplicați produsul în doză de 30 g / m².

Opriti tratarea bălegarului cu larvicid cu cel puțin două luni înainte de împrăștierea / încorporarea bălegarului în sol.

Produsul poate preveni numărul de muște adulți nou eclozate până la 12 săptămâni după aplicare, dacă sunt respectate instrucțiunile de utilizare de mai sus. Poate fi folosit de până la șase ori pe an

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

profesional

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Profesional:

în sac de hârtie cu căptușeală LDPE de 10, 15, 20, 25 kg

sac / pungă PP sau HDPE de 10, 15, 20, 25 kg

cutie de carton cu căptușeală LDPE de 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g

găleată PP sau HDPE de 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25kg

cutie sau flacon PP sau HDPE de 100, 200, 250, 500, 1000g

Neprofesional

cutie de carton cu căptușeală LDPE de 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000g

găleată PP sau HDPE de 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5

cutie sau flacon PP sau HDPE de 100, 200, 250, 500, 1000g

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

-

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

-

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul produsului înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate.
Nu folosiți produsul în mod continuu.
Luați în considerare ciclul de viață și caracteristicile speciilor de insecte țintă și adaptați tratamentul conform acestor informații.
Asigurați-vă să vizitați cel mai adecvat stadiu de dezvoltare a dăunătorului, acordând atenție momentului de aplicare și zonelor care trebuie tratate.
Aplicați metode integrate de combatere a dăunătorilor, cum ar fi: combinarea metodelor chimice, fizice de combatere a dăunătorilor și a altor măsuri de sănătate publică, ținând cont de condițiile locale (condițiile climatice, speciile de animale țintă, condițiile de utilizare etc.).
Utilizați produsul alternativ cu alte produse care conțin substanțe active cu alt mod de acțiune (pentru a îndepărta indivizii rezistenți din populație).
Este important să aplicați granulele pe suprafața bălegarului în termen de 3 zile de la introducerea efectivului nou de animale și apoi repetați tratamentul la fiecare 10 cm de strat format. Aplicați granulele uniform pe suprafața bălegarului rămas de fiecare dată când îndepărtați bălegarul. Produsul trebuie împrăștiat manual pe suprafața bălegarului cu ajutorul unei cupe de măsurare sau a unui instrument adecvat, de ex. împrăștiator de granule manual în conformitate cu următoarea schemă de dozare:
În cazul fermelor de porci și bovine:
În cazul sistemelor cu podea solidă: se aplică în a 3-a zi după introducerea unui nou efectiv de animale. Împrăștiati granulele pe toată suprafața gropii de bălegar. Tratamentul trebuie repetat după fiecare îndepărtare a bălegarului.
În cazul sistemelor cu așternut adânc: Aplicați produsul pe fiecare nou strat de așternut și repetați tratamentul pe fiecare strat nou format de 8-10 cm.
În cazul fermei de păsări:
Creștere în baterii: Împrăștiati granulele pe bălegarul acumulat sub cuști (la fiecare strat de 10 cm).
Creștere în așternut adânc: Aplicați produsul pe fiecare nou strat de așternut și repetați la fiecare strat de 10 cm.

În cazul unui sol foarte uscat (de ex. așternut pui) produsul poate avea un efect mai lent. Adăugați 100-200 ml apă / m² la sol, aceasta ajută la uciderea larvelor chiar și în medii foarte uscate.

Utilizarea în bălegar de capră nu este permisă în țarcuri de caprine și ovine.

În cazul bălegarului depozitat în aer liber:
tratamentul poate fi aplicat numai dacă bălegarul este depozitat într-o groapă izolată, și care îndeplinește și celelalte cerințe pentru depozitarea în condiții de siguranță a bălegarului. La tratarea bălegarului depozitat în aer liber, aplicați produsul în doză de 30 g/m².
Opriți tratarea bălegarului cu larvicid cu cel puțin două luni înainte de împrăștierea / încorporarea bălegarului în sol.
Produsul poate preveni numărul de muște adulți nou eclozate până la 12 săptămâni după aplicare, dacă sunt respectate instrucțiunile de utilizare de mai sus. Poate fi folosit de până la șase ori pe an.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Respectați reglementările în vigoare în timpul aplicării pentru a evita daunele aduse mediului sau a sănătății.
Nu permiteți animalelor să intre în contact cu produsul. Dacă acest lucru nu este posibil, îndepărtați animalele în timpul aplicării.
Tratați bălegarul acumulat sub podele de scândură, grile metalice, sisteme de așternut adânc sau cuști.
Nu împrăștiati granulele în imediata apropiere a furajelor și zonelor de irigare sau unde animalele pot mânca produsul. În cazul în care furajele sau apa potabilă a animalelor pot fi contaminate, goliți sau acoperiți hrănitul sau adăpătorul înainte de a trata zona.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie!
A se ține departe de alimente, băutură și furaje pentru animale.
A NU se depozita împreună cu alimente, furaje, semințe și îngrășăminte!
Nu folosiți în locuri de adăpostire a animalelor unde nu poate fi prevenit contactul cu stația de epurare sau contactul direct cu apele de suprafață. Abordarea rezistenței
Pentru a preveni dezvoltarea rezistenței, vă recomandăm să utilizați și insecticide cu alt mod de acțiune în programul de combatere a dăunătorilor. În cazul granulelor Biopren 4 GR pentru combaterea larvelor de muște, vă recomandăm să utilizați un adulticid, foaie lipicioasă și lămpi UV după utilizarea de mai multe ori a produsului larvicid. Puteți utiliza, de asemenea foi lipicioase în scopuri de monitorizare.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Efecte adverse posibile directe sau indirecte:

- Simptome alergice pot apărea la expunerea repetată.

Măsuri de prim ajutor:

- ÎN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII: clătiți ușor cu apă timp de 15 minute. Dacă este cazul, îndepărtați lentilele de contact, dacă acestea se îndepărtează ușor.
- ÎN CAZUL CONTACTULUI CU PIELEA (sau părul): Îndepărtați/scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea contaminată cu apă din belșug/ jet de apă. Îndepărtați hainele și încălțăminte contaminate. Solicitați asistență medicală în cazul apariției de simptome
- În caz de expunere sau afectare: solicitați sfatul/asistența medicului.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Recipientele goale și reziduurile produsului trebuie tratate ca deșeuri periculoase.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se păstra în ambalajul original sigilat într-un loc uscat și rece, ferit de căldură radiantă și la max. 35 °C.
Depozitați produsul neutilizat într-un loc bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui.
Termen de valabilitate: 3 ani.

6. Alte informații