

**HR**

***PRILOG***

**SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

RATIMOR BRODIFACOUM ŽITNI MAMAC

**Vrsta(e) proizvoda**

PT14: Rodenticidi

**Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/22-12/13**

**Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0029212-0000**

---

## Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	RATIMOR BRODIFACOUM ŽITNI MAMAC
--------------------	---------------------------------

### 1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Unichem d.o.o.
	Adresa	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/22-12/13	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0029212-0000	
Datum autorizacije	27/04/2022	
Datum isteka autorizacije	31/12/2025	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Unichem d.o.o.
Adresa proizvođača	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija
Lokacija proizvodnih pogona	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenija

### 1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Brodifacoum
Naziv proizvođača	ACTIVA S.r.l.
Adresa proizvođača	ACTIVA S.r.l., Via Feltre, 32 20132 – Milano Milano Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Dr. TEZZA S.r.l. - Via Tre Ponti, 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italija

---

## Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0029 % (w/w)

### 2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

---

### Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H373: Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti ..
Oznake obavijesti	P102: Čuvati izvan dohvata djece. P103: Pažljivo pročitati i slijediti sve upute. P260: Ne udisati prašinu. P280: Nositi zaštitne rukavice. P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet . P314: U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti pomoć . P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. P501: Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

## Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

### 4.1. Opis uporabe

**Tablica 1. Uporaba 1 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - neprofesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).  <u>Štakori</u> - 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najveća veličina pakiranja je 150 g.

	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET/PETMET/PE ili PET/ALU/PE ili PET/PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p>
--	--

#### **4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### **4.2. Opis uporabe**

**Tablica 2. Uporaba 2 – Smeđi štakori – neprofesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: <b>smeđi štakor</b> Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: <b>smeđi štakor</b> Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome  Na otvorenom, oko zgrada.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m.  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: <u>Štakori</u>  — - 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Najveća veličina pakiranja je 150 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 150 g. Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.  Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton, PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET /ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

#### 4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### 4.3. Opis uporabe

**Tablica 3. Uporaba 3 - Kućni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m



	<p>Razrjeđenje (%): 0</p> <p>Broj i vremenski raspored primjene:</p> <p><u>Kućni miševi</u>  - 60 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p>
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 60 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

#### 4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

#### 4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### 4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

### 4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### 4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

## 4.4. Opis uporabe

**Tablica 4. Uporaba 4 – Smeđi štakori – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m.  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: <u>Štakori</u>  - 100 grama mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

#### 4.4.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji. Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Vidi i Opće upute za uporabu

#### 4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

#### 4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.4.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.5. Opis uporabe

**Tablica 5. Uporaba 5 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - profesionalni korisnici – na otvorenom, oko zgrada**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome  Na otvorenom, oko zgrada.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: 100 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m; miševi: 60 grama mamca po kutiji svakih 5-10 m.  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: <u>Kućni miševi</u> - 60 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).  <u>Štakori</u> - 100 g mamca po kutiji za mamce. Ako je potrebno koristiti više od jedne kutije, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 100 g. Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

#### 4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana (miševi) odnosno svakih 5 do 7 dana (štakori), a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce.

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

#### 4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

#### 4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

#### 4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.5.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.6. Opis uporabe

**Tablica 6. Uporaba 6 - Kućni miševi i/ili smeđi štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci  Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome  U zatvorenom prostoru.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije).
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja

	Kućni miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Količina mamca po pakirnoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g.</p> <p>Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.</p> <p>Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.</p> <p>Materijal: karton ili PE ili PP ili PET ili LDPE ili PET / PET MET / PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA/ PE ili HDPE ili PVC.</p> <p>Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.</p> <p>Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.</p>

#### 4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Vidi i Opće upute za uporabu

#### 4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Poduzeti preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ovaj se proizvod može koristiti samo u zatvorenim prostorima i na mjestima koja nisu dostupna djeci ili neciljanim životinjama.

---

- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Vidi i Opće upute za uporabu

#### **4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

- Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca i vode.

#### **4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### **4.7. Opis uporabe**

**Tablica 7. Uporaba 7 – Kućni miševi i/ili smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru, oko zgrada**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci  Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: odrasli



	Znanstveno ime: Mus musculus Uobičajeno ime: ostalo: kućni miš Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome  Na otvorenom, oko zgrada.
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije). - Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g proizvoda po mjestu postavljanja; miševi: kutije za mamce sa 60-100 g proizvoda po mjestu postavljanja  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja Miševi: kutije za mamce sa 60-100 g po mjestu postavljanja  Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.  Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice.  Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC  Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.  Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.

#### 4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

---

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

#### **4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

#### **4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

#### **4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.7.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.8. Opis uporabe

**Tablica 8. Uporaba 8 – Smeđi štakori - osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom prostoru i odlagalištima otpada**

Vrsta proizvoda	PT14: Rodenticidi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli  Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: ostalo: smeđi štakor Stadij razvoja: mladunci
Područje(a) uporabe	upotreba na otvorenome  Područja na otvorenom Vanjska odlagališta otpada
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce  Detaljan opis: - Mamac spreman za uporabu u zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije). - Izravna primjena mamca spremnog za uporabu u jazbine.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja; jazbina: 200 g mamca po jazbini  Razrjeđenje (%): 0  Broj i vremenski raspored primjene: Štakori: kutije za mamce sa 100-200 g po mjestu postavljanja  Jazbina: 200 g mamca spremnog za uporabu po jazbini
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Količina mamca po pakiranoj vrećici: pojedinačne vrećice od 10 g do 200 g. Broj pakiranih vrećica po pakiranju: do 30 kg.  Vrste pakiranja: kutije, vreće, kante, cilindrične posude, boce i vrećice. Materijal: karton ili PE ili PP ili pet ili LDPE ili PET /pet MET/ PE ili PET / ALU / PE ili PET / PE ili PA / PE ili HDPE ili PVC  Dodatno, proizvod se može isporučiti kao rasuto zrno (u rinfuzi) izravno unutar gore navedene sekundarne ambalaže. U tom slučaju najveća veličina pakiranja je 10 kg.

---

Minimalna veličina pakiranja u Republici Hrvatskoj za osposobljene profesionalne korisnike i profesionalne korisnike je 5 kg.
---

#### **4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu**

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni.

Na kraju provedene deratizacije ukloniti i zbrinuti sve neiskorištene mamce (osim kod izravnog postavljanja u jazbine).

Postupati prema svim dodatnim uputama predviđenima odgovarajućim uputama najbolje prakse.

Za uporabu na otvorenom, mjesta postavljanja mamaca moraju biti natkrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti neciljnih vrsta.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

#### **4.8.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

#### **4.8.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

- Kod postavljanja kutije s mamcem u blizini vodotokova (npr. rijeka, jezera, kanala za navodnjavanje) ili sustava za odvodnju vode, osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

#### **4.8.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### **4.8.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

---

---

## Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>

### 5.1. Upute za uporabu

#### Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba):

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Prije uporabe rodenticida potrebno je uzeti u obzir nekemijske metode suzbijanja (npr. klopke).
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.
- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.
- Pri uporabi proizvoda ne smije se jesti, piti ni pušiti.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

#### Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je moguće).
- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i piće u mjeri u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.

---

<sup>1</sup>Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- 
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno **označene** kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.
  - Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana **područja** treba **označiti** tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u **slučaju** otrovanja.
  - Mamac treba postaviti na **način** da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
  - Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, **domaćih** životinja i drugih neciljanih organizama.
  - Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, **pića** i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
  - Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
  - Ne otvarati **pojedinačne** vrećice koje sadrže mamce.
  - Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).
  - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
  - Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
  - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne **primjećuje** se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi **isključe**, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
  - Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

#### Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe **pročitati** i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi **određivanja** vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznati vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostatci hrane ili prosuti zrnati proizvodi). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati **prihvatanje** mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM), uključujući između ostalog, higijenske mjere i fizičke metode kontrole (ako je **moguće**).
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je **primijećena** aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je **moguće**, zaštitne kutije s mamcem treba **pričvrstiti** na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno **označene** kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije premjestiti ili otvoriti.

- 
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
  - Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
  - Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neciljanih organizama.
  - Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.
  - Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
  - Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
  - Za proizvod u rinfuzi (proizvod u obliku zrna) koristiti pribor za doziranje. Odrediti metode koje će se koristiti kako bi se smanjilo nastajanje prašine (npr. brisanje mokrom krpom).
  - Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
  - Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
  - Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvoditelja, u skladu s izvidom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodeksa dobre prakse.
  - Ako je potrošnja mamca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mamca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mamca.
  - Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikogulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
  - Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

## 5.2. Mjere za smanjenje rizika

### Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.

U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.



---

- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedeni mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

#### Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca. U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za profesionalne korisnike”).

- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.

- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.

- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.

- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokaže učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službu za suzbijanje glodavaca (DDD).

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

#### Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima obuke (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike”).

- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.

- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.

- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naizmjenično antikoagulate različitog načina djelovanja ili drugačijeg načina djelovanja.

- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom između primjena.

- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

---

### **5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Ovaj proizvod sadržava antikoagulantnu tvar.

Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.

- Antidot: Vitamin K1 daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

U slučaju:

- Dodira s kožom, oprati kožu vodom, a zatim vodom i sapunom.

- Dodira s očima, isprati oči odgovarajućom tekućinom ili vodom, držiti kapke otvorenim najmanje 10 minuta.

- Gutanja, oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju.

Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinara.

Zaštitne kutije za mamce potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati”; „sadrži rodenticid”; „naziv proizvoda”; „aktivna tvar” i „u slučaju nesreće nazoviti Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342”.

Opasno za divlje životinje.

### **5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamce i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

### **5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Skladištiti na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati zatvorenim i dalje od izravnog sunčevog svjetla.

Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

---

---

## **Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE**

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvataljke kod skupljanja i njihova odlaganja.

Proizvod sadrži gorku tvar i boju.

Postregistracijski uvjeti:

- Studija stabilnosti proizvoda na 2 godine.