

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: GMP 48

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: 2639-2

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** BG-0022118-0008

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	1
1.3. Производител(и) на биоцидите	2
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	2
2. Състав и формулиране на продукта	2
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	2
2.2. Тип на формулирането	3
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	3
4. Разрешена(и) употреба(и)	3
5. Общи указания за употреба	10
5.1. Инструкции за употреба	10
5.2. Мерки за намаляване на риска	10
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	10
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	11
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	11
6. Друга информация	11

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Iobac Conc

Dipal Conc

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име	DeLaval NV
Адрес	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Белгия

Номер на разрешението

2639-2 1-5

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)

BG-0022118-0008

Дата на издаване на разрешението
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

04/02/2020

01/08/2029

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

DeLaval NV

Адрес на производителя

Industriepark-Drogen 10 9031 Gent Белгия

Местонахождение на производствените обекти

Industriepark-Drogen 10 9031 Gent Белгия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

1319 - Йод

Име на производителя

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Адрес на производителя

Supplier EU: SQM Europe NV - Sint-Pietersvliet 7 bus 8 2000 Antwerpen Белгия

Местонахождение на производствените обекти

Los Militares 4290 Piso 4 8320000 Las Condes (Santiago) Чили

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	EO номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,75
Алкохол етоксилат			68439-46-3		6,34
Натриев йодид			7681-82-5	231-679-3	0,33

2.2. Тип на формулирането

SL - Разтворим концентрат

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Може да причини увреждане на органите да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност..

Препоръки за безопасност

Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се избягва изпускане в околната среда.
Използвайте предпазни очила.
Използвайте предпазна маска за лице.
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
Да се измие ръцете старателно след употреба.
При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет.
При продължително дразнене на очите: Потърсете помощ.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦИЦКИ, концентрирани продукти (за потапяне, прилагани ръчно

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Дезинфекция на цици

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Няма данни
Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Дрожди
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Вируси
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Продуктът е предназначен за дезинфекция на цицки след доене. Продуктът се нанася директно след доене върху цицките на дойните животни.

Метод(и) на прилагане

Дезинфекция след доене на цицките на вимето с разреден концентрат. -

Продуктът се прилага след доене върху цицките чрез ръчно потапяне с помощта на чаша за потапяне.

Дозировка(и) и честота на прилагане

около 5 ml на крава; около 2.5 ml за овца или коза. - 20%: Използвайте

концентрация: 0.15 % w/w йод -

Да се прилага след доене, 2 пъти на ден. Продуктите могат да се използват през цялата година по време на периода на лактация.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка Пластмаса: HDPE 1L

Контеинер Пластмаса: HDPE 5L

Контеинер Пластмаса: HDPE 10L

Контеинер Пластмаса: HDPE 20L

Контеинер Пластмаса: HDPE 60L

Барабан Пластмаса: HDPE 200L

IBC Пластмаса: HDPE 1000L

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчително е да се носят ръкавици по време на доенето и приложението с цел защита на кожата и гарантиране на хигиенични условия на доене.

Трябва да се направи 20% разтвор с чиста вода. Вземат се 200 ml от концентрирания продукт и се долива до 1 L с вода, за да се получи крайна концентрация от 0.15% йод. Разтворът трябва да се доведе до температура над 20° C преди употреба.

Възможно е да се образува пяна при приготвянето на готовия за употреба разтвор. В такъв случай се препоръчва да започнете третирането само след като нивото на пяната е намаляло достатъчно.

За ръчно приложение: използвайте чиста чаша за потапяне.

Уверете се, че млечните жлези са чисти преди да приложите продукта.

Нанесете разредения продукт върху всяка цицка веднага след доене:

ПОТАПЯНЕ: потапяйте всяка млечна жлеза в продукта. Уверете се, че е покрита най-малко три-четвърти от дължината на млечната жлеза и доливайте разтвор в чашата за потапяне, ако е необходимо;

Оставете млечните жлези да изсъхнат след приложението в продължение на най-малко 5 минути и дръжте животните изправени през този период.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Използвайте защита за очите/лицето по време на дезинфекцията на цицките след доене чрез ръчно потапяне. Вижте 5.2 за общи инструкции.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.3 за общи инструкции.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.4 за общи инструкции.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦИЦКИ, концентрирани продукти за пръскане, прилагани ръчно

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Дезинфекция на цици
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито Продуктът е предназначен за дезинфекция на цици след доене. Продуктът се нанася директно след доене върху цицките на дойните животни.
Метод(и) на прилагане	Дезинфекция след доене на цицките на вимето с разреден концентрат. - Продуктът се прилага след доене върху цицките чрез пръскане с помощта на контейнер за пръскане.
Дозировка(и) и честота на прилагане	около 5 ml на крава; около 2.5 ml за овца или коза. - 20%: Използвайте концентрация: 0.15 % w/w йод - Да се прилага след доене, 2 пъти на ден. Продуктите могат да се използват през цялата година по време на периода на лактация.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка Пластмаса: HDPE 1L Контейнер Пластмаса: HDPE 5L Контейнер Пластмаса: HDPE 10L Контейнер Пластмаса: HDPE 20L

Контейнер	Пластмаса: HDPE	60L
Барабан	Пластмаса: HDPE	200L
IBC	Пластмаса: HDPE	1000L

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Трябва да се направи 20% разтвор с чиста вода. Вземат се 200 ml от концентрирания продукт и се долива до 1 L с вода, за да се получи крайна концентрация от 0.15% йод. Разтворът трябва да се доведе до температура над 20° C преди употреба.

Възможно е да се образува пяна при приготвянето на готовия за употреба разтвор. В такъв случай се препоръчва да започнете третирането само след като нивото на пяната е намаляло достатъчно.

За ръчно приложение: използвайте чист апликатор.

Уверете се, че млечните жлези са чисти преди да приложите продукта.

Нанесете разредения продукт върху всяка цицка веднага след доене:

1) ПРЪСКАНЕ С РЪЧНО ЗАДЕЙСТВАНЕ: пръскайте всяка млечна жлеза с продукта в продължение на 1 секунда. Уверете се, че е покрита най-малко три-четвърти от дължината на млечната жлеза и доливайте разтвор в аерозолния контейнер, ако е необходимо;

2) АВТОМАТИЧНА ПРЪСКАЧКА: пръскайте всяка млечна жлеза с продукта в продължение на 1 секунда.

Оставете млечните жлези да изсъхнат след приложението в продължение на най-малко 5 минути и дръжте животните изправени през този период.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Използвайте устойчиви на химикали ръкавици (материалът за ръкавици трябва да бъде посочен от титуляра на разрешението в рамките на информацията за продукта) и защита за очите/лицето по време на дезинфекция на цицките след доене чрез ръчно пръскане.
Вижте 5.2 за общи инструкции

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.3 за общи инструкции.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.4 за общи инструкции.

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

-

4.3 Описание за използване

Употреба 3 - ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦИЦКИ, концентрирани продукти за потапяне или пръскане, прилагани автоматично

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Дезинфекция на цици

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Бактерии
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Дрожди
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: Няма данни
Общоприето наименование: Вируси
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Продуктът е предназначен за дезинфекция на цици след доене. Продуктът се нанася директно след доене върху цицките на дойните животни.

Метод(и) на прилагане

Дезинфекция след доене на циките на вимето с разреден концентрат. - Продуктът се прилага автоматично от доячните машини след доене върху циките чрез интегрирано устройство за потапяне или пръскане.

Дозировка(и) и честота на прилагане

около 5 ml на крава; около 2.5 ml за овца или коза. - 20%: Използвайте концентрация: 0.15 % w/w йод - Да се прилага след доене, 3 пъти на ден. Продуктите могат да се използват през цялата година по време на периода на лактация.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка	Пластмаса: HDPE	1L
Контеинер	Пластмаса: HDPE	5L
Контеинер	Пластмаса: HDPE	10L
Контеинер	Пластмаса: HDPE	20L
Контеинер	Пластмаса: HDPE	60L
Барабан	Пластмаса: HDPE	200L
IBC	Пластмаса: HDPE	1000L

4.3.1 Специфични инструкции за употреба**УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:**

Трябва да се направи 20% разтвор с чиста вода. Вземат се 200 ml от концентрирания продукт и се долива до 1 L с вода, за да се получи крайна концентрация от 0.15% йод. Разтворът трябва да се доведе до температура над 20° C преди употреба.

Възможно е да се образува пяна при приготвянето на готовия за употреба разтвор. В такъв случай се препоръчва да започнете третирането само след като нивото на пяната е намаляло достатъчно.

4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Използвайте защита за очите/лицето по време на дезинфекцията на циките след доене чрез автоматизирано потапяне или пръскане. Вижте 5.2 за общи инструкции.

4.3.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.3 за общи инструкции.

4.3.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Няма конкретни инструкции за употреба. Вижте 5.4 за общи инструкции.

4.3.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Няма общи инструкции за употреба. Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

В случай, че е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, трябва да се предвиди използване на друг продукт, който не съдържа йод, за дезинфекцията преди доене.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРЕКИ/КОСВЕНИ ЕФЕКТИ:

Според нашия опит и информацията, с която разполагаме, продуктът не оказва нежелани ефекти при посочените начини за употреба и работа.

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ:

При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути . При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно с вода, като свалите всички замърсени дрехи и обувки.

При погълдане: Измийте устата с вода. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако възникнат симптоми и/или са погълнати големи количества.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Спрете по-нататъшното изтичане или разливане, ако това е безопасно. Методи и материали за ограничаване и почистване: Оградете с диги. Попийте с инертен абсорбиращ материал. Не допускайте навлизане в канализацията. Дръжте в подходящи, затворени съдове за изхвърляне.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на лечението изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания. Използванияят продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор, в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изпускането му в индивидуална пречиствателна станция за отпадни води.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Съхранение: Съхранявайте в изправено положение, в плътно затворения оригинален контейнер. Предпазвайте от пряка светлина, температури над 30° С и замръзване.

Срок на годност: 2 години

6. Друга информация