

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Maxforce White IC (substitution)

Vrsta(e) proizvoda

PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/19-12/17

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0020999-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Maxforce IC
--------------------	-------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresa	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francuska
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/19-12/17	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0020999-0000	
Datum autorizacije	30/01/2019	
Datum isteka autorizacije	31/12/2025	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Adresa proizvođača	1 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	ZI Nord 02250 Marle sur Serre Francuska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Imidaklopid
Naziv proizvođača	Bayer AG
Adresa proizvođača	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Chempark D-41538 Dormagen Njemačka

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	2,217 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H410: Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH208: Sadrži 1,2-benzisotiazolin-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P391: Sakupiti proliveno/rasuto. P501: Odložiti spremnik u/na skladu s važećim propisima.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Profesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	VII.2 Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: Blattella germanica Uobičajeno ime: ostalo: Smeđi žohar Stadij razvoja: ostalo: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: ostalo: Blatta orientalis Uobičajeno ime: ostalo: Crni žohar Stadij razvoja: ostalo: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: ostalo: Periplaneta americana Uobičajeno ime: ostalo: američki žohar Stadij razvoja: ostalo: Odrasle jedinke i nimfe Znanstveno ime: ostalo: Supella longipalpa Uobičajeno ime: ostalo: Smeđe-prugasti žohar Stadij razvoja: ostalo: Odrasle jedinke i nimfe
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome IV.1. U zatvorenim prostorima IV.1.3 Za primjenu u: IV.1.3.1 Industrijskim/komercijalnim objektima IV.1.3.2 Domaćinstvima/ privatnim prostorima IV.1.3.3 Javnim zgradama (npr. bolnice, domovi za starije osobe)
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: Postavljanje mamaca Detaljan opis: Postavljanje mamaca
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1-3 kapi x 0,1 g Broj i vremenski raspored primjene: Primijeniti Maxforce White IC kao kapi ili tanke trake gela na površine u identificiranim ciljnim područjima. Gel se može postaviti u kutove, pukotine, procjepe i utore. Doza primjene prilagođava se jačini infestacije. Jedna kap = 0,1 g (kap promjera otprilike 7 mm) Gel se može primijeniti i postavljanjem tanke trake gela koja odgovara količini od 0,1 g. Vrste žohara Doza primjene ovisno o jačini infestacije * po m ² Slaba Jaka Male vrste žohara npr. Smeđi žohar Jedna kap x 0,1 g Dvije kapi x 0,1 g Smeđe-prugasti žohar

	<p>Velike vrste žohara npr. Crni žohar Američki žohar Dvije kapi x 0,1 g Tri kapi x 0,1 g</p> <p>* Maksimalna doza primjene 3 x 0,1 g po m². Ponoviti primjenu 3 – 11 puta godišnje u istom objektu. Kod primjene utrošak gela ne bi smio prelaziti najveće količine primjene od:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 x 0,1 g (tj. 6 g gela) po domaćinstvu; • 270 x 0,1 g (tj. 27 g gela) u većoj zgradi. <p>Ako je potrebno postaviti veće količine gela, tada u zatvorenom prostoru treba koristiti kutijice za izlaganje mamca.</p>
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Plastični spremnik (spremnik od PP i PE sa PE vrhom i čepom) od 20 – 30 g

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Proizvod se primjenjuje odgovarajućim aplikatorom za gel. Kada je tretiranje završeno, skinuti prazan spremnik s aplikatora i zbrinuti ga na siguran način. Ako je u spremniku ostalo nepotrošenog proizvoda, skinuti spremnik s aplikatora, zatvoriti ga čepom i čuvati prema uputama.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

ISKLUČIVO ZA PRIMJENU KAO INSEKTICID

SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU

Ne primjenjivati proizvod izravno na površine na kojima se čuva, priprema ili konzumira hrana za ljude i životinje.

Primijeniti samo na mjestima koja su nedostupna djeci i životinjama.

Spriječiti djeci i životinjama pristup mamcu.

Oprati ruke i izloženu kožu prije obroka i nakon uporabe.

Ostaci gela (mamca) i njegov spremnik moraju se zbrinuti na siguran način.

Samo za primjenu u zatvorenim prostorima.

Opasno za pčele.

NeiskorištenI proizvod ne ispuštati u tlo, vodotokove, cjevovode (sudoper, WC...) i odvođe.

Prije uporabe obavezno uvijek pročitati naljepnicu ili letak proizvoda te slijediti sve navedene upute za uporabu.

Ne primjenjivati proizvod na mjestima koja se redovito peru (mokro čišćenje).

Ako se stvrdnuti ostaci gela uklone spužvom ili mokrom tkaninom, sav gel i onečišćeni materijal (spužva, tkanina itd.) moraju se zbrinuti na siguran način kao otpad iz kućanstva.

Ne koristiti proizvod na mjestima gdje postoji ili se sumnja na otpornost na aktivnu tvar.

U slučaju ponovne infestacije, ponoviti primjenu proizvoda. Paziti da se ne prekorači najveći dopušteni godišnji broj tretiranja.

Obvijestiti nositelja odobrenja ako je tretiranje neučinkovito.

Prije tretiranja, ako je moguće, ukloniti izvore hrane za žohare (otpad, ostatke hrane...) iz prostora koji se tretira da se potakne konzumacija gela.

Ne primjenjivati proizvod na upijajućim površinama.

Primijeniti gel udaljeno od sunčeve svjetlosti ili izvora topline (radijatora).

Izbjegavati kontinuiranu uporabu proizvoda.

Proizvod izmjenjivati s proizvodima koji sadrže aktivne tvari s drugačijim načinom djelovanja.

Proizvod primijenti samo na zaklonjenim, skrivenim mjestima do kojih teško dopire voda, kao što su pukotine i utori.

Usvojiti mjere integriranog suzbijanja štetnika kao što su kombinacija kemijskih i fizikalnih mjera suzbijanja te drugih javnozdravstvenih mjera, uzimajući u obzir lokalne specifičnosti (klimatske uvjete, ciljne vrste, uvjete primjene itd.).

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Opće mjere

Izvesti osobu iz kontaminiranog područja. Unesrećenu osobu postaviti i transportirati u stabilnom položaju (bočni ležeći položaj). Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i zbrinuti je na siguran način.

Gutanje:

Isprati usta vodom. Kontaktirati toksikologa. Odmah potražiti savjet liječnika ako se pojave simptomi i/ili ako je progutana velika količina proizvoda. U slučaju da je osoba bez svijesti, postaviti osobu u bočni ležeći položaj i odmah potražiti savjet liječnika. Ne davati osobi da pije tekućinu i ne izazivati povraćanje.

Pripremite na uvid spremnik ili naljepnicu proizvoda. Ako je potrebno, odvesti unesrećenu osobu u bolnicu i pokazati naljepnicu ili pakiranje proizvoda. Unesrećenu osobu ne ostavljati bez nadzora.

Dodir s kožom:

Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Oprati kontaminiranu kožu vodom i sapunom. Kontaktirati toksikologa ako se pojave simptomi. Potražiti pomoć liječnika ako se pojavi nadraživanje kože.

Dodir s očima:

Isprati odmah s mnogo vode, također i ispod očnih kapaka, ispirati najmanje 15 minuta. Ne zaboraviti ukloniti kontaktna leće, ako ih osoba nosi.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Neiskorišteni proizvod ne ispuštati u tlo, vodotokove, cjevovode (sudoper, WC...) i odvođe.

P501: Odložiti spremnik u skladu s važećim propisima.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnom spremniku.

Čuvati na hladnom, suhom i prozračnom mjestu.

Zaštititi od smrzavanja.

Čuvati udaljeno od izravne sunčeve svjetlosti.

Rok valjanosti je do 24 mjeseca.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Vidi 4.1.1

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidi 4.1.2

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 4.1.3

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 4.1.4

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Vidi 4.1.5

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE