

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Spray répulsif

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2024-0009

R4BP-Assetnummer: BE-0031269-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN	3
1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts	3
1.2. Zulassungsinhaber	3
1.3. Hersteller des Produkts	3
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	4
2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG	6
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts	6
2.2. Art(en) der Formulierung	6
3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE	7
4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)	8
4.1. Verwendungsbeschreibung	8
4.2. Verwendungsbeschreibung	10
4.3. Verwendungsbeschreibung	12
4.4. Verwendungsbeschreibung	14
4.5. Verwendungsbeschreibung	16
4.6. Verwendungsbeschreibung	18
4.7. Verwendungsbeschreibung	20
5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	24
5.1. Gebrauchsanweisung	24
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	24
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	24
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	24
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen	24
6. SONSTIGE ANGABEN	25

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Spray répulsif Afwerende spray Abwehrmittel Spray répulsif moustiques et tiques Lotion répulsive moustiques et tiques Spray répulsif moustiques et tiques corporel Lotion répulsive moustiques et tiques peau Spray répulsif moustiques et tiques textile Lotion répulsive moustiques et tiques textile Spray répulsif moustiques et tiques Vêtement Lotion répulsive moustiques et tiques Vêtement Spray répulsif moustiques et tiques peau et vêtement Lotion répulsive moustiques et tiques peau et vêtement Mücken- und zeckenabweisendes Spray Mücken- und zeckenabweisende Lotion Mücken- und Zeckenschutzspray für den Körper Mücken- und zeckenabweisende Lotion Haut Mücken- und Zeckenabwehrspray Textil Mücken- und zeckenabweisende Lotion für Textilien Mücken- und Zeckenschutzspray Kleidung Mücken- und zeckenabweisende Lotion Kleidung Mücken- und zeckenabweisendes Spray Haut und Kleidung Mücken- und zeckenabweisende Lotion Haut und Kleidung Muggen- en tekenwerende spray Lotion tegen muggen en teken Lichaamsspray tegen muggen en teken Muggen- en tekenwerende lotion voor de huid Muggen- en tekenwerende spray textiel Muggen- en tekenwerende lotion textiel Muggen- en tekenwerende spray kleding Muggen- en tekenwerende lotion kleding Muggen- en tekenwerende spray huid en kleding Muggen- en tekenwerende lotion huid en kleding
----------------	--

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Terrium
	Anschrift	246 rue du 8 mai 1945 42210 Motrond-Les-Bains Frankreich
Zulassungsnummer		BE2024-0009
R4BP-Assetnummer		BE-0031269-0000
Datum der Zulassung		07/03/2024
Ablauf der Zulassung		06/04/2027

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	MERCK KGAA
----------------------	------------

Anschrift des Herstellers	FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Deutschland
Standort der Produktionsstätten	MERCK KGAA site 1 FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Deutschland

Name des Herstellers	FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE
Anschrift des Herstellers	1041 CHEMIN DE LA DIGUE DU RHONE 07300 TOURNON SUR RHONE Frankreich
Standort der Produktionsstätten	FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE site 1 1041 CHEMIN DE LA DIGUE DU RHONE 07300 TOURNON SUR RHONE Frankreich

Name des Herstellers	SAS SPRING
Anschrift des Herstellers	ZI DU BOIS DE LEUZE 4 RUE BLAISE PASCAL 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Frankreich
Standort der Produktionsstätten	SAS SPRING site 1 ZI DU BOIS DE LEUZE 4 RUE BLAISE PASCAL 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Frankreich

Name des Herstellers	PACOME
Anschrift des Herstellers	LOT N°17 LA ZIZA 98890 PAITA Neukaledonien
Standort der Produktionsstätten	PACOME site 1 LOT N°17 LA ZIZA 98890 PAITA Neukaledonien

Name des Herstellers	TAG LIFE CARE
Anschrift des Herstellers	17 CHEMIN DE CHARLEMAGNE 41120 CELLETES Frankreich
Standort der Produktionsstätten	TAG LIFE CARE site 1 17 CHEMIN DE CHARLEMAGNE 41120 CELLETES Frankreich

Name des Herstellers	LABORATORIOS MONTPLET
Anschrift des Herstellers	VIA TRAJANA, 53-59 08020 BARCELONA Spanien
Standort der Produktionsstätten	LABORATORIOS MONTPLET site 1 VIA TRAJANA, 53-59 08020 BARCELONA Spanien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	Éthyl butylacetylaminopropionate
Name des Herstellers	MERCK KGAA

Anschrift des Herstellers	FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Deutschland
Standort der Produktionsstätten	MERCK KGAA site 1 MERCK S.L.U. - POLIGONO MERCK 08100 MOLLET DEL VALLES Spanien

Wirkstoff	Éthyl butylacetylaminopropionate
Name des Herstellers	MERCK S.L.U.
Anschrift des Herstellers	CALLE MARIA DE MOLINA, 40 28006 MADRID Spanien
Standort der Produktionsstätten	MERCK S.L.U. site 1 POLIGONO MERCK 08100 MOLLET DEL VALLES Spanien

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Wirkstoff	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise	P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P264: Nach der Handhabung Hände gründlich waschen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche(n) Rat hinzuziehen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Läuse-Abwehrspray (private Anwender)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Pediculidae: Pediculidae: Trivialname: human head louse Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Innenbereich
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: -
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Erwachsene: bis zu 1,05 g des Produkts pro Anwendung; Kinder unter 11 Jahren 0,5 g pro Anwendung Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Erwachsene: bis zu 1,05 g des Produkts pro Anwendung; Kinder unter 11 Jahren 0,5 g pro Anwendung- Gebrauchsfertig (keine Verdünnung erforderlich) - gebrauchsfertiges Produkt ohne Spülen Zeitplan: Das insektenvertreibende Spray IR3535® (Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20 %) gegen Läuse beugt der Wiedereinnistung von Mäuseläusen (<i>Pediculus humanus capitis</i>) nur nach einer Behandlung mit Pedikuliziden (Läusemittel) vor. Die Anwendung nach dem Haarewaschen und spätestens nach 2 Tagen erneut durchführen. Dosis pro Anwendung: <ul style="list-style-type: none">• Erwachsene: bis zu 1,05 g des Produkts pro Anwendung.• Kinder unter 11 Jahren bis zu 0,5 g des Produkts pro Anwendung - Das Produkt wird in der Regel nur einmal pro Tag angewendet. Wenn Sie die Anwendung erneut durchführen, halten Sie die maximal erlaubten Anwendungen pro Tag ein:

	<p>Für einen Pumpzerstäuber (100 ml):</p> <p># Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 11 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag</p> <p># Kinder (1 Jahr bis (<) 12 Jahren): 5 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag</p> <p># Babys (< 1 Jahr): 5 Sprühstöße, 1- bis 2-mal pro Tag</p> <p>o Sprühflasche (250 ml):</p> <p># Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 2 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag</p> <p># Kinder (1 Jahr bis (<) 12 Jahren): 1 Sprühanwendung, 1- bis 3-mal pro Tag</p> <p># Babys (< 1 Jahr): 1 Sprühstoß, 1- bis 2-mal pro Tag</p> <p>Kommt das Produkt bei Kindern unter 11 Jahren zur Anwendung, muss es von einem Erwachsenen aufgetragen werden.</p>
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass keine Läuse vorhanden sind. Wenden Sie zuerst ein Läusemittel (z. B. Shampoo) an.
- Wenden Sie das Produkt auf trockenen und sauberen oder ausgewrungenen Haaren bis zur Kopfhaut an. Beachten Sie bitte, dass Sie es zuerst im Nacken und hinter den Ohren auftragen. Zerstäuben Sie dann das Produkt auf den Haaren, ähnlich wie Haarlack. Stellen Sie sicher, dass die Haare und die Kopfhaut feucht genug sind.
- Die Anwendung muss nach dem Haarewaschen wiederholt werden.
- Das Produkt wird in der Regel nur einmal pro Tag angewendet. Wenn Sie die Anwendung erneut durchführen, halten Sie die maximal erlaubten Anwendungen pro Tag ein:
 - o Für einen Pumpzerstäuber (100 ml):
 - # Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 11 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag
 - # Kinder (1 Jahr bis (<) 12 Jahren): 5 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag

Babys (< 1 Jahr): 5 Sprühstöße, 1- bis 2-mal pro Tag

o Sprühflasche (250 ml):

Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 2 Sprühstöße, 1- bis 3-mal pro Tag

Kinder (1 Jahr bis (<) 12 Jahren): 1 Sprühanwendung, 1- bis 3-mal pro Tag

Babys (< 1 Jahr): 1 Sprühanwendung, 1- bis 2-mal pro Tag

- Für einen dauerhaften Schutz: Die Anwendung spätestens nach 2 Tagen auf gewaschenen und sauberen oder ausgewrungenen Haaren anwenden. Die Anwendung früher wiederholen, wenn die Haare nass werden (z. B. nach einem Regenschauer oder nach dem Baden), bis kein Risiko der Wiedereinnistung bestehen bleibt.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Nicht auf ins Gesicht sprühen oder und in der Augenregion anwenden.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2. Mückenabweisendes Spray zur Anwendung auf der Kleidung (gemäßigtes Klima)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gebrauchsfertiges Abwehrmittel zur Imprägnierung von Kleidung (Baumwolle und Polyester), Mückenschutz.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Aedes spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Culex spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige

	Zur Imprägnierung der Kleidung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Direkt auf die Kleidung sprühen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,6 mg Produkt pro cm ² Stoff Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 0,6 mg Produkt pro cm ² Stoff Schutzdauer: Schutzdauer (unter gemäßigttem und tropischem Klima) 8 Stunden, selbst nach 30 Tagen Lagerungsdauer des behandelten Stoffs (vor dem Tragen) in einer verschlossenen Verpackung (Plastikbeutel). Die Anwendung nach jedem Waschvorgang oder Nutzung der imprägnierten Kleidung wiederholen.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Die behandelten Textilien geschlossen (z. B. in einem Plastikbeutel) aufbewahren, wenn sie vor dem Tragen aufgeräumt/ aufbewahrt werden sollen.

- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Anzahl Sprühstöße:

- 100 ml-Flasche (300 µl pro Sprühstoß): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:

- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 6 auf die Rumpfpattie, 3 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 2 bis 3 Sprühstöße auf die Rumpfpattie, 1-2 pro Bein, 1 Sprühstoß pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 2 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Flasche (250 ml): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:

- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 4 auf die Rumpfpattie, 2 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 2 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 1 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Gilt nur für die EU:

Für den Mückenschutz unter gemäßigttem Klima das Produkt nicht gleichzeitig auf der Haut von Kindern unter 12 Jahren und deren Kleidung anwenden.

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.3. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 3. Mückenabweisendes Spray zur Anwendung auf der Kleidung (Tropenklima)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gebrauchsfertiges Abwehrmittel zur Imprägnierung von Kleidung (Baumwolle und Polyester), Mückenschutz.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Aedes spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Anopheles spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige Zur Imprägnierung der Kleidung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Direkt auf die Kleidung sprühen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,6 mg Produkt pro cm ² Stoff Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 0,6 mg Produkt pro cm ² Stoff Schutzdauer: Schutzdauer (unter tropischem Klima) 8 Stunden, selbst nach 30 Tagen Lagerungsdauer des behandelten Stoffs (vor dem Tragen). Die Anwendung nach jedem Waschvorgang oder Nutzung der imprägnierten Kleidung wiederholen, die sich in einer geschlossenen Verpackung (z. B. Plastikbeutel) aufbewahrt wird.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 250 ml (mit Sprühdüse)
---	-------------------------------------

4.3.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Die behandelten Textilien geschlossen (z. B. in einem Plastikbeutel) aufbewahren, wenn sie vor dem Tragen aufgeräumt/ aufbewahrt werden sollen.
- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Anzahl Sprühstöße:

- 100 ml-Flasche (300 µl pro Sprühstoß): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:
 - Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 6 auf die Rumpfpattie, 3 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
 - Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 2 bis 3 Sprühstöße auf die Rumpfpattie, 1-2 pro Bein, 1 Sprühstoß pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
 - Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 2 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
- Flasche (250 ml): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:
 - Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 4 auf die Rumpfpattie, 2 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
 - Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 2 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
 - Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 1 auf die Rumpfpattie, 1 pro Bein und 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

4.3.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Gilt nur für die EU:

Für den Mückenschutz unter gemäßigttem Klima das Produkt nicht gleichzeitig auf der Haut von Kindern unter 12 Jahren und deren Kleidung anwenden.

4.3.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.3.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.3.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.4. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 4. Mückenabweisendes Spray zur Anwendung auf der Haut (gemäßigtes Klima)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Aedes spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Culex spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige Zur Anwendung auf der Haut
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Direkt auf die Haut sprühen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,6 mg Produkt pro cm ² Haut Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Verwendung bei gemäßigte Bedingungen: 0,6 mg Produkt pro cm ² Haut Schutzdauer: 4 Stunden unter gemäßigtem Klima
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.4.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen
- Das Produkt nicht auf die Hände von Kindern unter 12 Jahren anwenden.
- Findet die Anwendung gleichzeitig mit einer Sonnencreme statt, wird letztere zuerst aufgetragen und nach einer 20-minütigen Wartezeit das Produkt.
- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Gilt nur für die EU:

Anzahl Sprühstöße (100ml – 100 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 7 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 6 Sprühstöße auf jeden Arm, 2 Sprühstöße pro Hand und 3 Sprühstöße pro Fuß und 13 Sprühstöße auf jedes Bein.

-
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 3 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und pro Fuß und 7 Sprühstöße auf jedes Bein.
 - Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 4 Sprühstöße auf jedes Bein.
 - 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 3 Sprühstöße auf jedes Bein.
 - Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (100ml – 300 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 5 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.
- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß auf jedes Bein.
- Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (250 ml):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 3 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf beide Arme und auf jedes Bein.
- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf beide Arme, 1 Sprühstoß auf beide Beine.
- Babys < 1 Jahr: Den ganzen Körper 2 Mal pro Tag besprühen.

4.4.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Kommt das Produkt bei Kindern unter 12 Jahren zur Anwendung, muss es von einem Erwachsenen aufgetragen werden.
- Das Produkt nicht direkt auf das Gesicht auftragen. Das Produkt auf die Hände sprühen und dann auf dem Gesicht verteilen.
- Die Augenregion vermeiden.

Gilt nur für die EU:

- gemäßigte Bedingungen:
- Nur einmal pro Tag anwenden.
- Das Produkt nicht gleichzeitig auf die Haut eines Kindes unter 12 Jahren und auf dessen Kleidung auftragen.
- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren darf das Produkt nicht auf der Haut unter der Kleidung angewendet werden.

4.4.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.4.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.4.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.5. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 5. Mückenabweisendes Spray zur Anwendung auf der Haut (Tropenklima)

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Aedes spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Anopheles spp. Trivialname: mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige Zur Anwendung auf der Haut
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Direkt auf die Haut sprühen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,8 mg Produkt pro cm ² Haut Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Verwendung unter tropischen Verhältnissen: 0,8 mg Produkt pro cm ² Haut Schutzdauer: 3 stunden unter tropischem Klima

Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.5.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen
- Das Produkt nicht auf die Hände von Kindern unter 12 Jahren anwenden.
- Findet die Anwendung gleichzeitig mit einer Sonnencreme statt, wird letztere zuerst aufgetragen und nach einer 20-minütigen Wartezeit das Produkt.
- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Gilt nur für die EU:

Anzahl Sprühstöße (100ml – 100 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 9 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 8 Sprühstöße auf jeden Arm, 3 Sprühstöße pro Hand und 4 Sprühstöße pro Fuß und 18 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 4 Sprühstöße auf den Kopf, 2 Sprühstöße auf den Hals, 4 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und 2 Sprühstöße pro Fuß und 9 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 4 Sprühstöße auf den Kopf, 2 Sprühstöße auf den Hals, 3 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und pro Fuß und 6 Sprühstöße auf jedes Bein.
- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 4 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 3 Sprühstöße auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (100ml – 300 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 3 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand, 2 Sprühstöße pro Fuß und 6 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 3 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.
- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 1 Sprühstoß auf jedes Bein.
- Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 1 Sprühstoß auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (250 ml):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 4 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.
- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf und auf jeden Arm und jedes Bein.
- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf und auf beide Arme und 1 Sprühstoß auf jedes Bein.
- Babys < 1 Jahr: Den ganzen Körper 4 Mal pro Tag besprühen.

4.5.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Das Produkt nicht direkt auf das Gesicht auftragen. Das Produkt auf die Hände sprühen und dann auf dem Gesicht verteilen.
- Die Augenregion vermeiden.
- Kommt das Produkt bei Kindern zur Anwendung, muss es von einem Erwachsenen aufgetragen werden.

Gilt nur für die EU:

- Nur einmal pro Tag anwenden.
- Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.
- Das Produkt nicht gleichzeitig auf die Haut eines Kindes unter 12 Jahren und auf dessen Kleidung auftragen.
- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren darf das Produkt nicht auf der Haut unter der Kleidung angewendet werden.

4.5.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.5.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.5.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.6. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 6. Zeckenabweisendes Spray zur Imprägnierung von Kleidung

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Gebrauchsfertiges Abwehrmittel zur Imprägnierung von Kleidung (Baumwolle und Polyester), Zeckenschutz.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Ixodes ricinus Trivialname: hard ticks Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Ixodes ricinus Trivialname: hard ticks Entwicklungsstadium: Nymphen
Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige Zur Imprägnierung der Kleidung
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Direkt auf die Kleidung sprühen
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,85 mg Produkt pro cm ² Stoff Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 0,85 mg Produkt pro cm ² Stoff Schutzdauer (unter gemäßigttem Klima) 6 Stunden, selbst nach 7 Tagen Lagerungsdauer des imprägnierten Stoffs (vor dem Tragen) in einer geschlossenen Verpackung (Plastikbeutel). Die Anwendung nach jedem Waschvorgang oder Nutzung der imprägnierten Kleidung wiederholen.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.6.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Die behandelten Textilien geschlossen (z. B. in einem Plastikbeutel) aufbewahren, wenn sie vor dem Tragen aufgeräumt/ aufbewahrt werden sollen.

- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Anzahl Sprühstöße:

- 100 ml-Flasche (300 µl pro Sprühstoß): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:

- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 9 pro Hemdkörper, 4 pro Bein, 2 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 3-5 pro Hemdkörper, 2 pro Bein, 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 2 pro Hemdkörper, 1 pro Bein, 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

- Flasche (250 ml): Anwendungshinweise für die Anwendung (Sprühstöße) auf die Vorderseite der Kleidung:
- Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 6 pro Hemdkörper, 3 pro Bein, 2 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
- Für Kinder zwischen 2 und 12 Jahren: 2-3 pro Hemdkörper, 1-2 pro Bein, 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.
- Für Kinder zwischen 1 und 2 Jahren: 2-3 pro Hemdkörper, 1 pro Bein, 1 pro Ärmel. Dasselbe auf der Rückseite durchführen.

4.6.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Gilt nur für die EU:

- Das Produkt nicht auf die Kleidung von Kindern unter 1 Jahr anwenden.
- Für den Zeckenschutz unter tropischem Klima das Produkt nicht gleichzeitig auf der Haut von Kindern unter 6 Jahren und deren Kleidung anwenden.
- Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren darf das Produkt nicht auf der Haut unter der Kleidung angewendet werden.

4.6.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.6.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.6.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.7. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 7. Zeckenabweisendes Spray

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Ixodes ricinus Trivialname: hard ticks Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Ixodes ricinus Trivialname: hard ticks Entwicklungsstadium: Nymphen

Anwendungsbereich(e)	Sonstige: Sonstige Zur Anwendung auf der Haut
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Zeckenabweisendes Spray
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 0,6 mg Produkt pro cm ² Haut Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: 0,6 mg Produkt pro cm ² Haut Schutzdauer: 4 Stunden unter gemäßigttem Klima
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	HDPE-Flasche 100-250 ml (mit Sprühdüse)

4.7.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Nach Gebrauch Hände gründlich waschen
- Das Produkt nicht auf die Hände von Kindern anwenden.
- Findet die Anwendung gleichzeitig mit einer Sonnencreme statt, wird letztere zuerst aufgetragen und nach einer 20-minütigen Wartezeit das Produkt.
- Die Textilien erneut imprägnieren, wenn sie Wasser ausgesetzt waren, ohne dabei die maximal empfohlenen Anwendungen zu überschreiten.

Gilt nur für die EU:

Anzahl Sprühstöße (100ml – 100 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 7 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 6 Sprühstöße auf jeden Arm, 2 Sprühstöße pro Hand und 3 Sprühstöße pro Fuß und 13 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 3 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und pro Fuß und 7 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 3 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 4 Sprühstöße auf jedes Bein.

- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 3 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (100ml – 300 µL pro Anwendung):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 5 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Hand und Fuß und 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß auf jedes Bein.

- Babys < 1 Jahr: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf den Hals, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

Anzahl Sprühstöße (250 ml):

- Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf den Kopf, 1 Sprühstoß auf jeden Arm, 1 Sprühstoß pro Fuß und 3 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 6 bis (<) 12 Jahren: Einmal pro Tag: 2 Sprühstöße auf jeden Arm, 2 Sprühstöße auf jedes Bein.

- Kinder von 2 bis (<) 6 Jahren: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf beide Arme und auf jedes Bein.

- 1-Jährige Kinder: Einmal pro Tag: 1 Sprühstoß auf beide Arme, 1 Sprühstoß auf beide Beine.

- Babys < 1 Jahr: Den ganzen Körper 2 Mal pro Tag besprühen.

4.7.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Das Produkt nicht direkt auf das Gesicht auftragen. Das Produkt auf die Hände sprühen und dann auf dem Gesicht verteilen.

- Die Augenregion vermeiden.

- Kommt das Produkt bei Kindern unter 12 Jahren zur Anwendung, muss es von einem Erwachsenen aufgetragen werden.

Gilt nur für die EU:

- Nur einmal pro Tag anwenden. Das Produkt nicht gleichzeitig auf die Haut eines Kindes unter 6 Jahren und auf dessen Kleidung auftragen.

- Für Erwachsene und Kinder über 6 Jahren darf das Produkt nicht auf der Haut unter der Kleidung angewendet werden.

4.7.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.7.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.7.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

- Vor Verwendung stets Etikett- und Produktinformation lesen und Produkte immer gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden.
- Anwendungsempfehlungen einhalten.
- Die Schutzdauer ist nur eine ungefähre Angabe. Umweltfaktoren können die Dauer verkürzen (z. B. hohe Temperaturen, Windgeschwindigkeit).
- Die Sprühdüse muss sich 10-20 cm von der zur behandelten Oberfläche befinden.
- Der Nutzer muss den Besitzer der Arzneimittelzulassung im Falle der Unwirksamkeit des Produkts informieren.
- Es empfiehlt sich nicht, das Produkt mit anderen Abwehrmittel zu verwenden.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Nicht in der Augenregion versprühen.
- In gut gelüfteten Bereichen verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

- Bei Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen, dabei gelegentlich die Lider anheben. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter mindestens 10 Minuten mit lauwarmem Wasser abspülen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, falls Reizungen oder Sehstörungen auftreten.
- Bei Hautkontakt: Wenn nach der Anwendung des Produkts Hautverletzungen, Rötungen oder andauernde Schmerzen auftreten, Ärztlichen Rat einholen.
- Beim Einatmen größerer Mengen: halbaufgerichtet ruhen lassen. Bei Symptomen, sofort Arzt hinzuziehen.
- Bei Mundkontakt: Mund mit Wasser spülen. Nehmen Sie unmittelbar Kontakt mit einer Giftnotrufzentrale auf, wenn Symptome auftreten bzw. wenn Sie größere Mengen über den Mund aufgenommen haben. Keine Flüssigkeiten einflößen und kein Erbrechen herbeiführen bei Bewußtlosigkeit; Person in die stabile Seitenlage bringen (auf der Seite liegen) und sofort Arzt hinzuziehen.
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

- Nicht verwendetes Produkt nicht auf den Boden, in Wasserläufe, in Leitungen (Waschbecken, Toiletten usw.) oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Unbenutztes Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Lagerbedingungen: Behälter dicht verschlossen halten, an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Etikett einhalten. Von heißen Oberflächen, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Ansammlung von elektrostatischen Ladungen vermeiden.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: Das Mittel nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Haltbarkeit: 30 Monate
- Das Mittel darf nicht >40°C aufbewahrt werden.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

benannten Stellen, die am Resistenzmanagement beteiligt sind, alle fünf Jahre vorgelegt werden.

Der Zulassungsinhaber sollte alle beobachteten Vorfälle im Zusammenhang mit der Wirksamkeit den zuständigen Behörden (CA) melden.