

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Biopren 5 EC larvicide concentrate

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0025790-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0025790-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	6

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Biopren 5 EC koncentrat za zatiranje ličink

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Naslov	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Madžarska
Številka dovoljenja	SI-0025790-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0025790-0000	
Datum dovoljenja	04/12/2020	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	04/12/2030	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Babolna Bio Ltd,
Naslov proizvajalca	Szallas utca 6, 1107 Budapest, Madžarska
Lokacije proizvodnje	Dr Köves János út 1-3, H-2943 Babolna, Madžarska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1386 - S-metopren
Ime proizvajalca	Babolna Bio ltd,
Naslov proizvajalca	Szállás utca 6, 1107 Budapest, Madžarska
Lokacije proizvodnje	Szallas utca 6, 1107 Budapest, Madžarska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Aktivna snov	65733-16-6		6,42
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični < 2%		Neaktivna snov		918-481-9	83,67
Benzensulfonska kislina, 4-C10-14-alkil derivati, kalcijeve soli		Neaktivna snov	90194-26-6	290-635-1	4,32
2-metilpropan-1-ol		Neaktivna snov	78-83-1	201-148-0	2,02

2.2. Vrsta formulacije

EC - koncentrat za emulzijo

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Vnetljiva tekočina in hlapi.

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Povzroča hude poškodbe oči.

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

<p>Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. – Kajenje prepovedano.</p> <p>Nositi zaščitne rokavice.</p> <p>Nositi zaščito za oči.</p> <p>PRI ZAUŽITJU:Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.</p> <p>PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>NE izzvati bruhanja.</p> <p>Prestreči razlito tekočino.</p> <p>Hraniti na dobro prezračevanem mestu.Hraniti na hladnem.</p> <p>Hraniti zaklenjeno.</p> <p>Odstraniti vsebino Ostanke izdelka in embalažo je treba odstraniti kot nevarne odpadke..</p> <p>Preprečiti sproščanje v okolje.</p>

4. Dovoljena(e) uporaba€

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba 1 – Bolhe – Za (usposobljeno) profesionalno – notranjo uporabo

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Ctenocephalides Splošno ime: Fleas Razvojni stadij: Ličinka žuželke
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za tretiranje območij, ki lahko služijo kot gojišče ličink bolh oziroma kjer so zaznani imagi, npr. na ležiščih hišnih ljubljencev, preproge, oblazinjeno pohištvo.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Pršenje (z ročnim pršilnikom). Izdelek razpršite na mesta, kjer se razmnožujejo ličinke bolhe ali kjer so zaznani imagi (prisotnost imagov namreč kaže na lokacijo ličink).

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 5 ml koncentrata Biopren® 5 EC pomešajte z vodo, da dobite 5 l raztopine. 5 litrov tako pripravljene raztopine zadošča za tretiranje površine velikosti 100 m².
Redčenje (%): 0.1% (1:1000)
Število in časovni razpored uporabe:

Učinkovitost snovi: ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil o uporabi in priporočenem odmerku ima izdelek učinek tudi do 12 tednov po tretiranju.
Uporablja se lahko največ štirikrat na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

HDPE ali COEX HDPE/PA neprozorna steklenica:

100, 200, 250, 300, 500, 750, 1000 ml

HDPE ali COEX HDPE/PA neprozorna plastenka:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 L

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej Splošna navodila za uporabo

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej Splošna navodila za uporabo

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej Splošna navodila za uporabo

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej Splošna navodila za uporabo

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej Splošna navodila za uporabo

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- Izdelek vedno uporabljajte v skladu z navodili na nalepki.
- Upoštevajte življenjski cikel in značilnosti ciljnih vrst insektov ter uporabo prilagodite temu. V prvi vrsti opredelite najbolj občutljive razvojne faze škodljivca ter čas in področje uporabe.
- Za čimprejšnje tretiranje odraslih bolh je morda potrebno dodatno uporabiti tudi izdelke za hitro zatiranje odraslih primerkov.
- Pred pripravo raztopine koncentrat dobro pretresite. Po odmerjanju potrebne količine steklenico znova zaprite.
- Pršilnik (ročni pršilnik s pritiskom 1-3 barov) napolnite do polovice, odmerite spodaj navedeno količino koncentrata Biopren 5 EC in nalijte v pršilnik. Nato pršilnik napolnite do zelene ravni in raztopino temeljito premešajte. Pripravljeno raztopino imejte v zaprti posodi in jo uporabite v roku 48 ur. Med uporabo oziroma po daljšem mirovanju občasno pretresite.
- Koncentrat Biopren 5 EC najverjetneje ne bo poškodoval tretiranih površin, vendar je v vsakem primeru priporočljivo, da ga najprej preizkusite na manj vidnem delu. To je pomembno zlasti pri uporabi na preprogah ali oblazinjenem pohištvo. Pri uporabi na zelo poroznih površinah (na primer opeka, omet, cement itd.) je učinek lahko nekoliko slabši.
- 5 ml koncentrata Biopren® 5 EC pomešajte z vodo, da dobite 5 l raztopine.
- 5 litrov raztopine zadošča za tretiranje površine velikosti 100 m².
- Za tretiranje območij, ki lahko služijo kot gojišče ličink bolh oziroma kjer so zaznani imagi, npr. na ležiščih hišnih živali, preprogi, oblazinjenem pohištvo. Po uporabi je prostor potrebno temeljito prezračiti.
- Izdelka ne uporabljajte na zunanjih območjih, namenjenih reji domačih živali.
- Med uporabo (pršenjem) je treba živalim preprečiti dostop do tretiranega območja. Ne pršite neposredno na živali. Poskrbite, da bodo živali v tretirano območje vstopile šele, ko se pršilo popolnoma posuši.
- Učinkovitost snovi: ob upoštevanju zgoraj navedenih predpisov o uporabi in priporočenem odmerku ima izdelek učinek tudi do 12 tednov po tretiranju. Čiščenje in hoja po tretiranih površinah lahko učinek aktivne snovi zmanjšata.
- Uporablja se lahko največ štirikrat na leto.
- V programu zatiranja škodljivcev je priporočljiva uporaba insekticidov z različnimi učinki (rotacija).
- Če je mogoče, kemično obdelavo kombinirajte z ne-kemičnimi postopki.
- Poskusite popolnoma izkoreniniti škodljivce na okuženih območjih.
- Če je potrebno daljše tretiranje, je priporočljivo, da se izmenično uporabljajo biocidni proizvodi z različnimi načini delovanja.
- Pozorno spremljajte stopnjo učinkovitosti, primere z zmanjšanim učinkom pa je potrebno preučiti in ugotoviti morebitno rezistenco.
- O morebitni neučinkovitosti uporabe obvestite imetnika dovoljenja.
- Izogibajte se nenehni uporabi izdelka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne uporabljajte ga v zgradbah, namenjenih reji domačih živali.
Uporaba izdelka dovoljena izključno za zatiranje žuželk in samo v skladu z navodili za uporabo!
Shranjujte izven dosega otrok!
Izdelka ne nanašajte neposredno na živila, krmo ali pijačo ter ga ne uporabljajte na površinah ali orodjih, ki bi lahko prišla v stik z živilo, krmo, pijačo ali živalmi.
Izdelka ne nanašajte neposredno na ljudi, domače živali, rastline ali posteljnino.
Med uporabo upoštevajte veljavne predpise.
Po uporabi si roke temeljito umijte s toplo vodo in milom.
Med uporabo poskrbite za ustrezno prezračevanje.
Med uporabo je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za oči in obraz.
Med fazo ravnanja z izdelkom nosite zaščitne rokavice in zaščitni kombinezon (zaščitni material mora imetnik dovoljenja določiti v informacijah o izdelku).
Osebe brez zaščitne opreme in živali naj se izogibajo tretiranih površin dokler se le-te popolnoma ne posušijo.
Tretiran prostor se lahko uporablja šele, ko se razpršena raztopina popolnoma ne posuši in se prostor temeljito prezračí.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Vdihavanje: ponesrečenca prenesite na svež zrak, zrahljajte mu oblačila, namestite ga v udoben položaj in pokrijte. V primeru slabosti poiščite zdravniško pomoč.
Pri stiku s kožo: poškodovancu odstranite onesnažena oblačila ter kožo najprej temeljito sperite z veliko vode, nato pa še z milnico in vodo.
Pri stiku z očmi: oči previdno izpirajte nekaj minut. Če je mogoče, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. Poškodovanec naj počiva 30 minut, v primeru otekline, pordelosti ali bolečine v očeh poiščite pomoč oftalmologa.
V primeru zaužitja: ne izzivati bruhanja! Če je poškodovanec pri zavesti, mu usta izperite z veliko vode. V primeru slabosti poiščite zdravniško pomoč. Pri zaužitju se nemudoma posvetujte s centrom za zastrupitve ali zdravnikom.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek in embalažo je treba odstraniti kot nevarni odpadek. Priporočen način odstranjevanja: sežig.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek shranjujte v originalni, neprozorni, zaprti embalaži ter v hladnem in zračnem prostoru.
Zaščitite ga pred sevalno toploto, neposrednimi sončnimi žarki in mrazom. Shranjuje se lahko na temperaturi največ 30 °C.
Rok trajanja: 4 leta.

6. Druge informacije