

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Chriox WC

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: CZ-0028604-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0028604-0001

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	3
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	3
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	8
5.1. Pokyny pro používání	8
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	9
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	9
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	9
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	9
6. Další informace	10

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Chriox WC
Symbioz Gel San Desinfektant
Gel WC
Nettoyant Désinfectant WC
Phago'Gel San

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Christeyns NV
	Adresa	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgie
Číslo povolení	CZ-0028604-0000 1-1	
Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3	CZ-0028604-0001	
Datum udělení povolení	06/06/2022	
Datum skončení platnosti povolení	01/01/2032	

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce	Christeyns N.V.
Adresa výrobce	Afrikalaan 9000 Gent Belgie
Umístění výrobních závodů	Afrikalaan 9000 Gent Belgie

Název výrobce

Christeyns s.r.o.

Adresa výrobce

Vitovska 453/7 742 35 Odry Česká republika

Umístění výrobních závodů

Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Česká republika

Název výrobce

Christeyns Food Hygiene sas

Adresa výrobce

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

Umístění výrobních závodů

ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francie

Název výrobce

Betelgeux sl

Adresa výrobce

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

Umístění výrobních závodů

Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Španělsko

Název výrobce

Christeyns France sa

Adresa výrobce

31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou Francie

Umístění výrobních závodů

31 Rue de la Maladrie 44120 Vertou Francie

Název výrobce

Christeyns Professional Hygiene srl.

Adresa výrobce

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

Umístění výrobních závodů

Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Itálie

Název výrobce

Christeyns UK Ltd.

Adresa výrobce

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

Umístění výrobních závodů

Rutland Street BD4 7EA Bradford Spojené království

Název výrobce	Christeyns Food Hygiene Ltd.
Adresa výrobce	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království
Umístění výrobních závodů	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Spojené království

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka	1322 - L-(+)-mléčná kyselina
Název výrobce	Purac Biochem BV
Adresa výrobce	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Nizozemsko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		účinná látka	79-33-4	201-196-2	8,5
Isopropanol	Propan-2-ol	Neúčinná látka	67-63-0		0
2-butoxyethanol	2-butoxy-1-ethanol	Neúčinná látka	111-76-2		0

2.2. Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Nevdechujte prach.

Nevdechujte dým.

Nevdechujte plyn.

Nevdechujte mlhu.

Nevdechujte páry.

Nevdechujte aerosoly.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Okamžitě volejte lékaře.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Dezinfekční prostředek na toaletu - Profesionální uživatel

Typ přípravku	Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	Dezinfekce toaletních mís a kanalizace nalitím (zahuštěného) přípravku z láhve s pevnou směrovou tryskou. Přípravek se nanáší kolem mísy a pod okraj, ponechá se několik minut, očistí se WC štětkou a WC se spláchne.
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: --- Obecný název: Bacteria Vývojové stadium: Dospělci Latinský název: ---- Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: Dospělci
Oblast použití	Vnitřní Instituce, kanceláře, pracoviště,...
Metoda(y) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Polévání (pouze s čišněním po požadované době kontaktu) - se zahuštěným přípravkem z láhve s pevnou směrovou tryskou. Přípravek se nanáší kolem mísy a pod okraj, ponechá se několik minut, očistí se WC štětkou a WC se spláchne
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 5 ml/toaleta Ředění (%): / Počet a načasování aplikace: Aktivní proti bakteriím a kvasinkám S neředěným přípravkem 15minutová doba kontaktu Při pokojové teplotě Aplikační množství je 5 ml/toaletu 1x/týden (neprofesionální uživatelé) Vícekrát/týden (profesionální uživatelé)
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	750 ml předem naplněných lahví HDPE 5 l doplňovací kanystry HDPE Balení obsahuje hmatovou výstrahu a dětský bezpečnostní uzávěr.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Naneste přípravek kolem mísy a pod okraj, nechte jej 15 minut působit, očistěte WC štětkou a spláchněte.

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz kapitola 5.2

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Všeobecné doporučení: Ve všech případech pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch, na klidné místo a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při kontaktu s kůží: Svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte velkým množstvím vody.

V případě slabosti nebo příznaků podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Obratě se na očního specialistu.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Neskladujte při teplotách nad 30 °C
Chraňte před mrazem
Skladovatelnost: 2 roky

4.2 Popis použití

Použití 2 - Dezinfekční prostředek na toaletu - Široká veřejnost

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Dezinfekce toaletních mís a kanalizace nalitím (zahuštěného) přípravku z láhve s pevnou směrovou tryskou. Přípravek se nanáší kolem mísy a pod okraj, ponechá se několik minut, očistí se WC štětkou a WC se spláchně

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: ---
Obecný název: Bakterie
Vývojové stadium: Dospělci

Latinský název: ---
Obecný název: Kvasinky
Vývojové stadium: Dospělci

Oblast použití	Vnitřní Instituce, kanceláře, pracoviště,...
Metoda(y) aplikace	Metoda: Otevřený systém Podrobný popis: Polévání (pouze s čistěním po požadované době kontaktu) - se zahuštěným přípravkem z láhve s pevnou směrovou tryskou. Přípravek se nanáší kolem mísy a pod okraj, ponechá se několik minut, očistí se WC štětkou a WC se spláchně
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 5 ml/toaleta Ředění (%): / Počet a načasování aplikace: Aktivní proti bakteriím a kvasinkám S neředěným přípravkem 15minutová doba kontaktu Při pokojové teplotě Aplikační množství je 5 ml/toaletu 1x/týden (neprofesionální uživatelé) Vícekrát/týden (profesionální uživatelé)
Kategorie uživatelů	Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	750 ml předem naplněných lahví HDPE Balení obsahuje hmatovou výstrahu a dětský bezpečnostní uzávěr.

4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Naneste přípravek kolem mísy a pod okraj, nechte jej 15 minut působit, očistěte WC štětkou a spláchněte.

4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

/

4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Všeobecné doporučení: Ve všech případech pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch, na klidné místo a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při kontaktu s kůží: Svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a obuv. Omyjte velkým množstvím vody. V případě slabosti nebo příznaků podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Obratě se na očního specialistu.
Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Neskladujte při teplotách nad 30 °C
Chraňte před mrazem
Skladovatelnost: 2 roky

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

1. Všechny povrchy, které mají být dezinfikovány, musí být před dezinfikováním vyčištěny, s některými výjimkami (Meta SPC 1 & 2).

1. Dezinfekční cyklus :

- Pokud se to požaduje, přípravky musí být před použitím zředěny v pitné vodě
- Poměr ředění a doba kontaktu závisí na zamýšleném použití.
- Závěrečný oplach (pitnou vodou): přečtěte si popis aplikační metody související s každým použitím.

Dezinfekční postupy namáčením (tvrdé/neporézní povrchy): Lázeň není určena k opakovanému použití. Lázeň se používá pouze jednou.

Dezinfekční postupy

poléváním/postřikem/pěněním:

povrchy, které mají být dezinfikovány, musí být dostatečně mokré, aby zůstaly mokré po požadovanou dobu kontaktu pro optimální dezinfekci. Pak by měl uživatel věnovat pozornost úplnému namočení povrchů dezinfekčním roztokem.

Otevřete nádoby. Malé nádoby se ručně přenášejí do nádrží nebo ředících nádob, zatímco obsah velkých nádob je čerpán do nádrží pomocí čerpadla.

U žádného použití není vyžadována čekací doba po aplikaci biocidního přípravku ani mezi dvěma aplikacemi přípravku nebo dalším přístupem lidí nebo zvířat do prostoru, kde byl biocidní přípravek použit.

Čištění zařízení lze provádět vodou.

Dodržujte návod k použití.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

Zamezte styku s kůží a očima

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Všeobecné doporučení: Ve všech případech pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omyjte velkým množstvím vody. Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Omyjte mýdlem a vodou a pokračujte v oplachování po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte v oplachování nejméně 15 minut. Okamžitě zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku pro lékařskou pomoc.

Zastavte únik, pokud to je možné bez rizika.
Nekontaminujte podzemní a povrchové vody.

Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vodovodních systémů.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zlikvidujte předáním oprávněné osobě.

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Neskladujte při teplotách nad 30 °C
Chraňte před mrazem
Skladovatelnost: 2 roky

Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových živočichů/domácích mazlíčků

6. Další informace

Stávající registrace:

Nettoyant Désinfectant WC - 55037 (Francie)

Chriox WC- 48044 (Francie)

Gel WC - 50211 (Francie)

Phago'Gel San - 57801 (Francie)

Symbioz Gel San Désinfectant - 50413 (Francie)

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel: 224 919 293 a 224 915 402