

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

Produktnavn: Gladiator RTU

Produkttype(r): PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

PT03 - Veterinærhygiejne

Godkendelsesnummer: EU-0020541-0000

Referencenummer på emne i R4BP 3: EU-0020541-0002

Indholdsfortegnelse

Administrative oplysninger	1
1.1. Produktets handelsnavn	1
1.2. Godkendelsesindehaver	1
1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter	1
1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)	2
2. Produktets sammensætning og formulering	2
2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Faresætninger og sikkerhedssætninger	3
4. Godkendt(e) anvendelse(r)	3
5. Generelle anvisninger til brug	9
5.1. Brugsanvisning	9
5.2. Risiko reducerende foranstaltninger	9
5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter	9
5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage	10
5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.	10
6. Andre oplysninger	10

Administrative oplysninger

1.1. Produktets handelsnavn

Gladiator RTU
Udder Max Barrier
Gladiator Max Barrier
Udderdine BARRIER
Uddine BARRIER
Udderdine RTU
Uddine RTU
Udderdine BR

1.2. Godkendelsesindehaver

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	Boumatic
	Adresse	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgien
Godkendelsesnummer	EU-0020541-0000 1-2	
Referencenummer på emne i R4BP 3	EU-0020541-0002	
Godkendelsesdato	18/11/2019	
Godkendelsens udløbsdato	31/10/2029	

1.3. Producent(er) af de biocidholdige produkter

Producentens navn	Christeyns n.v.
Adressen på fabrikanten	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien
Placering af produktionsanlæg	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien

1.4. Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)

Aktivstof	1319 - Jod
Producentens navn	Christeyns n.v.
Adressen på fabrikanten	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgien
Placering af produktionsanlæg	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Chile

2. Produktets sammensætning og formulering

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om sammensætningen af det biocidholdige produkt

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Jod		Aktivstof	7553-56-2	231-442-4	0,26
Fedtalkoholethoxylat			69011-36-5	500-241-6	1,2

2.2. Formuleringstype

AL - Opløsning til brug ufortyndet

3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

Faresætninger

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Vask hænder grundigt efter brug.

Bær øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Undgå udledning til miljøet.

Indholdet bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering..

4. Godkendt(e) anvendelse(r)

4.1 brug beskrivelse

Anvendelse 1 - Brug # 2.1 – Manuel dyppebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype

PT03 - Veterinærhygiejne

Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse

-

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadiet)

videnskabeligt navn: Bakterie
Almindeligt navn: Bacteria
udviklingsstadiet: ingen data

videnskabeligt navn: gær
Almindeligt navn: Yeasts
udviklingsstadiet: ingen data

Anvendelsesområde

indendørs

Pattedesinfektion til manuel dyppebehandling af kopatter efter malkning

Anvendelsesmetode(r)

åbent system: dyppe behandling -

Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. behandling - Produktet er brugsklart - 2 gange dagligt
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1000kg HDPE IBC

4.1.1 Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Fyld dyppekoppen med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. Det er vigtigt at være omhyggelig med hensyn til mængden af behandlingsprodukt i dyppekoppen ved hver eneste behandling. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.1.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær øjenbeskyttelse.

4.1.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.1.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.1.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2 brug beskrivelse

Anvendelse 2 - Brug # 2.2 – Manuel sprøjtebehandling, efter malkning pattedesinfektionsmidler

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterie Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: gær Almindeligt navn: Yeasts udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Pattedesinfektion til manuel sprøjtebehandling af kopatter efter malkning
Anvendelsesmetode(r)	åbent system: spray behandling - Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling - Produktet er brugsklart - 2 gange dagligt
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1000kg HDPE IBC

4.2.1 Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling.

Fyld sprøjteflasken med den angivne mængde ufortyndet produkt direkte fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.2.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (handskematerialet skal være specificeret af indehaveren af markedsføringstilladelsen i henhold til produktinformationen) og øjenbeskyttelse.

4.2.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.2.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3 brug beskrivelse

Anvendelse 3 - Brug # 2.3 – Automatiseret dyppebehandling af kopatter efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterie Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: gær Almindeligt navn: Yeasts udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret dyppebehandling af kopatter
Anvendelsesmetode(r)	åbent system: dyppe behandling - Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.

Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med maksimalt 10 ml pr. dyppebehandling - Produktet er brugsklart. - 3 gange dagligt
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1000kg HDPE IBC

4.3.1 Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved dyppebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 10 ml pr. dyppebehandling.

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.3.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.3.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4 brug beskrivelse

Anvendelse 4 - Brug # 2.4 – Automatiseret sprøjtebehandling, efter malkning desinfektionsmidler

Produkttype	PT03 - Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	-
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	videnskabeligt navn: Bakterie Almindeligt navn: Bacteria udviklingsstadie: ingen data videnskabeligt navn: gær Almindeligt navn: Yeasts udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	indendørs Pattedesinfektion til efter malkning, automatiseret sprøjtebehandling af kopatter
Anvendelsesmetode(r)	åbent system: spray behandling - Ved anvendelse efter malkning: min. 5 minutters kontakttid.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Påfør en mængde af produktet der er tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling - Produktet er brugsklart - 3 gange dagligt
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	20kg, 60kg, 200kg, 210kg HDPE-tønde og 1000kg HDPE IBC

4.4.1 Brugsanvisning for brugere

Produkt til desinfektion af kopatter ved sprøjtebehandling efter malkning.

Påfør en mængde af produktet, tilstrækkelig til at dække hele patten, med højst 15 ml pr. sprøjtebehandling

Brug det ufortyndede produkt lige fra den originale emballage. For at reducere dermal eksponering anbefales det at anvende en doseringspumpe til at fylde produktet i applikationsudstyret.

4.4.2 Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.3 Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.4 Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

4.4.5 Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring

Se den generelle brugsanvisning i meta-SPC 2

5. Generelle anvisninger til brug

5.1. Brugsanvisning

Produkterne skal have en temperatur på over 20 °C før anvendelse.

Ved behandling efter malkning: Patterne bør behandles hurtigst muligt efter malkningen og således, at de dækkes fuldstændigt. Lad patterne lufttørre. Kørerne skal holdes stående, indtil produktet er tørret helt (mindst 5 minutter).

5.2. Risiko reducerende foranstaltninger

I tilfælde af, at en kombination af desinfektion før og efter malkning er påkrævet, skal det overvejes at anvende et andet biocidholdigt produkt, der ikke indeholder iod, til desinfektion før malkning.

Opbevares utilgængeligt for børn.

5.3. Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter

Førstehjælp: Generelle oplysninger: Fjern øjeblikkeligt eventuelt tøj, der er tilsmudset med produktet

Efter indånding: Sørg for tilførsel af frisk luft; søg lægehjælp i tilfælde af symptomer.

Ved kontakt med huden: Vask huden grundigt. Produktet forårsager normalt ikke hudirritation.

Ved kontakt med øjnene: Skyl de åbne øjne under rindende vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse: Skyl munden og drik så vand. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Må ikke udledes i kloakker / overflade- eller grundvand.

5.4. sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage

Ved behandlingens afslutning bortskaffes ubrugt produkt samt emballagen i overensstemmelse med kommunale regler. Brugt produkt kan skylles ud i det kommunale kloaksystem eller bortskaffes til gødningsdepotet afhængigt af lokale krav. Undgå bortledning til et individuelt spildevandsrensningsanlæg.

5.5. opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.

Beskyttes mod frost. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod direkte sollys og utilgængeligt for børn.
Holdbarhedstid: 1 år

6. Andre oplysninger